

Stiftung Herzogtum Lauenburg

Zur Sektion *Prunus* der Gattung *Prunus*

**Erforschung und Erhaltung der Pflaumenvielfalt
Projekt II + III - Präzisierte und korrigierte Bericht**

Über die Genbank "Pomarium Raceburgense" mit sehr vielen Gehölzen der Sektion *Prunus* der Gattung *Prunus*, dabei mit besonderer Berücksichtigung und auch mit zahlreichen Vergleichen der Sippen der Primitivpflaumen, einiger Landsorten und seltener Schlehen

Teil 3

Gehölze zur Sektion *Prunus* in der Genbank Pomarium Raceburgense

(Seite 1-111):Übersicht, Pflanzplatz, Sippe und Merkmale

**Peter Schlotmann, Ansverusweg 15, 23909 Ratzeburg
Tel/Fax 04541/4556**

Korrigierte und ergänzte Auflage h5 vom

10. Februar 2020

Die neuen taxonomischen Bewertungen der Arten Schlehe und Pflaume fußen vor allem auf Grundlagen von H. und I Scholz, U. Körber-Grohne, H.L. Werneck und F. Kühn. Bei der Art Kirschpflaume wurde vorläufig nur die Frucht bewertet. Neben der präzisen Herkunft der Gehölze wird zur Orientierung auch das gerundete Gebiet der Herkunft angegeben und jeweils mit der folgenden Bezeichnung dargelegt: **nBG** (näheres Beobachtungsgebiet – Schleswig-Holstein, Hamburg, West-Mecklemburg), **DBG** (Deutschland), **euBG** (Europa) oder **uBG** (unbekanntes Gebiet).

www.stiftung-herzogtum.de

Inhalt Teil 3

10. Projekt II a) Uebersicht der Prunus-Gehoeelze S 2 b) Die makrobiologische Untersuchung,: Zur Methode S. 6. c) Ergänzungen S.9 d) Taxonomische Stufen e) Sippen + Sorten: **1.** Schlehe S.10, **2.** Kirschpflaume S.25, **3.** Pflaume S. 32, **4.** mutmassliche Bastarde S.99, **5** Vergleich der Sippen mit kl bl Fruichten, S 102
Projekt III Gehölze des Redders der Reihe 3 (nachrichtlich Reihe 1) S. 102
11. Abkürzungen S. 112

10a) Übersicht unserer Gehölze

Stand 01.Oktober 2019

Die pflaumenartigen Gehölze unseres Forschungsprojektes kommen aus dem näheren (nBG) Bearbeitungsgebiet Schleswig-Holstein, Hamburg und West-Mecklenburg, darüber hinaus aus (dBG) Deutschland und weiterhin aus (euBG) Europa.

Unser Reservat enthält fünf Wuchsgebiete, nämlich Zentrum **Z**, West **W**, Süd **S**, Ost **O**, Nord **N**. Darunter wurden die Gebiete mit Ausnahme des Zentrums in Ringen bepflanzt, nämlich von außen mit Nr. 6 bis nach innen mit Nr. 2 und z.T. im Zentrum mit Nr. 1. Insgesamt soll diese Anordnung die Pflege erleichtern und bei der Mahd für Orientierung sorgen.

In der jeweiligen Zeile der Bestandsliste erfolgen zunächst ein Hinweis auf noch fehlende Beobachtungen und für jedes Gehölz die auf Dauer gültige Standplattzahl einschließlich des Wuchsgebietes auf der Streuobstwiese (Z, W, S, O, N). Danach kommt der Leitwert der taxonomischen Gliederung, auch um für den Leser die Vergleichbarkeit der Gehölze zu erleichtern .

Mitunter wurden weitere Gehölze zu einer vorhandenen Standplattzahl hinzugefügt, die nun zusätzlich mit "a" markiert wurden. Die eingefügten Gehölze tragen dann die Buchstaben "b", "c" und die Ziffern 1, 2 usw. Damit behalten insgesamt die einmal vergebenen Standplattzahlen auf Dauer ihre Gültigkeit. Danach folgt das Herkunftsgebiet: nBG, dBG, euBG, uBG (u unbekannt). Das nächste Zeichen berichtet über den Kulturzustand, W=Wildpflanze, PPfl=Primitivpflaume, LSt=Landsorte, KSt=Kultursorte, ESt=Edelsorte, FG=Feld-gehölz.

Pr-Prunus, ssp-Subspezies/Unterart, var-Variante. s.l.-sensu lato, s.s.-sensu stricto, *dom- domestica*,,Pfl-Pflaume, Fr-Frucht, Blü-Blüte, Blü-St-Blütenstiel, St-Stein, nBG-näheres BG (Schleswig-Holstein, Hamburg, West-Mecklenburg), dBG-Deutschland, euBG-Europa,uBG-unbekanntes BG. Herbst 2017: II 508 Expl.+ III 85 Expl. = 593 Gehölze,außerhalb ca. 110, insgesamt also ca. 700 Pruni.

1. Plattzahl fett: Gehölz des Forschungsprojektes
2. „ normal: junge bis jüngste Züchtung
3. & + X Früchte für Untersuchungen 2017, X Anzahl der Früchte
4. Y Y1 Schild fehlt, Y2 Schild (inzwischen) falsch
5. ? Klärungsbedarf
6. § Markergestützte Untersuchungen von ARCHE NOAH
7. ined vorläufig
8. 2.4 Zeitdauer der Blütenkrone
9. Abb Abbildung, z.B. Fr-Frucht, St-Stein, 4b/29 = Bild 29 im Teil 4b
10. E, Expl Exemplar

Prunus-Gehölze, Projekte II,+ III (Wiese, Redder 1) 593 Expl

508 + Redder 3 mit 85, = 593 Expl + Knick = 700 Expl

1. Art Schlehe, *Pr spinosa*, 48 nBG, 8 dBG, 2 euBG, 1 uBG Expl. 59, S. 3

<u>A) Gruppe Wildschlehe</u>	54	3
<u>A1 Gruppe herbe Wildschlehe</u>	53	3
<u>1.1 Unterart Gewöhnliche Schlehe, <i>Pr spinosa</i>, ssp <i>spinosa</i></u>	23	3
17 nBG, 3 dBG, 2 eu BG, 1 uBG		
1.1a Typ Gew. Schlehe, eiförmige Frucht, 3 nBG	3	11-12
1.1b Typ Gew. Schlehe, rdl. Stein, 6 nBG, 3 dBG, 1 euBg,, 1 uBG	11	12-13
1.1c Typ Gew. Schlehe, eiförmiger Stein, 3 nBG, 1 euBG	4	12-14
1.1d Sorte Gew. Schlehe, s. schöne kugelige.Blüte, 2 nBG	2	12-15
1.1e Sorte Gew. Schlehe, s. früh blühend, s. kleine Blü, 2 nBG	2	12-15
1.1f nicht näher bestimmte Gew. Schlehe, 1 nBG	1	12-16
<u>1.2 Unterart Großfruchtige Schlehe, <i>Pr spinosa</i> ssp <i>megalocarpa</i></u>	23	16
21 nBG, 2 dBG		
1.2.1 Typ (typische) Großfruchtige Schlehe, 12 nBG, 2 dBG	14	16
1.2.1.9 Sämlinge von 1.2.1, 2 nBG	2	19
1.2.2 Typ Großfruchtige Schlehe, rundlicher. Stein, 4 nBG	4	16-20
1.2.3 Typ Großfruchtige Schlehe, kugeliger Stein, 2 nBG	2	17-20
1.1/1.2 Zuordnung noch nicht möglich, 1 nBG, 1 uBG	1	21
<u>1.3 Unterart Filzige Schlehe, <i>Pr spinosa</i> ssp <i>dasyphylla</i></u>	7	20
1.3.1 Variante Kleine Filzige Schlehe, 4 nBG, 2 dBG	6	20
1.3.1.1 Typ kleinblättrige Kl Filzige Schlehe, 2 nBG	2	20
1.3.1.2 Typ großblättrige Kl Filzige Schlehe, 2 nBG, 2 dBG	4	21
1.3.2 Variante Große Filzige Schlehe, var <i>supradensa</i> , 1 nBG	1	22
<u>A2 Gruppe milde Wildschlehe)</u>	1	23
1.4 Unterart milde Schlehe, <i>Pr spinosa</i> ssp <i>morawica</i> , 1 dBG	1	23
<u>B) Gruppe Kulturschlehe</u>	5	23
<u>1.8 Hofschlehe</u>	5	23
1.8.1 Sorte Großfruchtige Hofschlehe, 3 nBG	3	23
1.8.2 Sorte Kleinfruchtige Hofschlehe, 2 nBG	2	24
<u>2. Art Kirschpflaume, <i>Prunus cerasifera</i></u>	34	25
2.1 Gruppe Kultursorte	13	25-26
2.2 Gruppe fast kugelige Frucht	5	26-28
2.3 Gruppe eiförmige Frucht	4	26-29
2.4 Gruppe besondere Frucht	9	26-30
2.4.1 Gruppe blaue Frucht	3	30
2.4.2 Rebhuhn-Kirschpflaume	5	30
2.4.3 extreme Kirschpflaume	1	31
2.9 unbekannte Kirschpflaume	3	31
<u>3 Art Pflaume, <i>Prunus domestica</i>, 402 Pfl, 13 Bastarde</u>	415	32
<u>A) 3.0 Systematik nicht geklärt, geeignete Früchte fehlen noch !</u>	45	33
3.0.1 primitive blaue Pflaume vom Hirtengang, HL, H. Egleder, HL, 2 nBG	2	33
3.0.2 kleine blaue Rostocker Primitivpflaume, 3 dB3G	2	33
3.0.4 Kriechele Dürnau, über W. Hartmann, Filderstadt, 1 dBG	1	33
3.0.5 Nichols kleine Hauspflaume, über W. Hartmann, Filderstadt, 2 dBG	2	33
3.0.7 Sarner Bullace, Typ 2, Halbinsel Llynn, NW-Wales, 3 euBG	3	33
3.0.8 Pflaume aus Marchessy, über W. Hartmann, Filderstadt, 2 euBG	2	34
3.0.9 Aprikosenpflaume, 3.0.9a C. Städeles Aprikosenpflaume, 88667 Warthausen	1	34

3.0.10	Sarner Bullace, Typ 1, Halbinsel Llynn, NW-Wales, 2 euBG	2	34
3.0.11	kl blaue Pflaume, Usedom, Andreas Kalesse, Billstedter Pfad 2, 13591 Berlin	1	35
3.0.12a-3.0.13c	uBG, 6 Primitivpflaumen	3	35
3.0.20	Kroojjes, über W. Hartmann, Filderstadt, 2 euBG	2	35
3.0.23	Schutzberg-Spilling, A. Kressin, Ballenstedt-Badeborn, S-A, 2 dBG	1	35
3.0.24	Katalonischer Spilling, wie 3.0.23, 3 dBG	3	36
3.0.25	Bündel 1, A. Lugmair, Gstocket 10, Alkoven, OÖ, 4 euBG	2	36
3.0.25	Bündel 1/1	1	
3.0.25	Bündel 1/2	1	
3.0.27	Bündel 2/6, wie 3.0.26, 1 dBG	1	36
3.0.28	Bündel 2/8, wie 3.0.26, 3 dBG	3	36
3.0.29	Bündel 2/9, wie 3.0.26, 1 dBG	1	37
3.0.30	Bündel 2/10, wie 3.0.26, 1 dBG	1	37
3.0.31	Bündel 2/11, wie 3.0.26, 1 dBG	1	37
3.0.32	Bündel 2/13, wie 3.0.26, 1 dBG	1	37
3.0.33	Landsorte, gelb, vermutlich Reneklode, H.L. Kramp Wendorf, NW-M, 2 nBG	2	37
3.0.34	Kricke s.l., Herkunft unbekannt. 1 uBG	1	37
3.0.35	ockerfarbene Dornpflaume, H. Gretzmeier, Merdingen, Breisgau, 2 dBG	2	37
3.0.36	Aroma-Zwetsche, Peter Klock, gleich 15 Zb ? 1 nBG	1	38
3.0.37	euBG, Karl Lunds plommen, über Henk Woldring, Nietap NL, aus Süd-Schweden	1	38
3.0.38/39	euBG, Krikon, über Henk Woldring. Nietap NL, aus Süd- S	2	38
3.0.40	Wurzelbrut, Nordseite der Hütte	3	38

B) Systematik mehr oder minder geklaert **370 38**

3.1 Unterart Kricke, s.l., *Pr dom ssp insititia* **118 38**

Kricke, Wiechel, Ziparte, Stein symmetrisch, Stein klein, kernig, gerade-senkrechte Achse, ohne Stiel

3.1.1 Variante Kricke, s.s., Fr blau, mit blauer Ziparte, Blü-St kahl **90 39**

3.1.1a Hauptform der Kricke, s.s. 78 39

3.1.1a1 Typ Stein schlank + beidendig eher ähnlich 43 39

3.1.1a2 Typ Stein: schlank + beidendig eher verschieden 16 47

3.1.1a3 Typ Stein rundlich 11 50

3.1.1a4 Typ Stein kugelig 8 51

3.1.1b Sämlinge von 3.1.1a 4 53

3.1.1c nähere Bestimmung noch nicht möglich 4 54

3.1.2 Variante Wiechel, Fr blau, Blü-Stiel behrt **15 54**

3.1.2a Region Norddeutschland 2 55

3.1.2b Region Mitteldeutschland 6 55

3.1.2c Region Westdeutschland 3 57

3.1.2c1 Stein linsig 1 57

3.1.2c2 Stein oval 2 57

3.1.2d Region Süddeutschland 4 57

3.1.3 Variante (gelbe) Ziparte, Fr glb, kräftige Gerbsäure **13 58**

3.1.3a1 5 deutsche Ziparte 5 58

3.1.3b1 englische Ziparte, Staffordshire Bullace 3 60

3.1.3b2 englische Ziparte, Shepherds Bullace 2 60

3.1.3c englische Ziparte, Sämlinge, Staffordshire 3 61

3.3 Unterart Kreeke, *Pr dom ssp acuticarpa ined*, Fr gelblich-rötlich, eiförmig, Längsachse des St gewunden, nach einem Drittel der Länge größte Dicke **19 61**

3.4 Unterart Spilling, *Pr dom ssp pomariorum*, 62 65

A) echte Spillinge, stets ein über den Körper des Steines hinausragender, +/-gebogener „Stiel“ mit +/- Länge 52 65

3.4.1 Variante Gelbroter + Roter Spilling 7 65

3.4.1a Form Gelbroter Spilling 4 66

3.4.1b Form Roter Spilling 3 66

3.4.2 Variante Blauer Spilling 33 67

3.4.2a Typ, Stein lang, stark gebogene Achse 11 67

3.4.2b Typ, Stein kräftig, breiter und dicker als a 9 70

3.4.2c Typ, Stein klein, schlank, Flanken völlig glatt 8 72

3.4.2d Typ, sehr klein, Stein breiter Bauch, schmaler Rücken 2 74

3.4.2x nähere Form noch nicht erkennbar 3 74

343 Variante Gelber Spilling, St Längsachse gering bgfg, kürzer als 3.4.1 12 75

B) weitere Spillinge B1, ähnliche B2, unklare B3, 8 dBG, 2euBG 10 77

noch nicht näher untersucht

B1 3.4.4 Sorte Weidenberger Spilling 1 77

B1 3.4.5 Sorte Wohlriechender Spilling 2 77

B1 3.4.6 Sorte „Grüner“ Spilling 2 77

B2 3.4.7 Sorte Zweispitz 1 77

B2 3.4.8 Sorte Pemsen 1 78

B3 3.4.9 Noch nicht bestimmbare Gehölze 3 78

3.5 Unterart Mirabelle, *Pr dom ssp syriaca*, gelbe, kugelige Fr, sonnenseitig rötlich. Punktiert, süß-aromatisch, wenig saftig, wärmebedürftig 4 78

3.6 Unterart Rundpflaume, *Pr dom ssp italica*, Fr 3-6 cm groß, gelb, grün, blau, rot, dick-oval-kugelig, süß und saftig, Steindicke 70-98% der Länge, Sippe ist vielgestaltig 22 79

3.6.1 Variante Echte Rundpflaume, var *subrotunda*, groß, blau, saftig, aromatisch, Stein kräftig 5 79

darunter Damson Bradley's King, Henk Woldrig, Stapelholmer, Frank Kahlbrandt

3.6.2 Variante Reneklode, var *claudiana*, weiche, sehr saftige, aromatische Frucht 16 80

3.6.2.1 Gruppe Landsorten 11 80

3.6.2.1a Gruppe blaue Landsorten, 4 nBG, 1 euBg 3 80

3.6.2.1b Gruppe gelbe und grüne Landsorten, 5 nBG 7 81

3.6.2.1c Gruppe rötliche Landsorte 1 83

3.6.2.2 Gruppe Kultursorten 5 82

darunter 1 3.6.2.2a1 wurzelechte „Große Grüne“ Reneklode

3.6.3 Sorte Bonne de Bry, Henk Woldring 1 83

3.7 Unterart Halbwetsche, *Pr dom ssp intermedia* 76 82

Große Polymorphe Sippe, Abgrenzung von 3.8 bei Edelsorten durchgängig kaum möglich. Eine (2-) 4-8 cm lange, weiche, saftige Pflaume. Fr blau, violett, rot gelb

3.7.1 Typ I, Frucht beidendig eher +/- gleich 68 84

3.7.1.1 Variante Küchenzwetsche, var *culinaria*, behält Süße beim Kochen/Backen 13 84

3.7.1.1a Landsorte, Kosin, Ratzeburg, Vorstadt	1	84
3.7.1.1b Kultursorte, vorzgl Wangenheims Zwetsche, vielstg, anspruchslos	12	84
3.7.1.2 Gruppe Eierpflaume und Ähnliche	6	85
3.7.1.2.1 Variante Gelber Bidling, var <i>praecox</i>	4	85
3.7.1.2.2 Variante Eierpflaume, var <i>ovidea</i> , Sorte Diamantpflaume	2	86
3.7.1.3 Variante Oval- Pflaume, var <i>oxycarpa</i>	17	86
Fr klein, schön oval, saftig, St flach, symmetrisch		
3.7.1.3.1 Form kleine.Blaue (S-H) Oval-Pflaume	2	86
3.7.1.3.1a behaarte kleine Blaue (S-H) Oval-Pflaume	1	87
3.7.1.3.1.b kahle kleine Blaue (S-H) Oval-Pflaume	1	87
3.7.1.3.2 Form Oval-Pflaume, s.s.	7	87
3.7.1.3.2a Landsorte	1	87
3.7.1.3.2b Kultursorten, vorzüglich The Czar, näßt beim Backen	6	87
3.7.1.3.3 Brit Oval-Pfl, Sorte Black Bullace	4	88
3.7.1.3.4 Sorte Pogauner Oval-Pflaume	2	88
3.7.1.3.5a Sorte gelbe Ortenauer Oval-Pflaume, b Sorte Löhrpflaume	2	89
3.7.1.4 Variante Kreete, var <i>tricolor ined.</i> , 19-24 mm größere, kurz ova-	32	90
le, süß-aromatisch-saftige, frühreife Pflaume, Verhältnis Stein Dicke : Breite ab 158 %, Stein flach, symmetrisch ,27 + 5 , 32 Expl		
3.7.2 Typ 2, Frucht am Stielende deutlich schmaler	8	95
3.7.2.1 Sorte Holsteinische Halb-Zwetsche	1	95
3.7.2.2 Sorte Shropshire Prune Damson, Typ 1	2	96
3.7.2.3 Sorte Gelbe Holsteine Halb-Zwetsche	2	96
3.7.2.4 Sorte Dattelpflaume	2	97
3.7.2.5 Sorte Rotzwetschke	1	97
3.8 Unterart Echte Zwetsche, <i>Pr domestica ssp domestica</i>	24	97
Fr beidendig gleich oval, 4-7 cm lang, wenig saftig, näßt beim Backen nicht		
3.8.1 Landsorten	16	95
3.8.1a Hauszwetschen aus Deutschland	14	97
3.8.1b Hauszwetschen aus Österreich	2	99
3.8.2 Echte Zwetschen, Altsorten	8	99
3.9 Weitere Echte Zwetschen	34	99
3.9.1 Weitere Pflaumen, Bearbeitung erforderlich	6	99
3.9.2 Die Zuordnung erfolgt später	2	100
3.9.3 Neue Kultursorten, Sippe kaum bestimmbar	26	100
4. Mutmaßliche Bastarde	12 + 1	13 100
5. Anhang: Vergleich der Sippen mit kleinen blauen Früchten		103
6. Projekt III, (Redder Reihe 3)	85 Expl.	104
Stand der Bestimmung: Herbst 2015, nachrichtlich darunter Reihe 1		
7.Abkuerzungen		114-115

10b)Projekt II, Makrobiologische Untersuchung der Gehölze

Eine wichtige Hilfe zur Deutung der Sippe

Dokumentation der Breite und Vielfalt unseres Bestandes, hier die Streuobstwiese und Reihe 1 des Redders als Grundlage für die Forschung

10b Zur Methode der makrobiologischen Untersuchung der Gehölze

Die morphologische Untersuchung der Gehölze ist mit ihren Werten die bislang wichtige Hilfe für die Deutung der Sippen. Die Grundlage dazu wird zur wiederholten Beobachtung der reiche Bestand unserer Streuobstwiese und des Redders bilden. Auch die selbstverständlich weitere Sammlung geeigneter Gehölze aus zusagenden europäischen

Gebieten bleibt Ziel. Nur so kann - wie viele Autoren es wörtlich fordern - „die Konstanz auch weit Raum-übergreifend bei möglichst vielen Exemplaren der jeweiligen Sippe beachtet werden.“ Allgemein gelten darum - wie z.B. vor über 200 Jahren bei Carl von Linne` - auch bei den *Pruni* drei Ansprüche :

- 1. Die Bäume sollen ohne Rücksicht auf den Standort und das Klima gleich sein.**
- 2 Die Merkmale sollen an jedem Baum der gleichen Sippe vorhanden und auch unterscheidbar sein von parallelen Merkmalen eng verwandter Sippen.**
- 3. Die Merkmale sollen auch über das Beobachtungsgebiet hinaus gültig sein. Zur Erleichterung der Feldarbeit können regional gültige Fassungen nützlich sein“.**

Dabei fußten in der vorliegenden Arbeit die taxonomischen Bewertungen der Arten Schlehe und Pflaume vor allem auf Grundlagen von H. und I Scholz, U. Körber-Grohne, H.L. Werneck und F. Kühn, während bei der Art Kirschkpflaume bislang nur die Frucht einbezogen wurde. Die Ergebnisse mögen die Voraussetzungen glätten für spätere ergänzende mikrobiologische Arbeiten. Die Größe der Früchte und Steine wird möglichst in Millimeter angegeben, Lg~Br~Di.

1. Spross (Spr)

- 1.1 Behaarung junger Internodien: 1.1 Februar + 1.2 Juni
ka: kahl, bh0: keine gefunden, bh 1: gering, bh 2: stärker, bh 3: wollig
- 2 Bedornung
0: keine gefunden + 1: 1 bis 3 + 2: einige + 3: mittelstark + 4: viele schwache + 5: starke

2. Blüte (Blü)

1 Die Krone

- 1.1 Blütenfarbe : w: weiß, sw: strahlendweiß, bw:beigeweiß, gw: grünweiß, rw: rötlichweiß
- 1.2 Beginn der Blütezeit mit Bezug zum Laubausbruch:1: sehr früh, 2: früh, vor Laubausbruch, 3: mittelspät, Beginn der Entfaltung, 4: mit-telspät, Laub zum Teil entfaltet, 5: Laub entfaltet, auch schattiger Ort
- 1.3 Größe und Form der Kronblätter, 1: sehr klein und schmal, 2: noch schmal, aber vorne breiter abgerundet, 3: mittelgroß, BlüBl deutlich breiter, 4: schon groß, Breite fast wie Länge, 5: s. groß, BlüBl lang und schmal, 6: großblütig, sehr ansehnlich
- 1.4 Ende der Kronblätter: 1. fast spiz, 2. oval, 3a breit oval, 3b fast gerade

2.0 Blütenstiel, Fruchtstand, Beginn und Ende der Blütezeit

- 2.1 Behaarung des Blütenstiemes, ka: kahl, bh0: keine gefunden, bh1: gering, bh2: stärker, bh3: stark bis wollig
- 2.2 Länge des Blüten-/Fruchtstiemes, a: bis 5 mm, fast sitzend, b: 6 bis 10 mm, c: 11 bis 15 mm, d: > 16 mm
- 2.3 Fruchtstand, eiz: einzeln, auch quirlig, paa: wenige, Paa: viele paa rig
Zeitdauer der Blüte 2015 bis 2016

3. Laubblatt (LBl)

Darlegung in 5 Blöcken, jeweils getrennt durch "+". **1.** Farbe, Form, Blattrand, Blattbasis, danach +, **2.** Länge, nach Schrägstrich davon Blattstiel, danach + **3.** Breite, danach + **4.** 1. Indiz LBl: Spreitenbreite durch LBl-Länge, danach Schrägstrich, 2. Indiz Spreite : Spreitenbreite durch Spreitenlänge, jeweils in %. Danach + **5.** Behaarung der Spreitenunterseite: ka: kahl, 1: Hauptnerv im unteren Viertel und erste Achseln, 2: Hauptnerv und Nerven 1. Grades, 3: Hauptnerv und Nerven schwach bis Blattrand, 4: ebenso, stärker die ganze Fläche, 5: wollig, danach Schrägstrich : Behaarung des Blattstiemes ka: kahl, 1: Oberseite kurz und dünn, 2: Oberseite länger, noch dünn, 3: beidseitig, 4: wollig, 5: kräftig

4. Frucht (Fr)

Darlegung in 4 Blöcken, jeweils getrennt durch "+" 1 Anzahl der untersuchten Früchte, danach +, 2 Frucht reife, z.T. nur Vollreife der Beduftung, danach +, 3 Fruchtgröße, + 4 Indizes Frucht: Lg = 100 %, Br zu Lg, Di zu Lg, Di zu Br,

5. Fruchtstein (St)

1. Steingröße, Lg, Br, Di + 2 Indizes : Lg = 100 %, Br zu Lg, Di zu Lg, Di zu Br, danach + anschließend Beschreibung des Fruchtsteines, dies meist unter 6

4/5 Größenangaben erfolgen immer in der Reihenfolge: Länge ~ Breite ~ Dicke

6. Besonderheiten

z. B. nähere Aussagen über Form des St, die Herkunft des Gehölzes, Baumform, Haltbarkeit, Geschmack und Verwendung der Frucht

Weitere Erläuterungen

Fruchtstein

Bei der Arbeit muss der Fruchtstein in die Untersuchungen einbezogen werden. Um vergleichbare Werte zu bekommen, wird das Verfahren normiert. Dabei wird der Stein so aufgestellt, dass das Narbenende oben, das Stielende unten und die Bauchnaht (häufig mit einer Riefenfurche) der messenden Person zugewandt ist. Die senkrechte Linie ist nun die Länge (Lg), die waagerechte die Breite (Br, meist die kürzeste Dimension) und die Tiefenlinie, also der Abstand zwischen der Rücken- und Bauchnaht, die Dicke (Di).

Da die absoluten Messwerte, die in direktem Bezug zur Fruchtgröße stehen, stark variieren, werden sie in relative Werte, die sog. Indizes, transformiert. Lg wird gleich 100 gesetzt, Br und Di werden in % von Lg und schließlich Di in % von Br angegeben.

Form des Fruchtsteines, Begriffsbestimmung

Sehr bedeutsam ist auch die Form des Fruchtsteines

Längsachse des Steines: In Seitenlage die Linie vom äußersten Narbenende bis zum äußersten Stielende.

Senkrecht: Längsachse gerade und der Stein +/- symmetrisch.

Nicht symmetrisch: Längsachse gekrümmt, geschwungen oder bogenförmig.

Form des Steines schlank und "linsig" : Stiel- und Narbenende des Steinkörpers +/- angespitzt, also doppelspitzig, Bauch- und Rückennaht verlaufen +/- symmetrisch, der Stiel des Steines ragt nicht über den Körper des Steines hinaus, die Längsachse ist gerade,

Form des Steines schlank und "oval" : Stiel- und/oder Narbenende +/- abgerundet, ähnlicher Bogen bei Bauch- und Rückennaht, der Stiel des Steines ragt nicht über den Körper hinaus, die Längsachse ist +/- gerade

Form des Steines schlank und NbEd und StEd +/- unterschiedlich

"Stiel" des Steines: Bei einigen Steinen ragt der Stiel über den Körper des Steines hinaus, ist also eine "Extremität". Bei seiner Krümmung folgt er meist der Bauchnaht.

Abkürzungen: Stielende-StEd, Narbenende-NbEd, abgerundet-abgrdt, Flanken-Fl, Bauchnaht-BNt, Rückennaht-RNt.

Ergänzung über die Laubblätter und die Behaarung

Neben den Indizes für Steine mögen auch "Indizes" von Laubblättern (LBI) ausgereifter Triebe hilfreich für die Gliederung sein. Hier wird 1. die Länge des Blattes gleich 100 gesetzt, dann folgt die Breite von der Länge in Prozent, und 2. ebenso die Breite der Spreite zu ihrer Länge

Bekanntlich gliedern die morphologischen Merkmale Behaarung bzw. Kahlheit spezifischer Organe der Wildrosen, aber auch der Schlehen

10c. Ergänzungen (außerhalb liegende Gebiete)

1. Knick Raum Hattstedt in Nordfriesland

Christen Hingst, Schobüller Weg 4, 25856 Hattstedt, 04846 1720

- 1. MC 1, 3.1.1a1, Kricke, St längl, am Ende +- gleich, Achse senkrecht gerade**
 1. Spr: Okt grün, kahl
 3. LBl: grün, ell, ges, keilfg + 48/10 + 28 mm + 58/74 + kahl
 4. Fr: 1 + blau, oval + 22,6~17,1~17,1 mm + 76 : 76 : 100, herbe
 5. St: 1 12,9~7,1~10,3 mm + 55 : 80 : 145
- 2. MD 2, 3.1.1a1, Kricke, Stein lägl, am Ende +- gleich, Achse senkrecht gerade**
 1. Spr: Okt grün, kahl
 3. LBl: grün, ell, ges, keilfg + 52,1/10 + 21,0 mm + 40/50 + kahl
 4. Fr: 4 + oval + 25,3~23,2~23,2 mm + 92 92 : 100, herbe
 5. St: 4 + 14,9~6,6~8,1 mm + 44 : 54 : 123
- 3. CH 1, 3.1.1a3, Kricke, Stein rundlich, Achse senkrecht gerade**
 1. Spr: Okt braun, sehr kurz behaart
 3. LBl Okt weiß-grau, ges, keilfg + 60/12 + 30,6 mm + 51/77 + +- gez
 4. Fr: 2 + paarig, oval, Stiel 10, herbe
 5. St: 2 + 12,8~8,0~10,7 mm + 63 : 84 : 134
- 4. MD 1, 3.1.2a, Wiechel, BlüSt behaart, St längl, Achse senkrecht gerade**
 1. Spr: Okt grün, s kurz beh
 3. LBl: Okt grün, ges, keilfg, schwach beh + 69/12 + 33 mm + 48/58
 4. Fr: 2 + blau mit Hauch, oval, Okt stark abgetrocknet, **BlüStiel 15 mm, beh**
 5. St: 2 + 13,0~6,6~9,1 + 51 : 70 : 138
 6. Frucht frühreif, wohl schmeckend
- 5. MD 3, 3.4.2, blauer Spilling, St Längsachse im letzten Teil leicht gebogen**
 1. Spr: Okt grünlich, beh
 3. LBl: grün, ell, ges, keilfg + 59/13 + 29 mm + 49/63 1/1
 4. Fr: dickoval, rotblau mit Hauch, 23,1~18,2~20,8 mm+ 79 : 90 ; 114
 5. St: 18,0~7,1~11,5 mm + 39 : 64 : 162 + leicht geschwungene Achse
- 6. MD 4, 3.7.1.3.1b, kl bl (S-H) Ovalpflaume, St gerade Achse, Stiel kurz gerade**
 1. Spr: braun, kahl
 3. LBl: grün, gezähnt, keilfg, 61,2/12,6 + 23,4 mm + 38/48 kahl
 4. Fr: 2 + oval + gelb + 24,3~18,5~18,5 mm + 76 : 76 : 100
 5. St: 2 + 16,1~6,6~9,3 mm + 41 : 58 : 141, schwach gerade gestielter
- 7. CH2 3.5.2 Glbe Mirabelle, Blühbeginn normal, Lbl-ganz ges, St.Di:Br 162 %**
 1. Spr: Nov fast grün, kahl
 3. LBl: noch grünlich, ges, ell, rdl-schwach keilfg, 62,1/11,9 + 39,5mm + 63/66 % + 2/2
 4. Fr: Nov trocken, Stiel 11mm, kahl
 5. St: 10 + 18,2~7,3~12,0 mm + 41 : 66 : 162 % + Achse gerade, Bauch ausladend
- 8. CH 3 zu wenig Daten**
 1. Spr: Nov eine Seite grün, andere braun + kahl
 3. LBl: Nov grünlich, herzfg, brt-ges, rdl + 75,9/6,1 + 46,7 + 62/67 + 2/2
 5. St: 10 + 11,6~6,6~10,1 + 57 : 87 : 153 + Achse gerade, schwach gestielt

2. Knick Raum Gettorf

Bärbel Wittenburg, Am Eichberg 8, 24340 Eckernförde,

Tel 04351/42094

- 1. 3.1.1a3 Kricke, rdl Stein, Landstraße zwischen Altenhof und Gettorf**
 3. LBl: grün, br ges-gekerbt, fast herzfg, rdl + 65/9,4 + 4,1mm + 63/73%+ kahl
 4. Fr: blau mit Hauch, Stiel paa, kahl
 5. St: 10 + 15,1~7,8~10,3mm + 52 : 68 : 132 %, gerade Achse, beidseitig gleich
- 2. 3.4.2 Blauer Spilling ? Daten reichen nicht aus! Fundort Eckernförde**

Vorläufige Zuordnung

 5. St: 10 + 23,7~7,2~12,4 mm + 30 : 52 : 172 + gestielt, etwas abgewinkelt

10 d Stufen der taxonomischen Gliederung

Bei der taxonomischen Gliederung werden die Gehölze einer Rangstufe zugeordnet

1. Alle Gehölze gehören zur Familie der Rosengewächse
2. Darunter gehören alle zur großen Gattung *Prunus*
3. Darunter gehören alle zur Sektion der Pflaumenartigen *Prunus*
4. Darunter gehören sie zur Art Schlehe, Kirschpflaume oder Pflaume
5. Anschließend erfolgt eine Gliederung in Unterarten
6. Die Unterarten werden gegliedert in Varianten
7. Nun erfolgt möglichst eine Gliederung in Formen
8. Sorten sind Beispiele der Formen
9. Die Begriffe Gruppe und Typ liegen außerhalb der Ordnungen

10e) Darlegung der Pruni Projekt II, 508 Expl

Zusätzlich im Projekt III 85 = 593 mit Knick 700 Expl

1. Art Schlehe, *Prunus spinosa* L. 59 Expl

Strauch, meist mit reichlich Ausläufern, auch Kleinbaum. Zweigstellung der Seitensprosse häufig 90 ° abstehend, meist reichlich Sprossdornen. Pflanze bildet meist Dickichte. Blütezeit 1-3, selten 5 Wochen nach der Kirschpflaume, vor der Laubentwicklung, auch mit und selten danach. Blüten meist strahlend weiß, Kronblätter meist vorne gut abgerundet. BSt/FSt 4-8, auch bis 10 mm lang. LBl meist länglich-lanzettlich, auch elliptisch-eiförmig, Länge 2-5, selten bis 7,5 cm, Spreitenbreite selten bis 4 cm, Farbe +/- leichtes Grau-grün. Blattstiele 0,5-0,8 (selten bis 1,6) cm lang, Blattgrund meist keilförmig. Früchte mit geraden Stielen, 2-7 (selten -17) mm, stehend, selten hängend.

Völlig unbehaarte Schlehenbüsche wurden im BG nicht gefunden. Bei einigen ist allerdings nur der LBl-Stiel behaart. Früchte meist blaubereift, auch blauschwarz, im nBG, nie grüngelb oder gelb, meist kugelig, auch etwas oval, 7-14 (selten bis 20,8) mm, selten eiförmig, im BG stets stark adstringierend wirkend, also viele Tannine. Blaufärbung der Früchte ab Anfang August (Intensität auch abhängig von der Besonnung), Fruchtreife meist Oktober. Fruchsteinen meist pockennarbig bis gemuschelt, auch netzig, selten glatt. Die Art ist sehr vielgestaltig. Einige Sippen benötigen eine höhere Aufmerksamkeit. Mehrere Sippen sind sehr selten und schutzbedürftig.

Mit WERNECK (1961/62 s.o.) kann man nach pragmatischen Gesichtspunkten die Art einteilen in Wild- und in Kulturschlehen, zu der letzteren gehört im nBG die Hofschlehe. Sie kommt nicht in der Feldmark vor, sondern kann nur sehr selten am ehesten in "verlassenen Ecken" und nahen Knicks alter/ehemaliger Bauernhöfe und Katen erwartet werden. Der Stein ist ein wenig verkehrt-eiförmig, am Narbenende etwas spitz, das Stielende des Steines lugt ein wenig schräg heraus, die Flanken zeigen am Stiel eine betonte Riefe, dazwischen sind sie feingrubig besetzt. Die Hofschlehe ist ein langtriebiger, lockeres, kaum bedorntes Gehölz, was die Ernte der Früchte erleichtert, die stark adstringierend wirken. Die Sorte steht wohl im Sinne von erfolgten "Kleinmutationen und Ertragsselektionen" nur unweit der Unterart Großfruchtige Schlehe.

A) Gruppe Wildschlehe

54 Expl.

***50 Expl, A) Ind LBl 36,3 % (27-55%), Ind Spreite 43 % (33-60) %, B) Fr, 1. Grö 11,0-20,8 ~ 11,3-18,4 ~ 11,6-19,9, 2. Ind 88-110 : 89-115 : 100-108, C) St, 1. Grö 10,3 (7,8-14,2)~ 6,3 (5,4-7,4)~ 8,1 (7,1-9,8), 2. Ind 61 (44-89) :79,3 (56-100) 131,4 (112-153)**

A1) Gruppe herbe Wildschlehe,

53 Expl.

43 nBG, 7 dBG, 2 euBG, 1 uBG

Herbe Schlehen haben viele Tannine. Sie wirken also adstringierend bis zur Einwirkung des Frostes. Zahlreiche Übergänge von der Gewöhnlichen zur Großfruchtigen Schlehe sprechen eher gegen eine Trennung in zwei Unterarten. Zur weiteren Beobachtung wird sie vorerst jedoch beibehalten.

Vergleich 1.1 Gewöhnliche und 1.2 Großfruchtige und 1.8.1/2 Hofschlehe

1.1 B) Fr, 1.Grö 15,9~14,7~15,3, 2.Ind 92:96:104, C) St 1.Grö 9,9~5,6~7,3, 2.Ind 56:73:130
1.2 B) Fr, 1.Grö 16,3~16,7~17,4, 2.Ind 102:107:104, C)St,1.Grö 10,0~6,6~8,6,2.Ind 66:86:130
181 B) Fr,1.Grö 20,5~19,7~20,7, 2.Ind 96:101:105, C)St,1.Grö 11,1~6,3~8,5, 2.Ind 57:77:135
182 B) Fr,1.Grö 18,3~17,7~18,3, 2.Ind 96:100:103, C)St,1.Grö 10,8~6,7~8,6,2.Ind 62:80:129

1.1 Unterart Gewöhnliche Schlehe, *Prunus spinosa* ssp.*spinosa* L. 23 Expl.

BSt/FSt kahl, Frucht herb, Fruchtgröße meist nur 8-12 (im sehr günstigen Herbst auf bestem Boden sogar bis 18) mm groß. Kronblätter sehr schmal, Laubblätter schmal. Bildet meist Dickichte. Häufig in Knicks auf lehmigen Böden. Bei der Gewöhnlichen Schlehe gibt es im nBG gut unterscheidbare Typen, aber ungleicher genetischer Ranghöhe. **17 nBG, 3 dBG, 2 euBG, 1 uBG**

19 Expl, A) Ind LBl 38,3 % (27-55); Ind Spreite 44,3 (33-63) % B) Fr, 1. Grö 15,9 (11,0-17,4) ~ 14,7 (11,3-15,7) ~ 15,3 (11,6-16,9), 2. Ind 92 (83-110) : 96 (87-115) : 104 (100-108), C) St, 1. Grö 9,9 (7,8-13,5) ~ 5,6 (4,9-7,0) ~7,3 (6,4-8,9), 2. Ind 57 (47-76) : 74 (62- 97) : 130 (121-136);.

Vergleich der sechs Formen von 1.1 mit "herbe Gewöhnliche Schlehe"

1.1a,B) Fr, 1. Grö 16,4~14,4~14,8,2.Ind 88:90:103,C)St 1. Grö 12,3~6,0~7,9, 2.Ind 49:64:132
1.1b,B) Fr, 1.Grö 13,9~14,0~14,4,2.Ind 101:104:103,C)St 1.Grö 9,2~6,0~7,6,2.Ind 65:83:127
1.1c,B) Fr,1.Grö 14,4~13,2~13,7,2.Ind 92:95: 104,C) St 1.Grö 9,8~5,8~7,5, 2.Ind 59:77:129
1.1d,B) Fr,1.Grö 17,2~15,5~16,3,2.Ind 90:95:105, C) St 1.Grö 10,4~5,6~7,2, 2.Ind 54:69:129
1.1e,B) Fr,1. Grö 17,3~15,7~16,9, 2.Ind 91:98:108, C) St 1.Grö 9,4~5,5~7,1, 2.Ind 59:76:129
1.1f, B)Fr, 1.Grö 16,0~15,4~15,4, 2.Ind 96:96 :100, C)St 1.Grö 8,3~4,9~6,4, 2.Ind 59:77:131
1.1 B) Fr, 1.Grö 15,9~14,7~15,3, 2.Ind 92:96:104, C) St 1.Grö 9,9~5,6~7,3, 2.Ind 56:73:130

1.1a, Typ eiförmig, Gewöhnlich Schlehe, Abb Fr-2Za: 2/26; St+LBl-3Za: 4a/1, 3 E

Die Früchte sind mehr oder weniger eiförmig (bis 17,1 ~ 15,0 ~ 15,3). Ind LBl 29,5 %; Ind Spreite 33,5 %. St länglich symmetrisch, größte Dicke nach einem Viertel und zum NbEd lang-spitze Form, StEd abgerundet, Fl flach, feingrbg, Größe bis 12,0 ~ 6,0 ~ 8,1 mm. Indizes z.B. 50 : 68 : 135. Auffällig braunrote KBl. Gebüsche bilden kaum durchdringbare Dickichte. Selten, Fundmeldung erbeten.

3 Expl, A) Ind LBl 29 (28-30)%; Ind Sprei 33,5 % (33-34) %, B) Fr, 1. Grö 16,4 (14,7-17,1) ~14,4 (13,7-15,0) ~ 14,8 (14,1-15,3), 2. Ind 88 (83-93): 90 (87-96) : 103 (102-105), C St, 1. Grö 12,3 (11,3-13,5) ~ 6,0 (5,5-6,4) ~7,9 (7,2-8,4), 2. Ind 49 (47-50) :64 (62-68) : 132 (131-135).

1.1b, Typ Gew Schlehe, rdl St, Abb Fr-37N: 2/28 + St u Lbl-20N: 4a/ 2 , 11

Beispiel 20 N : FrGrö 13,7 ~ 15,1 ~ 15,8. Die Steine sind rundlich und haben die größte Breite in der Mitte der Länge. Ind der LBl 41 %; Ind der Spreite 47 %. StGrö 9,2 ~ 7,0 ~ 8,9 mm, Inds 76 : 97 : 127. 6 nBG, 3 dBG,

9 Expl, A) Ind LBl 41,3 (35-55 %); Ind der Sprei 48,5 % (39-63) %, B) Fr, 1.Grö 13,9 (11,0-15,5) ~ 14,0 (11,3-15,4) ~ 14,4 (11,6-15,8), 2. Ind 101 (91-110) : 104 (97-115) : 103 (100-106), C) St, 1. Grö 9,2 (7,8-11,8) ~ 6,0 (5,4-7,0) ~ 7,6 (6,9-8,9), 2. Ind 65 (50-76) : 83 (63-97) : 127 (121-136);

1.1c, Typ Gewöhnliche Schlehe, eiförmiger Stein, Abb-79 W: St 4a/3 4 Expl.

Die Steine sind eiförmig und haben die größte Breite nach einem Viertel der Länge. Sie sind am NbEd deutlich dünner als am StEd , Beispiel 4 Za :FrGrö 15,0 ~ 14,3 ~ 15,2 mm, StGrö 10,1 ~ 5,9 ~ 7,9 mm. Indizes der LBl 32 %; Sprei 36 % und der Steine 58 : 78 : 134. 3 nBG, 1 euBG...

4 Expl, A) Ind LBl 31,6 (25-43)%; Ind Sprei 42,1 (30-57) %, B) Fr, 1. Grö 14,4 (14,2-15,6) ~ 13,2 (12,3-14,3) ~ 13,7 (12,6-15,2), 2. Ind 92 (89-95) : 95 (89-101) : 104 (100-106), C) St, 1. Grö 9,8 (9,5-10,1) ~ 5,8 (5,6-5,9) ~ 7,5 (7,1-7,9), 2. Ind 59 (57-60) 77 (73-78) : 129 (127-134):

1.1d, Sorte Gew. Schlehe schöne kugelige Blüte, Abb St-21 W: 4a/4 2 Expl

Blüht auch voll sonnig erst während der Laubentfaltung. Die Blüten kommen aus dick-kugeligen schönen Knospen; 2 nBG.

Beispiel: 20 W, Sorte Gew. Schlehe mit kugelig Knospe, Bälau, Lbg, LBl: grau-grün-glzd, lanz, anlg ges, keilfg + 4,9/1,0 + 2,0 + 41/51 % + 1/1. Fr: 5 + A10 + 17,2~15,5~16,3 + 90 : 95 : 105, St: 10,4~5,6~7,2 + 54 : 69 : 129, St eifg, Fl fast glatt. Blüte ansehnlich, Frucht tropfenförmig

1.1e, Sorte s früh blühde Gew Schlehe. Blü s klein, Abb St-18 W: 4a/ 5 2 Expl.

Beispiel 18 W, LBl: graugrün, lanz, anlg-ges, keilfg + 3,5/0,5 + 1,1 + 31 /37 % 1/1. Fr: 8 + A10 + 17,3~15,7~16,9 + 91 : 98 : 108, St: 9,4~5,5~ 7,1 + 59 : 76:129, St eifg, stark hervortretende Riefen, blüht extrem früh! 2 nBG.

1.1 f, Schlehen, deren Zuordnung bislang nicht erkennbar ist 1 nBG

1.1a, Typ eiförmige Gew Schlehe, Abb Fr-2 Za: 2/26 + St u Lbl-3 Za 4a/1

2 Za, 1.1a, Wi, nBG, eifg Gewöhl. Schlehe, Knick, Weg Sußberg, Gr. Sarau, Lbg

1 Spr: 1.1 bh 2 + 1.2 + 2. 2

2 Blü: 1.1 rt-bg-w + 1.2 2 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 19.04.2015 bis 10.05.

3 LBl: dgrün, schm-ell, br-ges, abgrdt + 4,3/0,5 + 1,3 + 30 %/34 % + 1/1

4 Fr: 10 + A X + 17,1 ~ 15,0 ~ 15,3 + 88 : 89 : 102

5 St: 12,0 ~ 6,0 ~ 8,1 + 50 : 68 : 135 + St länglich symmetrisch, größte Dicke nach einem Viertel und zum NbEd lang-spitze Form, StEd abgerundet, Fl flach feingrbg. **6.** auffällig braunrote KBl

3 Za 1.1a, Wi, nBG, eifg. Gewöhnliche Schlehe, Wurzelbrut von 2 Za

1 Spr: 1.1 bh 1 + 1.2 + 2. 1

2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4. 16.04.2015 bis 26.04

3 LBl: hgrün, ell, abgrdt-ges, abgrdt + 3,7/0,9 + 1,6 + 43 % /57 % + 1/1

4 Fr: 10 + A X + 17,4~14,4~15,1 + 83 : 87 : 105 -

5 St: 13,5~6,4~8,4 + 47 : 62 : 131 + ST elliptisch

6 St: kräftiger Wulst, Fl glatt

56 O, 1.1a, Wi, nBG, eifg Gewöhl Schlehe, Knick, Weg Sußberg, Gr. Sarau, Lbg

1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 5 umgewandelte Dornen

- 2 Blü: 1.1 rt-bg-w + 1.2 1 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 24.4.2015 bis 02.05.
- 3 LBl: dgrün, lanz, anlg-ges, abgrdt-keilfg + 4,5/0,6 + 1,3 + 28 %/33 % + 1/1
- 4 Fr: 10 + A X + 14,7 ~ 13,7 ~ 14,1 + 93 : 96 : 103
- 5 St: 11,3 ~ 5,5 ~ 7,2 + 49 : 64 : 131, St wie 2 Z
- 1.1b, Typ Gew Schlehe, rdl. Stein, gr Di bei Hälfte, Abb St + Lbl-20 N: 4a/2**
Gebüsch **48c N, 1.1b**, nBG, Wi, Gew Schlehen mit rdl Stein, B 208, Ahrensfelde,
bilden Dickicht
- 48c W, :N 1 1 1 bh1 + 1.2. bh2 + 2. 2**
- 2 Blü: 1.1 w + 2.1. 1 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 18.4.2015 bis 22.4.
- 3 LBl: mgrün, lanz, grob-ges, keilfg + 5,2/1,3 + 2,1 + 40 %/54 % + 1/1
- 4 Fr: 3 + M X + 14,6 ~ 13,3 ~ 14,1 + 91 : 97 : 106
- 5 St: 9,4 ~ 5,7 ~ 7,5 + 61 : 80 : 132 + Stein rdl, aber NbEd rundlich spitz,
s. lange StBl
- 48c O, N : Spr: 1 1.1 ka + 1.2 bh2 + 2. 5**
2.4: 18.04.2015 bis 22.04
- 3 LBl: dgrün, abgrdt + 6,6/1,0 + 4,0 + 71 %/71 % + 2/2
- 54e W, 1.1b, Wi, dBG, Gewönl. Schlehe mit rdl Stein, A. Kalesse, Berlin-Gatow**
- 1 Spr: 1.1 s. kurz bh + 1.2 + 2. 4
- 2 Blü: 1,1 bw + 1.2 2 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 23.04.2015 bis 10.05.
- 3 LBl: graugrün, schmal-verk.eif, stumpf-ges, keilf + 4,6/0,6 + 1,8 + 39 /45%
+ 2/1
- 4 Fr: 5 + X + 13,1~13,0~13,8 + 99 : 105 : 106
- 5 St: 9,3~5,9~8,0 + 63 : 86 : 136 + St eiförmig
- 6 Frucht mit Pflaumenfalte
- 32 S 1.1b, Wi, nBG, Gewönl Schlehe mit rdl Stein, Eckernförde-Borby**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 3 bildet Dickichte
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 15.04.2015 bis 21.04.
- 3 LBl: mgrün, lanz, ges, keilf + 4,3/0,5 + 1,5 + 35 %/39 % + ka/1
- 4 Fr: 10 + A X + 13,2 ~ 13,5 ~ 13,8 + 102 : 105 : 102
- 5 St: 8,3~6,0~7,4 + 72 : 89 : 123 + St rundlich, Wulst schwach, Fl glatt
- 6 auffällig gelbbraune KBl, s.lange StBl
- 43 W, 1.1b, Wi, nBG, Gew Schlehe mit rdl Stein, Kl. Zecher, Lbg**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 3
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 27.04.2015 bis 04.05.
- 3 LBl: gelbgrün, lanz, ges, abger + 4,0/0,6 + 1,6 + 40 %/47 % + ka/1
- 4 Fr: 6 + A X + 11,0 ~ 11,3 ~ 11,6 + 103 : 105 + 103
- 5 St: 7,8~5,7~6,9 + 73 : 88 : 121 + St dick-rundlich, Fl zierlich feingrubig
- 20 N, 1.1b, Wi, nBG, Gew Schlehe mit rdl Stein, Weg Lassahn-Bernstorff, NW-M**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh2 + 2. 5
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 21.04.2015 bis 01.05.
- 3 LBl: grau-dgrün, lanz, ges, keilfg + 4,4/0.6 + 1,8 + 41/47 % + ka/1
- 4 Fr: 9 + A X + 13,7 ~ 15,1 ~ 15,8 + 110 : 115 : 105
- 5 St: 9,2 ~ 7,0 ~ 8,9 + 76:97:127 + St rundlich, Fl flach feingrbg gerieft,
BNt kräftig

- 53 N, 1.1b, Wi, dBG, Gew Schlehe mit rdl Stein, Mainzer Südbhf, C. Weinrich, "Ahornblatt", Mainz**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 2
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3-4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3
2.4 23.04.2015 bis 04.05.
 - 3 LBl: mgrün, lanz, ges, abger + 4,4/0,6 + 2,4 + 55 %/63 % + 1/2
 - 4 bis 6 wie 54 N
- 54 N, 1.1b, Wi, dBG, Gew Schlehe mit rdl Stein, Mainzer Südbhf, C. Weinrich**
- 1 Spr:1.1 ka + 1,2 bh2 + 2. 3
 - 2 Blü:1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3
2.4 21.04.2015 bis 04.05.
 - 3 LBl: mgrün-glzd, ell, stumpf-ges, keilf + 5,0/0,8 + 2,2 + 44 /52 % + 3/3
 - 4 Fr: 5 + X + 15,5 ~ 15,1 ~ 15,1 + 97 : 97 : 100
 - 5 St: 9,1 ~ 5,4 ~ 7,2 + 59 : 79 : 133 + St rundlich
 - 6 starke Gerbsäuren, extrem adstringierend, KBl leuchtend rot
- 2 O, 1.1b, Wi, nBG, Gew Schlehe mit rdl Stein, Parkplatz Mölln-Nord**
- 1 Spr:1.1 ka + 1.2 + 2. 2, bildet Dickichte
 - 2 Blü:1.1 w + 1.2 1! + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 28.03.2015 bis 15.04.
 - 3 LBl: mgrün, br-lanz, ges, keilfg + 6,3/0,8 + 2,5 + 40 %/45 % + 1/1
 - 4 Fr: 10 + A X + 15,4 ~ 15,4 ~ 15,4 + 100 : 100 : 100
 - 5 St: 11,8 ~ 5,9 ~ 7,4 + 50 : 63 : 125, St rdlch, Fl jeweils 2 Riefen
 - 6 Gehölz bildet ein starkes Dickicht, blüht sehr früh
- 78 W, 1.1b, Wi, euBG, Gewöhl Schlehe mit rdl Stein, Morwenstow, Cornwall, UK**
- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 + 2. 3
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 26.04.2015 bis 03.05.
 - 3 LBl: dgrün, lanz, ges, abger + 4,3/0,6 + 1,5 + 35 %/41% + 1/1
 - 4 Fr: 5 + X + 14,6 ~ 15,2 ~ 15,2 + 104 : 104 : 100
 - 5 St: 8,6 ~ 6,0 ~ 7,6 + 70 : 88 : 127 + St am Stielende dick abgerundet, zum NbEd spitzer zulaufend, Flanken fein muschelrig gerieft
 - 6 Frucht recht groß, 1.2.1 ? .
- 31c Z, 1.1b, Wi, uBG, vor dem Sanddorn, Gew. Schlehe mit kürbisfg. Fr**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 5
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 20.04.2015 bis 02.03
 - 3 LBl: hgrün, spatelfg, ges, klfg + 5,8/0,8 + 2,6 + 45/52 % + 1/1
 - 4 Fr: 7 + E IX + 14,1 ~ 16,4 ~ 16,6 + 116 : 117 : 101
 - 5 St: 9,4 ~ 7,0 ~ 8,4 + 74 : 89 : 120
 - 6 Fr schwarz, wenig Hauch, ungleichmäßige Reife
- 1.1c Typ Gew Schlehe, eifg St, gr Br nach Drittel, Abb St-79 W: 4a/3**
- 4 Za, 1.1c Wi, nBG, Gew Schlehe mit eifg Stein, Knick, Bliestorf, Lbg**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 2
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 16.04.2015 bis 26.04.
 - 3 LBl: mgrün, lanz, stu-ges, keilfg + 4,4/0,5 + 1,4 + 32 %/36 % + ka/1
 - 4 Fr: 10 + E IX + 15,0 ~ 14,3 ~ 15,2 + 95 : 101 : 106
 - 5 St: 10,1 ~ 5,9 ~ 7,9 + 58 : 78 : 134, St breit eifg, Fl mittelstark grob
- 5 Za, 1.1c, Wi, nBG, Gew Schlehe mit eifg Stein, Gr Disnack, Lbg**
- 1 Spr: 1.1 bh 2 + 1.2 + 2. 3

- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 19.04.2015 bis 26.04.
- 3 LBl: graugrün, lanz, sp-ges, keilfg + 4,0/0,9 + 1,0 + 25 %/32 % + 2/2
- 4 Fr: 10 + E IX + 14,2 ~ 12,7 ~ 12,7 + 89 : 89 : 100
- 5 St: 9,5 ~ 5,7 ~ 7,4 + 60 : 78 : 130, St breit eifg, Fl flache Riefen in Lge
- 9 W, 1.1c, Wi, nBG, Gewöhnl Schlehe mit eifg Stein, Knick, Groß Disnack, Lbg**
- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 + 2. 1
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 15.04.2015 bis 22.04.
- 3 LBl: graugrün, lanz, ges, keilfg + 4,8/0,5 + 1,3 + 27 %/30 % + 3/3
- 4 Fr: 10 + A X + 13,6 ~ 12,3 ~ 12,6 + 90 : 93 : 102
- 5 St: 9,5~5,6~7,1 + 59 : 75 : 127 + St eifg mit spitzem NbEd, Fl feingrubig mit durchlaufd Riefen
- 79 W, 1.1c, Wi, euBG, Gew Schlhe, eifg. Stein, NEd spitz, Morwenstow, Cornwall**
- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 26.04.2015 bis 06.05.
- 3 LBl: dgrün, lanz, ges, keilf + 5,1/1,0 + 1,6 + 31 %/39 % + 1-ka/1
- 4 Fr: 10 + M X + 14,6 ~ 13,5 ~ 14,2 + 92 : 97 : 105
- 5 St: 10,1 ~ 5,8 ~ 7,4 + 57 : 73 : 128

1.1d Sorte s spät blühd Gew Schlehe, schöne kgl Knospe, ansehnl Blte, 2 nBG

- 20 W, 1.1d, Wi, nBG, sehr spätblhd Gew Schlehe, kugelige Knospe, Bälu, Lbg**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3-4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 26.04.2015 bis 10.05.
- 3 LBl: dgrün-glzd, lanz, anlg ges, keilfg + 7,3/1,4 + 2,8 + 38/47 % + 1/1
- 4 Fr: 5 + A X + 17,2~15,5~16,3 + 90 : 95 : 105
- 5 St: 10,4 ~ 5,6 ~ 7,2 + 54 : 69 : 129, St eifg, Fl fast glatt
- 6 Blüte ansehnlich, Frucht tropfenförmig
- 21a W, 1.1d, Wi, nBG, sehr spätblhd Gew Schlehe mit kugelg Knospe, Sportplatz, Bälu, Lbg, wie 20 W, **Abb** St-21 W: 4a/4**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.1 ka + 2. 1
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3-4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 26.04.2015 bis 10.05.
- 3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilf + 7,0/2,0 + 2,5 + 36 %/50 % + ka/1

1.1e Sorte sehr früh blühende Gewöhnliche Schlehe mit sehr kleiner Blüte

- 18 W, 1.1e, Wi, nBG, sehr früh blühende Gew Schlehe, Schlagsdorf, NW-M**
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 wollig+ 2. 1, **Abb** St-18 W: 4a/5
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 1! + 1.3 s klein + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 28.03.2015 bis 10.04.
- 3 LBl: graugrün, lanz, anlg-ges, keilfg + 3,5/0,5 + 1,1 + 31 %/37 % + 1/1
- 4 Fr: 8 + A X + 17,3 ~ 15,7 ~ 16,9 + 91 : 98 : 108
- 5 St: 9,4 ~ 5,5 ~ 7,1 + 59 : 76 : 129, St eifg., stark hervortretende Riefen
- 6 blüht extrem früh!
- 19 W, 1.1e, Wi, nBG, sehr früh blühende Gew Schlehe, Schlagsdorf, NW-M**
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 wollig + 2.
- 2 Blü: 2.4 28.03..2015 bis 10.04.
- 3 Lbl: dgrün, ellipt, gekerbt, keilf + 7,1/1,0 + 2,6 + 37 %/43 % + 2/3

2015

- 4 Fr: 8 + A X + 17,3 ~ 15,7 ~ 16,9 + 91 : 98 : 108
5 St: 9,4 ~ 5,5 ~ 7,1 + 59 : 76 : 129, St eifg., stark hervortretende Riefen
6 blüht extrem früh!

2017

- 4 Fr: 6 + E IX + 15,2 ~ 13,8 ~ 13,9 + 91 : 91 ; 100,1
5 St: 9,2 ~ 5,7 ~ 7,7 + 62 : 84 : 135
6 Fr schwarz, ohne Hauch, Fr kgl.

1.1f Weitere Gewöhnliche Schlehen, Gliederung noch nicht erkennbar.

44 W, 1.1f, Wi, nBG, Gewöhnliche Schlehe, Kl Zecher, Seedorfer Weg, Lbg,

1.1a?

1 Spr: 1. bh2 + 2. 2

- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 bh0? + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 28.04,2015 bis 10.05.

3 LBl: gelbgrün, lanz, ges, keilfg + 4,7/0.4 + 1,7 + 36 %/40 % + ka/1

4 Fr: 10 + A X + 16,0 ~ 15,4 ~ 15,4 + 96 : 96 : 100, einige Früchte eifg

5 St: 8,3 ~ 4,9 ~ 6,4 + 59 : 77 : 131 + St klein, oval, BNt kräftige Riefen

1.2 Unterart Großfruchtige Schlehe, Groote Sleehn, 21 nBG, 2 dBG. 23 Expl.

Prunus spinosa ssp. *megalocarpa* Domin

BSt/FSt kahl, Frucht herbe. Fruchtgröße meist 14-18 (im sehr günstigem Herbst auf bestem Boden sogar bis 21) mm groß, die der Steine 8,3-12,5 mm lang. Kron- und Laubblätter schmal bis etwas breiter. Dickichte deutlich weniger dicht als 1.1. Selten in Knicks.

21 Expl, A) Ind LBl 40% ; Ind Sprei 47 % B) Fr, 1. Grö 16,3 (14,3-20,8) ~ 16,7 (14,3-18,4) ~ 17,4 (14,7-19,8), 2. Ind 102 (88-110)~107 (95-115)~104 (101-108), C) St, 1. Grö 9,7 (8,3-12,3) ~ 6,8 (5,5-7,4) ~ 8,6 (7,3-9,8), 2. Ind 70(48-89) : 89 (69-100) : 126 (112-153);

Vergleich der drei Formen mit der Unterart Großfruchtige Schlehe

121 B) Fr,1. Grö 17,8~16,9~17,7, 2.Ind 95:99:105, C) St,1.Grö11,0~6,4~8,6, 2. Ind 58:78:134

122 B) Fr, 1.Grö 15,6~16,2~16,6, 2.Ind 104:106:102,C)St 1.Grö 9,4~6,5~8,6, 2.Ind 69:91:132

123 B) Fr, 1.Grö 15,6~17,1~18,0,2.Ind 102:107:104,C)St, 1.Grö 9,7~6,8~8,6,2.Ind 86:99:115

12 B) Fr, 1.Grö 16,3~16,7~17,4, 2.Ind102:107:104, C)St,1.Grö 10,0~6,6~8,6,2.Ind 66:86:130

1.2.1. Typ typ Größfr Schl, 17nBG, 2dBG, Abb St u Lbl-29N:4a/6 14 Expl.

Der Stein ist 11,0~ 5,5 ~ 8,4 mm, Indizes 48 : 73 : 153. Ind LBl/Sprei 35/40 %, 12 nBG, 2dBG. Hier auch 1.2.1.9, Steine nur vom Bstd Süd, Heide, Dithm

15 Expl A Ind LBl 36% (31-57 %); Ind Sprei 43 % (37-68%), B) Fr, 1. Grö 17,8 (15,2-20,8) ~16,9 (14,7-18,4) ~17,7 (15,2-19,8), 2. Ind 95 (88-100) : 99 (95-104) : 105 (101-108), C) St, 1. Grö 11,0 (9,7-12,3) ~ 6,4 (5,5~7,0) ~ 8,6 (7,3-9,8), 2. Ind 58 (48-63) : 78 (69-84) : 134 (127-1

1.2.2 Typ Größfrchtg Schlhe, rdl St, Abb Fr-37N:2/28; St u LBl-36N: 4a/7 4 E

Beispiel 35 N : StGrö 9,0 ~ 6,6 ~ 8,2 mm, Indizes 73 : 91 : 124, St oval- rundlich, zierlich gerieft.LBl 37 %; Sprei 45 %

4 Expl, A) Ind LBl 35% (32-37%); Ind Sprei 41 % (36-45%) B) Fr, 1.Grö 15,6 (14,3-16,4) ~16,2 (14,3-17,8) ~16,6 (14,7-18,4), 2. Ind 104 (95-109) : 106 (101-112) : 102 (101-103), C) St, 1. Grö 9,4 (8,3-10,9) ~ 6,5 (6,0-6,8) ~ 8,6 (7,6-9,7), 2. Ind 69 (62-73): 91 (89-95) : 132 (124-143);.

1.2.3 Typ brtbltrg Grßfrchtg Schlehe, kglg St, Abb St u LBl-33N: 4a/8,2 Expl

Beispiel 32 N : StGrö 8,9 ~ 7,3 ~ 8,7 mm, Indizes 82 : 98 : 119, St kugelig, zierlich gerieft bis gemuschelt. LBl 52 %; Sprei 60 %

2 Expl, A) Ind LBl 47% (41 – 52); Ind Sprei 55 % (48 – 60 %),. B) Fr, 1. Grö 15,6 15,6) ~ 17,1 17,0-17,2)~18,0 (17,9-18,0), 2. Ind 110 (109-110) : 115 : 105, C) St, 1, Grö 8,6 (8,3-8,9) ~7,4 (7,3-7,4) ~ 8,5 (8,3-8,7), 2. Ind 86 (82- 89) : 99 (98-100) : 115 (112 : 119)

1.2.1, Typ typGrßfr Schlh, Abb Fr-24aZ: 1/20; St u Lbl-29N: 4a/6, 16Expl

60 N, 1.2.1, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Dickicht, B208, Ahrensfelde, Stormarn

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 1

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 15.04.2015 bis 26.04.

3 LBl: hgrün, lanz, ges, keilfg + 6,5/1,0 + 2,2 + 34 % /40 % + 2/2

4 Fr: 5+A X + 16,7 ~ 15,5 ~ 15,9 + 93 : 95 : 103

5 St: 10,6~6,4~8,1 + 60 : 76 : 127 + St linsig, beim StEd abgerundet, zum NbEd spitz, Fl mit starken Riefen (n.n.reif?)

31 S, 1.2.1, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, B 76, Altenhof, Eckernförde

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 2 bildet Dickichte

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 15.04.2015 bis 21.04.

3 LBl: gelbgrün, lanz, ges, lg-keilf + 4,6/0,6 + 1,5 + 33 %/38 % + ka/1

4 Fr: 9 + A X + 15,2 ~ 14,7 ~ 15,2 + 97 : 100 : 103

5 St: 10,2~6,2~7,9 + 61 : 77 : 127 + St eiförmig-bis NbEd spitz, Fl zierlich

6 StBl sehr lang

55 O, 1.2.1, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Am Steinkamp, Bäk, Lbg

1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 + 2. 2, umgewandelte Dornen

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 1.4 3a + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3
2.4 24.04.2015 bis 03.05.

3 LBl: dgrün-glzd, verk-eifg, ges, keilf + 6,3/1,0 + 3,6 + 57/68 % + ka/1

4 Fr: 3 + - + 16,5 ~ 15,3 ~ 16,0 + 93 : 97 : 105

5 St: 9,7 ~ 5,5 ~ 7,3 + 57 : 75 : 133 + St klein eifg, NbEd spitz

18 N, 1.2.1, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe mit eifg Stein, Gr. Sarau, Lbg

1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 1

2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 22.04.2015 bis 03.05.

3 LBl: dgrün-glzd, verk-eif-lanz, ges, lg-keilfg + 7,2/1,6 + 2,5 + 35/45%+ ka/1

4 Fr: 7 + A X + 17,4 ~ 17,2 ~ 18,1 + 99 : 104 : 105

5 St: 10,2 ~ 6,4 ~ 8,2 + 63 : 80 : 128 + St dick eiförmig, Fl fast glatt

6 Baum breit ausladend

19 N, 1.2. 1, Wi, nBG, Grfrtg Schlehe mit eifg Stein, Gr.-Sarau, Lbg

1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 bh3 + 2.

2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 2 +
2.4 20.04.2015 bis 03.05.

3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, stumpf ges, keilfg-rdl+5,5/0,8+2,3+42/49%+ ka/3

4 Fr: 4 + A X + 17,9 ~ 17,3 ~ 18,2 + 97 : 102 : 105

5 St: 10,2 ~ 6,4 ~ 8,1 + 63 : 79 : 127 + St dick eifg, Fl fast ganz glatt

6 Baum breit ausladend

- 22 S, 1.2. 1, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Bestd Nord, Heide, Dithm**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 2
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 1-2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3
2.4 25.04.2015 bis 08.05.
 - 3 LBl: graugrün, ell, br-ges, keilfg + 5,1/1,0 + 1,6 + 31%/39% + ka/1
 - 4 Fr: 5 + A X + 19,5 ~ 18,1 ~ 19,6 + 93 : 101 : 108
 - 5 St: 11,3 ~ 6,6 ~ 9,1 + 58 : 81 : 138 + St breit eifg, Flanken stark grubig (noch .nicht .reif?),
 - 6 Frucht tropfenförmig, sehr stark adstringierend
- 24a Z, 1.2. 1, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Bstd Süd, Heide, Dithm**
- 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 + 2. 1
 - 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 26.04.2015 bis 02.05.
 - 3 LBl: dgrün, verk-eif, anlg-ges, keilfg + 4,8/0,6 + 1,7 + 35/40% + 1/1
 - 4 Fr: 10 + M IX + 17,6 ~ 16,9 ~ 17,8 + 96 : 101 : 105
 - 5 St: 11,5 ~ 5,5~8,4 + 48 : 73 : 153
- 5 N, 1.2. 1, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Bstd Süd, Heide, Dithm**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh2 + 2. 3 umgewandelte Dornen
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 6 + 1.4 3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 qrl
2.4 24.04.2015 bis 04.05.
 - 3 LBl: dgrün-glzd, lanz, anlg-ges, keilfg + 5,7/1,1 + 2,1 + 37/46% + 2/1
 - 4 Fr: 10 + M X + 17,9 ~ 17,1 ~ 18,1 + 96 : 101 : 106
 - 5 St: 10,7 ~ 6,6 ~ 8,9 + 62 : 83 : 135, + St rdl bis brt linsig, Fl stielbe-
tonte Riefen, feingrbg
 - 6 Frucht am Baum in I/2014 noch verwertbar! BlüBl außen breit, so
schmückend
- 28 N, 1.2. 1, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Bstd Süd, Heide, Dithm**
- 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 + 2. 1
 - 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 03.05.
 - 3 LBl: dgrün-glzd, lanz, ges, lg-keilfg + 6,5/1,1 + 2,0 + 31/37% + 1/1
 - 4 Fr: 10 + A X + 19,8 ~ 18,3 ~ 19,5 + 92 : 98 : 107
 - 5 St: 11,1 ~ 6,2~8,6 + 56 : 77 : 139 + St breit oval, zum NbEd spitz, stark
hervortretende Riefen vom Stiel aus (noch .nicht .reif?)
- 29 N, 1.2. 1, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Bstd Süd, Heide, Dithm**
- 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 ka + 2. 1
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 07.05.
 - 3 Lbl: dgrün-glzd, lanzettlich, ges, keilfg + 4,2/0,6 + 1,6 + 38/44% + 1/2
 - 4 Fr: 4 + A X + 19,2 ~ 17,4 ~ 18,6 + 91 : 97 : 107
 - 5 St: 11,2 ~ 6,7 ~ 8,7 + 60 : 78 : 130 + St breit verkehrt eifg, stark
hervortretende Riefen vom Stiel aus (noch nicht .reif?)
- 30 N, 1.2. 1, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Bstd Süd, Heide, Dithm**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 05.05.
 - 3 Lbl: dgrün-glz, ellipt, ges, keilfg + 6,2/1,6 + 2,3 + 37%/59% + ka/1
 - 4 Fr: 4 + A X + 20,8 ~ 18,4 ~ 19,8 + 88 : 95 : 108
 - 5 St: 12,3~6,8~9,8 + 55 : 80 : 144 + St groß, s breit linsig, Fl mit stark
hervortretenden Riefen vom Stiel aus (noch.nicht. Reif?)

- 21 N, 1.2. 1,** Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Weg Lassahn-Bernstorff, NW-M
- 1 Spr: 1.1 ka + 1,2 + 2. 1
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 19.04.2015 bis 03.05.
 - 3 LBl: grau-dgrün, lanz, lg-ges, keilfg + 8,3/1,4 + 3,0 + 36/43 % + 1/1
 - 4 Fr: 1 + A X + 16,0~15,6~15,8 + 98 : 99 : 101
 - 5 St: 11,5~6,2~7,9 + 54 : 69 : 127 + St eiförmig, feingrbg in Längsrichtung
 - 6 Baum breit ausladend
- 59 W, 1.2. 1,** Wi, dBG, typ Grfrtg Schlehe, "Nittel S", E.Kiefer, Ortenberg, BD, Utlg
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh1 + 2. 3
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 18.04 2015 bis 01.05.
 - 3 LBl: dgrün, lanz, anlg-ges, keilfg + 3,9/0,5 + 1,4 + 36/41 % + ka/1
 - 4 Fr: 10 + M X + 17,1~17,1~17,4 + 100 : 102 : 102
 - 5 St: 11,7~6,7~9,8 + 57 : 84 : 146 + St breitdick-oval, Riefen vom Stiel aus, Narbenteil feingrbg
 - 6 sehr stark adstringierend, Gehölz bildet Dickichte
- 60 W, 1.2. 1,** Wi, dBG, typ Grfrtg Schlehe, "Merzig S", Kiefer, Ortenbg, BD, Utlg 2
- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1,2 + 2. 3
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 22.04.2015 bis 03.05.
 - 3 LBl: graugrün, lanz, ges, abger + 3,5/0,6 + 1,3 + 37%/45 % + ka/1
 - 4 Fr: 10 + M X + 18,0~17,2~17,5 + 96 : 97 : 102
 - 5 St: 1,9~7,0~9,8 + 59 : 82 : 140 + St breitdick-oval, Fl mit stark hervortretenden Riefen vom Stiel aus (noch.nicht.reif?), feingrubig
 - 6 sehr stark adstringierend, Gehölz bildet Dickichte
- 26 S, 1.2.1,** Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Schmilau , Lbg, neue Wurzelbrut
- 1 Spr: 1.1 ka 1.2 bh2 + 2. bildet Dickichte
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 1- + 2.1 ka + 2.2 a- + 2.3 qul
2.4. 24.04.2015 06.05.
 - 3 LBl: mgrün-glzd, lanz, anlg-ges, abger + 4,4/0,5 + 1,6 + 36/41 % + 2/2
 - 6 BlüBl sehr kurz, millionen Blüten
- 17 N 1.2.1** Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe Schmilau , Lbg
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh2 + 2. 5
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 22.04.2015 bis 03.05.
 - 3 LBl: graugrün, ell, br-ges, lg-keilfg + 5,6/1,2 + 2,0 + 36/45 % + 1/1
 - 4 Fr: 8 + A X + 13,9~13,4~13,6 + 96 : 98 : 101
 - 5 St: 9,5~5,5~7,5 + 58 : 79 : 136 + St klein, StEd rundlich, NbEd spitz, Fl mit kleinen Riefen bis zur Hälfte, sonst feingrb
- 1.2.1.9,** Sämling von 1.2.1, Steine nur vom Bstd Süd, Heide, Dithm **2 nBG**
- * A) Ind LBl 37,5 (37-38) B) Fr, 1. Grö 16,1-18,8 ~ 16,3-18,1 ~ 16,4-18,9, 2. Ind 96-101 : 101-102 : 101-104, C) St, 1. Grö 10,8 (9,5-12,1) ~ 6,6 (6,0-7,1) ~ 8,8 (7,8-9,7), 2. Ind 61 (59-63) : 81 (80-82) : 133,5 (130-137)**
- 58 W, 1.2.1.9,** Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Bstd Süd, Heide, Dithm, Slg
- 1 Spr: 1.1 ka 1.2 bh1? + 2.
 - 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 10.05.
 - 3 LBl: dgrün-glzd, lanz , ges, keilfg + 6,0/1,0 + 2,2 + 37%/44 % + 1/1

- 4 Fr: 9 + A X + 18,8 ~ 18,1 ~ 18,9 + 96 : 101 : 104
- 5 St: 12,1~7,1~9,7 + 59 : 80 : 137 + St breit oval, stark hervortretende Riefen (noch.nicht .reif?)
- 6 sehr stark adstringierend, viele Dornen zu Kurztrieben
- 82 W, 1.2.1.9, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Bstd Süd, Heide, Dthm, Slg**
- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz 1.2 + 2.
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 1-2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 10.05.
- 3 LBl: hgrün, verk-eifg, ges, eifg + 5,5/0,7 + 2,1 + 38%/44% +ka/1
- 2015 4 Fr: 4 + A X + 16.1 ~ 16.3 ~ 16.4 + 101 : 102 : 101**
- 5 St: 9,5~6,0~7,8 + 63: 82 : 130 + St klein, eifg, BNt kräftig, Fl zierlich gerieft/gemuschelt
- 6 frühe gleichmäßige Beduftung, stark adstringierend
- 2017**
- 4 Fr: 6 + E IX + 13,4~ 13 4 ~13,4 + 100 : 100 : 100
- 5 St 9,7 ~ 5,9 ~ 7,9 + 61 : 81 : 134
- 6 Fr schwarz, ohne Hauch, ungleichmäßig reif , kgl

1.2.2, Typ Grfrtg Schlehe, rdl St, Abb Fr-37N: 2/28; St u LBl-36 N: 4a/7 4 nBG

- 34 N, 1.2. 2, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Zarrentin 1, NW-M**
- 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 bh2 + 2. 5 viele umgewandelte Triebe
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 bh0 + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 02.05.
- 3 LBl: dgrün-glzd, lanz, ges, abgrdt + 4,2/0,6 + 1,5 + 36/42% + 3/1
- 4 Fr: 4 + A X + 14,3 ~ 14,3 ~ 14,7 + 100 : 103 : 103
- 5 St: 8,3~6,0~7,6 + 72 : 92 : 27 + St klein, ovalrdl, zierlich gerieft
- 6 Früchte E X mit schönem kräftigem Blau!
- 35 N, 1.2. 2, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Zarrentin 1, NW-M**
- 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 bh2 + 2. 5 viele umgewandelte Triebe
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 01.05.
- 3 LBl: dgrün-glzd, ell, brt-ges, keilfg + 4,9/0,9 + 1,8 + 37%/45% + 4/2
- 4 Fr: 10 + M X + 16,0 ~ 15,9 ~ 16,2 + 99 : 101 : 102
- 5 St: 9,0~6,6~8,2 + 73 : 91 : 124, + St oval-rundlich, zierlich gerieft
- 6 Früchte E X mit schönem kräftigem Blau!
- 36 N, 1.2. 2, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Zarrentin 2, NW-M**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 5
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 01.05.
- 3 LBl: mgrün, lanz, anlg-ges, keilfg + 4,7/0,5 + 1,5 + 32/36% + ka/1
- 4 Fr: 10 + M X + 16,4 ~ 17,8 ~ 18,4 + 109 : 112 : 103
- 5 St: 10,9 ~ 6,8 ~ 9,7 + 62 : 89: 143 + St oval-rundlich, stark gerieft
- 6 Früchte E X mit schönem kräftigem Blau!
- 37 N, 1.2. 2, Wi, nBG, typ Grfrtg Schlehe, Zarrentin 2, NW-M**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 3
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 a 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 02.05.
- 3 LBl: mgrün, lanz, anlg-ges, keilfg + 4,7/0,6 + 1,5 + 32/37% + ka/1
- 4 Fr: 7 + A X + 15,6 ~ 16,8 ~ 16,9 + 108 : 108 : 101
- 5 St: 9,2 ~ 6,5 ~ 8,7 + 71 : 95 : 134 + St rundlich, zierlich gerieft

6 Früchte E X mit schönem kräftigem Blau!

1.2.3 Typ breitblättrig Grfrt Schlehe, kglg Stein, Abb St u Lbl-33 N: 4a/8, 2 Expl

32 N, 1.2. 3, Wi, nBG, br-blättrige Grfrtg Schlehe, kgl St, Marienstedt, Lbg

1 Spr: 1.1 bh2 s kurz + 1.2 + 2. 4 viele in Triebe umgewandelt

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 25.04.2015 bis 03.05.

3 Lbl: dgrün, eif, stu-ges, abgrdt + 6,1/0,8 + 3,2 + 52%/60% + 1/1

4 Fr: 10 + A X + 15,6 ~ 17,0 ~ 17,9 + 109 : 115 : 105

5 St: 8,9~7,3~8,7 + 82 : 98 : 119, St kugelig, gerieft bis gemuschelt

33 N, 1.2. 3, Wi, nBG, br-blättrige Grfrtg Schlehe, kgl St, Marienstedt, Lbg

1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 bh2 s kurz + 2. 4 viele in Triebe umgewandelt

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 02.05.

3 Lbl: dgrün-gld, ellipt, ges, keilfg + 5,6/0,8 + 2,3 + 41%/48% + 2/2

4 Fr: 10 + A X + 15,6 ~ 17,2 ~ 18,0 + 110 : 115 : 105

5 St: 8,3~7,4~8,3 + 89 : 100 : 112, St kugelig, zierlich gerieft/gemuschelt

1.3 Unterart Filzige Schlehe, Pr. sp. ssp. *dasyphylla* Domin, 5 nBG, 2 dBG, 7 Expl.

Bei filzigen Schlehen ist der Blüten-/Fruchtstiel stark, wenn auch nur kurz behaart. Das gilt auch für die jungen Sprosse und die Unterseite der Laubblätter. Die Unterart kommt im nBG nur selten vor. Fundmeldungen wichtig! 5 nBG,

4 Expl, A) Ind Lbl 36,3 % ; Ind Sprei 42,7% B) Fr, 1. Grö 16,4 (13,4-18,) ~ 15,9 (12,3-18,3) ~ 16,3 (12,4-19,1), 2. Ind 97 (90-101) : 99 (90-103) : 103 (101-104), C) St, 1. Grö 10,4 (8,3-12,1) ~ 6,0 (5,4-7,4) ~ 8,1 (6,5-9,0), 2. Ind 58 (48-82) : 78 (70-100) : 135 (120-147);

Vergleich 1.3.1 und 1.3.2 mit der Unterart 1.3 Filzige Schlehe

131 B) Fr, 1. Grö 14,2~13,4~13,5, 2. Ind 94:95:101, C) St, 1. Grö 8,7~6,1~7,6, 2. Ind 70:87:125

132 B) Fr, 1. Grö 18,6~18,3~19,1, 2. Ind 98:103:104, C) St, 1. Grö 12,1~5,8~8,5, 2. Ind 48:70:147

1.3 B) Fr, 1. Grö 16,4~15,9~16,3, 2. Ind 97:99:103, C) St, 1. Grö 10,4~6,0~8,1, 2. Ind 58:78:135

1.3.1 Variante kleine Filzige Schlehe

4 nBG, 2 dBG, 6 Expl

1.3.1.1, Typ klblättrige kleine Filzige Schlehe, Abb St + Lbl-13 W: 4a/9a 2 Expl.

2 Expl. A) Ind, Lbl 38% (34- 42%); Ind Sprei 44,5 % (42-47%) B) Fr, 1. Grö 13,9 (13,4-14,3) ~ 12,6 (12,3-12,8) ~ 12,7 (12,4-12,9), 2. Ind 91 (90-91) : 91 (90-93) : 101, C) St, 1. Grö 8,6 (8,3-8,8)~5,5 (5,4-5,6)~6,9 (6,5-7,3), 2. Ind 64 (63-65): 80 (78-83) : 125 (120-130); 2 nBG.

50 N, 1.3.1.1, Wi, nBG kl bl. kl. Filzg Schlehe, H. U. Piontkowski, Eckernförde

1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 bh4 + 2. 2 bildet Dickicht

2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 2 + 2.1 bh2 + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 10.04.2015 bis 24.04.

3 Lbl: gelbgrün, ell, br-ges, keilfg + 5,2/0,5 + 2,2 + 42/47% + 4/4

4 Fr: 10 + M X + 13,4 ~ 12,3 ~ 12,4 + 91 : 93 : 101

5 St.: 8,3 ~ 5,4 ~ 6,5 + 65 : 78 : 120 + St s klein, eiförmig, zum NbEd spitz, StEd abgrdt, Fl zierlich gerieft

6 leuchtend gelbe Blütenknospen, schmale Kronblätter, s. lange StBl

13 W, 1.3.1.1, Wi, nBG, kl bl kl Filz Schlehe, Knick, Satrup, Angeln

1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 2

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 1! + 1.3 s klein + 2.1 bh3 + 2.2 b + 2.3 eiz

2.4 09.04.2015 bis 20.04.

- 3 LBl: mgrün, lanz, stu-ges, keilfg + 5,8/1,0 + 2,0 + 34%/42% + 3/4
4 Fr: 10 + A X + 14,3 ~ 12,8 ~ 12,9 + 90 : 90 : 101, blüht sehr früh
5 St: 8,8 ~ 5,6 ~ 7,3 + 63 : 83 : 130 + St wie 50 N

1.3.1.2, Typ großblättrig kl Filzg Schlehe, Abb St + Lbl-31b2 Z: 4a/9b, 4 Expl

Zwei Büsche vorhanden bei H. L. Kramp, Weden, NW-Mecklenburg

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 wollig + 2. 1
3 LBl: oben matt mgrün, unten graugrün, ellipt, fein ges, lg keilfg + 7,2/1,2 + 3,4 + 33/40% + 4/wollig
4 Fr: 7 + X + 14,8~15,0~15,2 + 101 : 103 : 101 + Fstieglg 1,1
5 St: 9,0~7,4~9,0 + 82 : 100 : 122
6 FrStiel 0,9 cm
31b1.2 Z, 1.3.1.2, Wi, nBG, grblättrige kl. Flzg Schlehe, H.L.Kramp,Weden,NW-M
1 Spr: 1.1 + 1.2 3 + 2
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 bh2 s kurz + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 15.04.2016 - 22.04.
3 LBl: mgrün, ell, ges, gerdt + 3,8/0,4 + 1,7 + 45/50% + 4/4
4 Fr: 7 + E IX + 11,6 ~ 11,2 ~ 11,3 + 97 : 97 : 100,8
5 St: 9,4 ~ 5,8 ~ 7,3 + 62 : 78 : 126
6 Fr schwarz, ohne Hauch, kgl

31b1.3, Z, 1.3.1.2, Wi, nBG, wie b1.2 Z

- 1 Spr: 1 + 1.2 3 + 2
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 3 2.1 ? 2.2 c + 2.3 eiz
3 LBl: mgrün, ell, ges, gerdt + 6,1/0,4 + 2,3 + 38/40% + 4/4
4 Fr: 7 + E IX + 11,3 ~ 11,7 ~ 11,7 + 104 : 104 : 100
5 St: 8,1 ~ 5,2 ~ 6,5 + 64 : 80 : 125
6 Fr schwarz, ohne Hauch, ungleichfg reif, kgl

31b2 Z, 1.3.1.2, Wi, dBG, großblättrige kl Flzge Schlehe, Berlin-Gatow, A. Kalesse, Billstedter Pfad, 13591 Berlin-Spandau

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 wollig + 2
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 bh3? + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 15.04.2016 - . 29.04.
3 LBl: mgrün, ellipt, ges, keilfg + 6,1/0,8 + 4,0 + 66/75% + wollig/wollig
LBl kräftig, unterseits stark gerieft

31b3 Z, 1.3.1.2, wie 31b2 Z

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 2 + 1.2 0
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 1 + 1.4 1 + 2.1 bh3 + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 18.04. 2016 -
3 LBl: hgrün, ell, ges, keilf + 5,2/0,5 + 3,1 + 60/66% + 2/2

1.3.2, var. Gr Filzg Schlehe, var. supradensa, Abb Fr-23Z: 1/1; St + Lbl-23 Z: 4a/10

A) Ind LBl 33 %; Ind Sprei 39 % Fr, 1. Grö 18,6 ~ 18,3 ~ 19,1 2. Ind 98 : 103 : 104 C) St, 1. Grö 12,1 ~ 5,8 ~ 8,5 2. Ind 48 : 70 : 147

23 Z, 1.3. 2, Wi, nBG, Große Filzige Schlehe, Hass & Hatje, RZ-Neuvorwerk

- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 2
2 Blü: 1.1 bw + 1.2 1 + 1.3 2 + 2.1 bh2 + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 14.04.2015 bis 24.04.
3 LBl: mgrün-glzd, lanz, anlg-ges, keilfg + 5,2/0,8 + 1,7 + 33/39% + ka/2
4 Fr: 10 + M IX + 18,6~18,3~19,1 + 98 : 103 : 104, Größe 2014 20,9 mm

- 5 St: 12,1 ~ 5,8 ~ 8,5 + 48 : 70 : 147 + St breit eifg, StEd abgerdt, NbEd mäßig spitz, Fl stark hervortretende Riefen, grobgrubig (n.nicht.reif?)
 6 sehr späte Beduftung, Fruchtmumien des Vorjahres bis Blühbeginn

A2) Gruppe milde Wildschlehe

1 dBG

1.4 Unterart kl Milde Schlehe, Pr. sp. ssp.moravica, Abb St + Lbl-76W: 4a/11
 Milde Schlehe hat weniger Gerbsäure. Sie wirkt also nicht adstringierend, ist aber auch sehr herbe. Sie dürfte in Norddeutschland kaum vorkommen.

76 W 1.4 Wi, dBG, kleine milde Schlehe, G. Staffel, Ahornblatt, Mainz,
 Pflanze aus Pillnitz, Sachsen.

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 2. 0
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
 2.4 26.04.2016 bis 03.05.
 3 Lbl: grün-gldz, ell, dop-ges, keilf + 4,5/0,5 + 2,3 + 51%/58% + 1/1
2018 4 Fr: 1 + A IX + 16,4~14,7~15,1 + 90 : 92 : 102
 5 St: 10,4~6,0~8,1 + 58 : 78 : 135
2019 4 Fr: 5 + E VIII + 17,0 ~ 16,0 ~ 16,0 + 94 : 94 : 100
 5 St: 10,5 ~ 6,4 ~ 8,5 + 61 : 81 : 133
 6 BlüBl kurz, schön abgerundet. St gerade Achse, beidendig gleich spitz, Fr kräftig, ohne Adstringenz, dunkel blauschwarz, wenig Hauch

B Gruppe Kulturschlehe

5 Expl.

Aus den grundlegenden Darlegungen über Oberösterreich von WERNECK (s.o.) werden unter pragmatischen Gesichtspunkten die Begriffe Wild- und Kulturschlehe übernommen, wobei zu der letzteren unsere sehr seltene Sorte "Hofschlehe" (s.o.) gehören dürfte. Beispiel : 7 Za, 1.81, W, Hofschlehe, Hof Johannes Kuells, Baelau, Kreis Hzgt Lbg:

Junge Sprosse behaart, fast ohne Sprossdornen. Mittelbreite frühe Kronblätter. Die ca. 10 mm langen Blüten-/Fruchtstiele sind kahl. Laubblätter 6,2 cm, davon Stiel 1,0 cm und Spreite 2,0 cm, Ind Lbl 32 %; Ind Spreite 38 %. Fruchtgröße 21,3 ~ 20,4 ~ 21,4 mm, 96 : 101 : 105 % und größer, Stein 11,8 ~ 6,3 ~ 8,9 mm. Indizes Stein 53 : 75 : 141. Der Stein ist ein wenig verkehrt-eifg, zum Narbenende spitzer, das Stielende lugt ein wenig schräg heraus, die Flanken mit Riefen vom Stiel aus, sonst feingrubig besetzt

Vergleich der Hofschlehen mit der 1.2 Großfruchtigen Schlehe

181 B) Fr,1.Grö 20,5~19,7~20,7, 2.Ind 96:101:105, C)St,1.Grö 11,1~6,3~8,5, 2.Ind 57:77:135
182 B) Fr,1.Grö 18,3~17,7~18,3, 2.Ind 96:100:103, C)St,1.Grö 10,8~6,7~8,6, 2.Ind 62:80:129
1.2 B) Fr, 1.Grö 16,3~16,7~17,4, 2.Ind 102:107:104, C)St,1.Grö 10,0~6,6~8,6, 2.Ind 66:86:130

Hofschlehe

5 nBG

Sorte 1.8.1:Großfruchtige Hofschlehe . Nach starker Adstringenz im September baut sie diese im Oktober/ November völlig ab. Es verbleiben Ende November vorzügliche milde Früchte, Abb St + Lbl-7Za: 4a/12

A) Ind LBl 34%, Ind Sprei 41%, B) Fr, 1.Grö 20,5 (18,8-21,3)~19,7 (18,2-20,4) 20,7 (19,2-21,4), 2. Ind 96 : 101 : 105, C) St,1.Grö 11,1 (10,0-11,8)~6,3 (6,0-6,6)~8,5 (8,2-8,9), 2. Ind 57 (53-66) : 77 (72-85) : 135 (129-141)

- 7 Za, 1.81, KSt, nBG, Hofschlehe, J. Külls, Bälau, Lbg**
- 1 Spr: 1.1 bh2 s. kurz + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b 2.3 eiz
2.4 20.04.2015 bis 03.05.
 - 3 LBl: dgrün, ell, br-ges, keilfg + 6,2/1,0 + 2,0 + 32%/38% + ka/1
 - 4 Fr: 10 + M IX + 21,3 ~ 20,4 ~ 21,4 + 96 : 101 : 105
 - 5 St: 11,8~6,3~8,9 + 53 : 75 : 141 + St ein wenig verkehrt-eifg, zum NbEd spitzer, StEd schräg herauslugend, Fl mit Riefen vom Stiel aus
 - 6 Fr mit langer Falte Langtriebigen, kaum bedorntes Gehölz. Früchte nur bis A XI stark adstringierend
- 9 Za, 1.81, KSt, nBG, Hofschlehe, J. Külls, Bälau, Lbg**
- 1 Spr: 1.1 bh2 s kurz + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 20.04.2015 bis 03.05.
 - 3 LBl: graugrün, lanz, anlg-ges, keilfg + 5,6/1,1 + 1,8 + 32/40% + ka/1
 - 4 Fr: 10 + M IX + 21,3 ~ 20,4 ~ 21,4 + 96 : 101 : 105
 - 5 St: 11,4 ~ 6,0 ~ 8,2 + 53 : 72 : 137 + St ein wenig verkehrt-eifg, NbEd etwas spitz, Stielende schräg herauslugend, Fl mit betonter Riefe am Stiel, dazwischen feingrubig
 - 6 Langtriebigen, kaum bedorntes Gehölz. Früchte stark adstringierend
- 11 W, 1.81, KSt, nBG, Hofschlehe, J. Külls, Bälau, Lbg**
- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 1
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 18.04.2015 bis 30.04.
 3. LBl: graugrün, lanz, ges, abgrdt + 6,8/1,0 + 2,6 + 38/45% + ka/1
 4. Fr: 10 + E IX + 18,8 ~ 18,2 ~ 19,2 + 97 : 102 : 105
 5. St: 10,0 ~ 6,6 ~ 8,5 + 66 : 85 : 129 + St rundlich-kugelig, StEd schräg herauslugend. Fl mit hervor gehobenen Riefen, sonst glatt, langtriebigen,, kaum bedornt, Fr mit Falte, stark adstringierend.

Sorte 1.8.2 Kleinfruchtige Hofschlehe. Die Adstringenz wird durch Frost abgebaut. danach Abfall der Früchte.

A) Ind LBl 37%, Ind Sprei 42 %, B) Fr, 1.Grö 18,3 (18,1-18,5)~17,7 (17,2-18,1)~18,3 (17,7-18,8), C) St,1.Grö 10,8 (10,6-10,9)~6,7 (6,6-6,7)~8,6 (8,3-8,8), 2.Ind 62 (61-62):80 (78-81): 129 (126-131)

16 W, 1.8.2, KSt, nBG, Hofschlehe, Knick, Schlagsdorf, NW-M

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 20.04.2015 bis 25.04.
- 3 LBl: hgrün, lanz, gering ges, keilfg + 7,1/0,8 + 2,4 + 34/38% + ka/2
- 4 Fr: 10 + E IX + 18,5~ 17,2 ~ 17,7 + 93 : 96 : 103
- 5 St: 10,6 ~ 6,6 ~ 8,3 + 62 : 78 : 126, St abgerundet linsig, StEd etwas gerader, Fl fein tiefgrundig gerieft (noch.nicht.reif?),
6 frühe gleichmäßige Beduftung

17 W, 1.8.2, KSt, nBG, Hofschlehe, Knick, Schlagsdorf, NW-M.

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh3 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 2 +
2.4 18.04.2015 bis 25.04.
- 3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, ges-gekerbt, keilfg+6,8/0,8 + 2,7 + 40/45% + 1/1

- 4 Fr: 5 + MIX + 18,1 ~ 18,1 ~ 18,8 + 100 : 104 : 104
 5 St: 10,9 ~ 6,7 ~ 8,8 + 61 : 81 : 131 + St sehr dick linsig, BNt verstärkt
 6 Frucht mit starker Adstringenz. St eiförmig-spitz, muschelrig gerieft

2. Art Kirschkpflaume, Myrobalane 34 Expl.

Leider im Norden (Deutschland, Daenemark, Schweden, Polen) faelschlich auch Mirabelle/Mirabelka genannt, *Prunus cerasifera*

Kleinbäume, fast nie mit Wurzeläusläufern, häufig weitere bis extrem viele Stämme an der Basis des Primärstammes möglich. Zweige dünn, selten Sprossdornen, unbehaart, juvenile an den Enden auch vorübergehend behaart. Blütezeit meist 1-3 Wochen vor Schlehe, März, im nBG stets vor der Belaubung. Blüten strahlend weiß, seltener weiß, nur bei Zierformen z.B. auch rot (var. *atropurpurea* Jaeger). BBl 15-20 mm lang. BSt/FSt 15-22 mm lang, im nBG stets kahl. LBl dünn, recht glatt, meist glänzend, Blattrand der Blätter der Langtriebe im oberen Teil mit stärkeren, vorwärts gerichteten Zähnen. Blätter unterseits entlang der Hauptnerven meist schwach und weich behaart.

LBl verbleiben bei juvenilen Trieben auf feuchten Böden häufig bis zum Frosteinbruch, also längeals bei Schlehe und Pflaume. Früchte meist kugelig, 10 bis 42 mm groß, häufig glänzend, am Stielende mit kleiner Delle, am Narbenende häufiger mit kleiner Spitze, Früchte selten auch eiförmig. Fruchtreife im nBG meist Mitte Juli bis Anfang August, sogar bis Anfang Oktober möglich. Früchte gelb, rot oder braunrot. Sippen mit sehr dunkel violettrotten, besonders blauen und noch stärker bunten Früchten sind selten bis außergewöhnlich selten und darum dringend schutzbedürftig. Früchte angenehm fruchtig, saftig-süß bis fade und mehlig schmeckend und jeweils wenig haltbar. Fruchtsteine glatt.

Insgesamt häufiges, anspruchsloses Feld- und Knickgehölz, das in Norddeutschland, Dänemark, Schweden und Polen volkstümlich, aber fälschlich, Mirabelle/Mirabelka genannt wird. Regelmäßige Vorkommen selektierter Gehölze gibt es eher im Landesteil Schleswig, in Jütland (DK) und Brandenburg. Primitive Formen kommen sehr häufig vor in NO-Polen. Ältere Bäume sind meist ungeastet mehrstämmige Kleinbäume. Sie tragen überreichlich. In Gärten finden sich auch rotblütige und rotlaubige Formen. Einige Sorten werden häufig als anspruchslose Unterlage verwendet (Myrobalane).

Die Heimat der Kirschkpflaume liegt in Mittelasien, Kaukasien, Kleinasien bis zu den nördlichen Balkanländern. Älteste Funde in der Ukraine stammen aus dem 4. Jahrtausend v. Chr. In Deutschland gibt es Funde aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Unsere aus der Türkei stammenden Bürger nutzen auch bei uns die Früchte besonders gern.

***19 Expl, A) Ind LBl 48 (38-65) ; Ind Sprei 58 (49-78) %, B) Fr, 1. Grö 28,4 (19,0 – 35,0)~26,7 (17,0-40,0)~27,7 (17,0-43,0) mm 2. Ind 94 (84-125) : 98 (86-134) : 104 (100-108), C) St, 1. Grö 15,5 (12,7-19,7) ~ 7,2 (5,6-8,1) ~ 10,3 (7,7-11,9) mm, 2. Ind 46 (40-53) : 66 (58-77) :143 (127-172)**

Die Gliederung der Art Kirschkpflaume erfolgt lediglich auf der Grundlage der Ausbildung der Früchte

- 2.1 B) Fr, 1.Grö31,0~31,1~32,0, C) St,1.Grö16,2~7,2~11,0, 2. Ind 44 : 68 : 152
 2.2 B) Fr, 1.Grö 26,6~26,3~27,4, C) St,1.Grö 15,0~7,3~19,3, 2. Ind 49 : 69 : 141
 2.3 B) Fr, 1.Grö 25,5~22,2~22,5, C) St,1. Grö 14,5~7,2~9,8, 2. Ind 50 : 68 : 136
 2.4.2 B) Fr,1.Grö30,4~27,3~28,7, C) St, 1.Grö 16,4~7,0~9,9, 2. Ind 43 : 60 : 141
 2 B) Fr, 1. Grö 28,4~26,7~27,7, C) St, 1.Grö 15,5~7,2~10,3, 2.Ind 46 : 66 : 143
2.1 Gruppe Kultursorte Abb Fr-1 Za: 2/22; St + Lbl-1 Za: 4a/13 13 Expl.

Die Früchte sind groß, sehr saftig und aromatisch. Sie werden viel zu selten angebaut. Beispiel 69 O : FrGrö 32 ~ 40 ~ 43 mm, StGrö 12,7 ~ 5,7 ~ 9,8, Indizes 45 : 77 : 172.

***4 Expl, A) 1. Ind LBl 44 (43,0-53)%; Ind Sprei 54 (50-61) % 2. B) Fr, 1.Grö 31 (24,9-35), 31,1 (21,6-40) 32;0 (21,6-43), 2. Ind 100 (87-125) : 103 (87-134) : 103 (100-108), C) St, 1. Grö 16,2 (12,7-19,7) ~ 7,2 (5,7-8,1) ~ 11,0 (9,8-11,9) mm., 2.Ind 44, (41-48) : 68 (60-77) : 152 (147-172)**

2.2 Gruppe wrzcht kugelige Kirschpfl, FG. Abb St-23 S: 4a/16 5 Expl.

Diese Gehölze werden im nBG seit Jahrzehnten als Straßenbegleitgrün und auch als Feldgehölz eingesetzt. Die Früchte sind meist klein, gelb, rot und selten auch blau-schwarz und sehr selten auch während der Vorreife gesprenkelt. Beispiel 30 Z : leuchtend dunkelrote, mehlig Früchte, Baum mit Dornen! FrGrö 24,2~21,0~22,2 mm, StGrö 14,1 ~ 5,6 ~ 8,7mm, Indizes 40 : 62 : 155 St lang linsig, NbEd spitz, StEd gerade bis abgerundet.

***5 Expl, A) Ind LBl 54% (48-65%), Ind Sprei 63 % (51-78%), B) Fr, 1. Grö 26,6 (24,2-28,2)~26,3 (21,0-29,4)~27,4 (22,2-29,6) mm, 2. Ind 99 (87-104) : 103 PPfl, dBG, Wiechel, über Frieder Kötz, Marienborn in Siegen.(92-105) : 104 (101-106), C) St, 1. Grö 15,0 (14,1-15,5)~ 7,3 (5,6-8,1)~ 10,3 (8,7-10,5)mm, 2. Ind 49 (40-53) : 69,0 (62-75) : 141 (128-158)**

2.3. Gruppe eiförmige Kirschpfl, Abb Fr-13 S: 1/2 St + Lbl-13 S: 4a/17 4 Expl.

Diese Fruchtform ist selten im nBG, vielleicht häufiger im Osten. Beispiel 61 N : Frucht gelb und mehlig schmeckend, Grö 19~17~17 mm, StGrö 13,0~6,8~9,4 mm, Indizes 52 : 72 : 138. Stein fast oval, Flanken sehr glatt.

***4 Expl, A) Ind LBl 48 %(38-56%); Ind Sprei 57 % (49-67 %), B) Fr, 1. Grö 25,5 (19,0-30,3) ~ 22,2(17-27,3)~22,5 (17,0-27,9) mm 2. Ind 87 (84-90) : 88 (85-92) : 101 (100-102), C) St, 1. Grö 14,5 (13,0-18,0) ~ 7,2 (6,6-8,0) ~ 9,5 (8,4-11,0) mm, 2. Ind 50 (44-52) : 68 (59-72) : 136 (127-139)**

Gruppe besondere Kirschpflaume 9 Expl.

2.4 blaue und bunte Kirschpflaume

2.4.1 Gruppe blaue Kirschpflaume 3 Expl.

2.4.2 Gruppe Rebhuhn-Kirschpflaume 5 Expl.

Frucht dick-tropfenförmig mit zunächst auffällig grober, aber schön marmorierter Haut, ähnlich einem Rebhuhnei. FrGrö 34,7~33,1~34,2 mm, StGrö 18,2~7,7~11,4 mm, Indizes 42 : 62 : 148, St-Flanken glatt

5 Expl, A) Ind LBl 51 (41-63) %; Ind Sprei 61 (48-73) %, B) Fr,1. Grö 30,4 (26,1-34,7) ~27,3 (23,3-33,1) ~ 28,7 (24,4-34,2) mm, 2. Ind 90 (84-95) : 94 (90-99) : 105 (103-108), C) St, 1. Grö 16,4 (13,3-18,2) ~7,0 (5,9-7,7) ~9,9 (7,7-11,4) mm, 2. Ind 43 (41-44) :60 (58-62) : 141 (131-148)

2.4.3 Gruppe extreme Kirschpflaume 1 Expl.

2.9 Gruppe unbekannte Kirschpflaume 3 Expl.

2.1 Kultursorte, Die Gehölze stehen auf einer Unterlage. 13 Expl.

69a O, 2.1, KSt, Kirschpflaume. "Anatolia", tot, Abb Fr-69O: 2/23; St-69O: 4a/14

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

**2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 15.04.2015 bis 30.04.**

3 LBl: hgrün, lanz, ges, abger + 8,1/1,3 + 3,5 + 43/51% + 1/1

4 Fr: 6 + E VIII + 32 ~ 40 ~ 43 + 125 : 134 : 108

5 St: 12,7 ~ 5,7 ~ 9,8 + 45 : 77 : 172 + St klein, liegend rundlich, NbEd sehr kurz angespitzt, StEd etwas abgedreht, nicht herausragend, BNt stärker ausladend als RNt, BNt mit Wulst und mit prägnanten Riefen

6 Frucht dunkel-rot-violett, leicht beduftet, sehr süß-saftig, blutroter Saft, sehr aromatisch. Sehr zu empfehlende Sorte!

1 R bis 3 R, 2.1, Anatolia, gepflanzt 2012

1 Z, 2.1, KSt, Kirschkpfl Nordangeln, Fa Hammerschmidt, Angeln, Abb St 4a/13

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1! + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 01.04.2015 bis 19.04.

3 LBl: mgrün, eif, sp-ges, etw keilfg + 7,6/1,6 + 3,0 + 39/50 % + 1/ka

4 Fr: 10 + E VIII/A IX + 32,1 ~ 27,8 ~ 28,5 + 87 : 89 : 103

5 St: 19,7 ~ 8,1 ~ 11,9 + 41 : 60 : 147 + Großsteinig, linsig, BNt weiter ausladend als RNt und kräftig gerieft, NbEd spitz, StEd abgerundet, Fl glatt

6 Frucht sehr dunkel rt-blau-viol, kl Spitze und Falte. Sehr aromatisch süß-saftig. Leider deutliche Neigung zur Narrentaschenkrankheit! Sehr früher Blüher!

18a5 S, 2.1, KSt, Kirschkpflaume, Ritzerau, Lauenburg, Abb St 4a/15

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 2.4 2016 - 12.04.

3 LBl: dgrün-glzd, lg-ell, grb-gezähnt, abgrdt + 7,9/1,6 + 3,5 + 44/56 % + 1/gezähnt

4 Fr: 6 + M VIII + 35,0 ~ 34,9 ~ 34,8 + 100 : 99 : 100

5 St: 16,7 ~ 8,1 ~ 11,9 + 48 : 71 : 147 + St eiförmig, Bauchseite ausld.

6 Jg Triebe drot, Frucht pflaumig und wenig süß schmeckend, wird auf Plattdeutsch leider Spilke genannt, Frucht gelb.

18a6 S, 2.1, KSt, Kirschkpflaume, Ritzerau, Lauenburg

1 Spr: dunkelrot + 1.1 + 1.2 ka + 2.

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 2.4. 2016 - 12.04.

3 LBl: mgrün, ell, ges, grdt + 6,4/1,1 + 2,9 + 45/55 % + fast 0/1

18a7 S, 2.1, ESt, Kirschkpfl., Frieder Kötz, Gold. Spiegel, 57074 Siegen

1 Spr: dunkelrot + 1.1 + 1.2 ka + 2.

2 Blü 1.1 bw + 1.2 1 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
2.4 27.04.2015 bis 01.05 + stark duftend.

3 LBl grün, ell, ges, grdt + 4,7/0,7 + 2,2 + 47/55 % + fast 0/ka

4 Fr: 7 + M IX + wie 18 a8

5 St: 16,1 ~ 6,5 ~ 10,2 + 40 : 63 : 157

18a8 S, 2.1, KSt, wie 18a7

1 Spr: dunkelrot + 1.1 + 1.2 ka + 2

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
2.4 7.4.2016 - 12.04..+ stark duftend

3 LBl: hgrün, ell, ges, grdt + 5,1/0,7 + 2,7 + 53/61 % + fast 0/ka

2016

4. Fr: 1 + M VIII + 24,9~21,6~21,6 + 87 : 87 : 100

5 St: 15,6~6,9~10,2 + 44 : 65 : 148 + St linsig mit Bauch

6 St-Seitenfurche mit Mittelteil, Fl glatt, gelb-rote Frucht

2017

4 Fr: 7 + M VIII + 22,5 ~ 20,4 ~ 20,4 + 91 : 91 : 100

5 St: 16,7 ~ 7,0 ~ 10,3 + 42 : 62 : 147

6 Fr stark dunkelrot, glänzend, spitz oval zulaufend

- 69a O, 2.1**, KSt, nBG, Kirschpflaume, Marienstedt, Lbg
 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2 0
 2 Blü: 1.1 sw 1.2 1 1.3 3 1.4 3a 2.1 ka 2.2 a 2.3 eiz
 3 LBl: graugrün + ell + ges-gekbt + gerundt + 4,1/0,9 + 2,3 + 56/72% + 2/ka
- 69b O, 2.1**, KSt, nBG, Kirschpflaume, Marienstedt, Lbg
 wie 69a O
- 1c N, 2.1**, KSt, nBG, Kirschpflaume, Marienstedt, Lbg
- 1d N, 2.1**, KSt, nBG, Kirschpflaume, Marienstedt, Lbg
 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh1 + 2 0
 2 Blü:
 3 LBl: hellgrün + br-ell + ges-gekerb + keilfg + 2,6/0,4 + 1,7 + 65/77% + 3/3
- 2.2 Wurzelechte, fast kugelg Kirschpflaume, FG** **5 Expl.**
- 23 S, 2.2**, LSt, wrzechte glb Kpfl, Arnold, Heide, Schwrtzwd, **Abb** St-23S: 4a/16
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
 2.4 19.04.2015 bis 27.04.
 3 LBl: mgrün, lanz, ges, stark abgrdt + 6,3/1,3 + 3,4 + 54/68% + 1/1
 4 Fr: 10 + E IX + noch.nicht.reif + 20,5 ~ 18,1 ~ 18,8 + 88 : 92 : 104
 5 St: 13,1 ~ 6,6 ~ 9,0 + 50 : 69 : 136 + St StEd schwach hervorragend,
 NbEd etwas abgerundet, Flanken glatt, Bauchnaht schwach verdickt
 6 Früchte gelb, Reife sehr spät : E IX/A X! Später Blüher!
- 16 N, 2.2**, Utlg, wrzechte Kirschpflaume, fast schwarz, mehlig, Fa H. Cordes,
Holm, Pinnebg.
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
 2.4 01.04.2015 bis 21.04.
 3 LBl: mgrün-glzd, lanz, ges, keilfg + 6,3/1,0 + 3,0 + 48/57% + ka/1
 4 Fr: 6 + A VIII + 26,7 ~ 26,4 ~ 27,9 + 99 : 104 : 106
 5 St: 15,2 ~ 8,1 ~ 10,4 + 53 : 68 : 128 + St wie 30 Z, NbEd nicht so spitz
 6 rötlich-schwarze, mehlig Frucht
- 30 Z, 2.2**, LSt, wurzelechte, rote Kirschpflaume, DJH, Mölln, Slg
 1 Spr: 1.1 ka 1.2 + 2. 1
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 3-4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
 2.4 30.03.2015 bis 18.04.
 3 LBl: mgrün, eifg, ges, abgrdt + 4,8/0,6 + 2,7 + 56/64% + 1/1
 4 Fr: 10 + E VII + 24,2 ~ 21,0 ~ 22,2 + 87 : 92 : 106
 5 St: 14,1 ~ 5,6 ~ 8,7 + 40 : 62 : 155 + St lang linsig, NbEd spitz, StEd
 gerade bis abgerundet, BSeite stärker ausladend mit schwachem
 Wulst, Fl glatt
 6 leuchtd dunkelrte, mehlig Frucht, Baum mit Dornen! Frühe Blüte!
- 27 O, 2.2**, LSt, wrzechte, rote, saftige Kirschpflaume, RZ-Stüvkamp, Slg
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
 2.4 20.03.2015 bis 12.04.
 3 LBl: mgrün-glzd, lanz, anlg-ges, keilf + 5,2/0,3 + 2,5 + 48/51% + 1/ka
 4 Fr: 5 + M VIII + 28,2 ~ 29,4 ~ 29,6 + 104 : 105 : 101
 5 St: 15,2 ~ 7,2 ~ 10,5 + 47 : 69 : 146 + großsteinig, dick linsig, BSeite aus-
 ladend, Fl glatt. 6 rote Frucht, spät reif
- 31h O, 2.2**, Ansverusser Kirschpflaume, P. Schlottmann, Ansverusweg-RZ
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0

- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
2.4 08.04.2015 bis 22.04.
- 3 Lbl: mgrün, rdl-ellipt, ges, rdl + 5,5/0.9 + 3,6 + 65/78 % + ka/ka
- 4 Fr: 5 + A IX + 27,4~28,5~29,3 + 104 : 106 : 103
- 5 St: 15,5~7,4~11,7 + 48 : 75 : 158 + St groß, eiförmig
- 6 Wulst etwas zum St-Ende abgedreht, Fl dort riefig, sonst glatt, Bauch deutlich stärker. Frucht gelb, saftig-fruchtig, Stiel etwas eingesenkt, leider sehr steinhaltend.

2.3 eiförmige Kirschpflaume

4 Expl.

- 4 Fr: 6 + M VIII + 19-17-17 + 89 : 89 : 100
- 5 ST: 13,0~6,8~9,4 + 52 : 72 : 138
- 13 S 2.3, KSt, eifg Kirschpfl, Frucht gelb, E. Kosin, RZ-VSt, Slg,
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1. Abb Fr-13 S: 1/2 St + Lbl-13 S: 4a/17
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1! + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
2.4 09.04.2015 bis 22.4.
- 3 LBl: mgrün-glzd, ell, ges, abgrdt + 4,5/1,0 + 1,7 + 38/49 % + 1/0
- 4 Fr: 10 + E VII/A VIII + 23,7~20,4~20,7 + 86 : 87 : 101
- 5 St: 14,2~6,6~8,4 + 46 : 59 : 127 + St beidendig spitz, Bauchseite ausladend, BNt schwach
- 6 Wurzelausschlag, leuchtend gelbe Früchte, Baum bedornt !
- 61 N, 2.3, KSt, gelbe eif. Kirschpflaume, Mirabelka, Augustow, NO-Polen
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 3?
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 12.04.2015 bis 26.04.
- 3 LBl: dgrün, eifg, grob-ges, abgrdt + 6,4/1,0 + 3,3 + 52 /61 % + ka/ka
- 4 Fr: 6 + M VIII + 19~17~17 + 89 : 89 : 100
- 5 St: 13,0~6,8~9,4 + 52 : 72 : 138
- 6 Fr gelb, mehlig schmeckend, Stein fast oval, Flanken sehr glatt
Blüte mit starkem gutem Duft!

24c1 N, 2.3, dunkelrote eiförmige Kirschpflaume Birkenhof, Frieder Kötz, Goldener Spiegel 11, 57074 Siegen

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 1 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.3 d + 2.3 eiz
2.4 02.04.2016 bis 27.04.
- 3 LBl: mgrün, ellipt, ges, keilfg + 7,2/1,2 + 4,0 + 56/67 % + ka/1
- 4 Fr: 10 + E VIII + 30,3~27,3~27,9 + 90 : 92 : 102
- 5 St: 18~8~11 + 44 : 61 : 138 + St linsig, Bauchseite ausladend, Rücken fast gerade, beidseitig fast gleich spitz
- 6 glzd dunkelrote, eifge Frucht, Stielansatz leicht gesenkt

24c2 N, 2.3, rote eiförmige Kirschpflaume Birkenhof, Frieder Kötz, Wilmersdorf bei Siegen

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka +
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 1 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 + eiz
2.4 02.04.2016 bis 27.04.
- 3 Lbl: mgrün, ellipt, ges, keilfg + 7,7/1,3 + 3,4 + 44/53 % + ka/1
- 4 Fr 8 + E VIII + 28,9~24,2~24,5 + 84 : 85 : 101
- 5 St 17,6~7,4~10,3 + 42 : 59 : 139 + linsig, Bauchseite ausladend, Rücken fast gerade, mit Bauchfurche
- 6 glzd dunkelrote Frucht, schwache Falte am Stielansatz, dick eifg

2.4 besondere Kirschpflaume **9Expl.**

2.4.1 blaue Kirschpflaume **3 Expl.**

25m N, 2.4.1 LSt, blaue Kirschpflaume, über Walter Hartmann, Erika Weg 2, 70794 Filderstadt B-W,

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c 2.3 eiz
2.4 09.04.2015 bis 20.04.
- 3 Lbl: mgrün, ellipt, ges, keilfg + 4,8/0,7 + 2,2 + 46/54 % + 1/1
- 4 Fr: 1 + E VII + 22,1 ~ 18,6 ~ 19,9 + 84 : 90 : 107
- 5 St: 12,0 ~ 4,8 ~ 6,8 + 40 : 57 : 142
- 6 Fr blauschwarz, schwacher Hauch

25n N, 2.4.1, LSt, blaue Kirschpflaume, über Walter Hartmann, s.o.

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 11.04. 2015 bis 20.04.
- 3 LBl mgrün, ellipt, ges, keilfg + 4,6/0,7 + 2,0 + 43/51 % + 1/ka
- 4 Fr: 7 + E VII + 22,6 ~ 19,6 ~ 20,4 + 87 : 90 : 104
- 5 St: 13,7 ~ 6,4 ~ 8,7 + 47 : 64 : 136

53 05 O, 2.4.1, dBG, blaue Kirschpflaume, Dadow, Frank Petersen, Lange Straße 12 19294 Dadow

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 qul
2.4 2. 4. 2016 - 11. 04.
- 3 LBl: graugrün + ell + gesgekerbt + keilfg + 4,0/0,8 + 37,5/47% + 1/ka

2.4.2 Rebhuhn-Kirschpflaume **Abb** St + Lbl-25y N: 4a/18 **5**

Expl.

Frucht wie ein Rebhühnei im Vor-Reifestadium, dunkelblau im Über-Reifestadium). Material der Mutterpflanze über Frank Petersen, s.o.

- 2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 ka + 2.2 c
- 3 LBl: sdünn, ell bis brettf, mgrün, gering ges, schwach keif + 6,1/1,5 + 3,2 + 52/70 % + 2/1
- 4 Fr: 5 + M VIII + 34,7 ~ 33,1 ~ 34,2 + 95 : 99 : 103
- 5 St: 18,2 ~ 7,7 ~ 11,4 + 42 : 62 : 148 + dicksteinig, BSeite sehr stark ausladend, überlappt, NbEd spitz, StEd kurz abgerundet
- 6 Frucht dick-tropfenförmig mit zunächst auffällig grober aber schön mamoriert Haut, bei Überreife gleichmäßig tief blau mit Hauch, mit Falte, größte Dicke nach 1/5 der Länge! LBlSt lg und dün

25y N, 2.4.2 im Reifestadium, LSt, blaue (Rebhuhn-)Kirschpflaume, F. Petersen, Dadow, vom Feldweg Gr. Warnow/Grabow, Brdbg, **Abb** St + Lbl-25y N: 4a/18

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 + 2.
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 5 + 2.1 ka + 2.2 d+ + 2.3 eiz
2.4 02..04.2016 bis 25.04.
- 3 LBl: sdünn und ell bis brettf, mgrün, ges, s kurz keilf + 5,9/1,4 + 2,4 + 41 %/53 % + 1/1

2016 4. Fr: 15 + E VIII + 30,5 ~ 25,5 ~ 27,5 + 84 : 90 : 108

- 5 St: 17,7 ~ 7,3 ~ 10,7 + 41 : 60 : 147 + Großsteinig, Fl glatt, BSeite stark ausladend, Wulst stark, hervortretender Mittelteil, Frucht dunkel rot-bläulich, kaum Hauch, Naht der Frucht ausgeprägt

2017

- 4 Fr: 6 + E VIII + 31,1 ~ 24,6 ~ 25,1 + 79 : 80 : 102
5 St: 19,2 ~ 7,1 ~ 10,4 + 37 : 54 : 146

17e S, 2.4.2, LSt, Rebhuhn-Kirschpflaume, über F.Petersen, Dadow, vom Feldweg in Warnow, bei Grabow, Brdbg . Fraglich ob Wurzelbrut oder Slg, Pflzg 12/11

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 5 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 2. 4. 2016 - 22.04.
3 Lbl: dgrün-glzd, eifg, gekerbt, rdl + 5,6/0,8 + 3,5 + 63 %/73 % + 2/2
4 Fr: 7 + A VIII + 27,1 ~ 23,1 ~ 23,1 + 85 : 85 : 100
5 St: 16,2 ~ 6,8 ~ 10,4 + 42 : 64 : 153

17f S, 2.4.2, LSt, Rebhuhn-Kirschpflaume, Pflzg 12/11

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 2!
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
2.4 20. 3. 2016 .bis 8..04.
3 Lbl: hellgrün, ellipt, gekerbt, rdl + 4,8/0,4 + 2,1 + 44 %/48 % + 3/2

2016

- 4 Fr: 1 + E VIII + 26,1~23,3~24,4 + 89 : 93 : 105
5 St: 13,3~5,9~7,7 + 44 : 58 : 131
6 Fr rot, eifg, St Bauch ausladend, Rücken fast gerade, kurzer Stiel

2017

- 4 Fr: 7 + E VIII + 30,7 ~ 23,6 ~ 25,6 + 77 : 83 ; 108
5 St: 16,3 ~ 6,5 ~ 9,5 + 40 : 58 : 146
6 Fr mäßig dunkel-rot, glänzend, unten spitz zulaufend, dick oval

49b N, 2.4.2, Rebhuhn-Kirschpflaume, Reis über F. Petersen, von Gr. Warnow bei Grabow, Brdbg

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
3 Lbl: mgrün, ellipt, gekerbt, rdl + 5,2/0,8 + 3,0 + 58 %/68 % + 2/1

49c N, 2.4.2, Rebhuhn-Kirschpflaume, wie 49b N

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
3 Lbl: mgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdl + 4,2/0,6 + 2,3 + 55 %/64 % + 2/1

2.4.3 extreme Kirschpflaume

1 Expl.

25f N, 2.4.3, Große, extrem saftige Kirschpflaume, von Fa Peter Klock, Südflora, Hamburg

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 1,1 w + 1.2 1 + 1.3 4 + 2.1 + 2.2 d + 2.3 eiz
2.4 10.04.2015 bis 22.04.
3 Lbl: mgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 5,8/1,0 + 2,1 + 36 /44 % + ka/ka
4. Fr: 4 + A VIII + 36,2~34,8~35,2 + 96 : 97 : 101
5 St: 17,8~6,5~11,2 + 37 : 63 : 172 + St breit gebogene Bauchseite, kräftiger Wulst, kleiner Stielansatz
6 Große, übersaftige, rotblaue Frucht, wohl schmeckend

2.9. unbekannte Kirschpflaume

3 Expl.

17c S,2.9, x, Kirschpflaume?, über K.Vorderwülbecke, Bhfstr. 45, 59939 Olsberg, aus "An derQuelle", Bad Driburg-Neuenheese, Teutoburger Land, Pflzg 12/11

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2c + 2.3 eiz
2.4 2. 4. 2016 - 27.4.

- 3 Lbl: s dünn, ell, lg keilfg + 7,2/1,2 + 4,0 + 56 %/67 % + 2/1
 4 Fr: 6 + ? + x +
 5 St: 15,3 ~ 7,4 ~ 10,9 + 48 : 71 : 147 + 10. Fl glatt, starke Bauchnaht
 18a7 S, 2.9, Kirschkpflaume Siegen, über Dr. Frieder Kötzt, Goldener Spiegel 11
 57074 Siegen
 18a8 S, 2.9, Kirschkpflaume wie 18a7 S

3. Art Pflaume, *Prunus domestica* L., 415 Expl.

402 Pflaumen, 13 Bastarde

Zweige dicker, einige behaart. Blütezeit 3 Wochen bis deutlich später als Kirschkpflaume. Blüten häufiger zu zweit, strahlend weiß, auch grünlichweiß oder beige-gelblich-weiß, vor und auch mit der Laubentwicklung. BIBl meist 15-18 mm groß. LBl dicker als bei den beiden anderen Arten, nicht bis stark glänzend, unterseits häufig behaart, Rand breit, bis fast abgerundet gesägt.

Bäume, auch Sträucher, wurzelecht oder auf einer Unterlage, mit oder ohne Wurzelbrut. Viele Fruchtformen und -farben. Früchte meist fruchtig-süß-pflaumig, seltener säuerlich-herb. Auch selten mit vielen Tanninen, sie wirken dann adstringierend, z. B. die Ziparte. Der Tanningehalt der Früchte reicht also nicht aus, um die Art Schlehe von der Art Pflaume zu trennen. Früh-, auch mittelreif, auch Ende Oktober. Die große Art bevorzugt frische, nicht zu kalte, aber reiche Böden (siehe die Verbreitungskarten).

Der Bestand an *Primitivpflaumen*, z.B. Kricke, Wiechel, Ziparte, Kree-ke, Kreete und Spilling und auch die Kenntnisse darüber, haben in den letzten 70 Jahren zunehmend stark abgenommen. Sie sind schutzbedürftig, benötigen dringend mehr Aufmerksamkeit und Ausbreitung sowie auch im Volksmund wieder trennende, gültige Namen.

A) 3.0 Systematik noch nicht geklärt 45 Expl.

Die jungen 61 Expl. haben auf der Wiese bislang nicht gefruchtet. Sie kommen in 31 Gruppen aus 11 nBG, 30 dBG, 20euBG, 1uBG.

Die systematische Einordnung dieser Gehölze dürfte mit den jeweils ersten Früchten auf der Streuobstwiese, weiteren Beobachtungen und Vergleichen am ehemaligen Fundort sowie Diskussionen mit der Fachwelt näher rücken. Der Prozess wird länger dauern, da einige unserer Gehölze noch recht klein sind. Wahrscheinlich wird die Liste der "Ungeklärten" durch neue Ankömmlinge sogar eher noch weiter wachsen. **Freie Plätze für Nachpflanzungen !**

Xx 3.0.1, PPfl, primitive blaue Pflaume vom Hirtengang, über H. Egleder, 2 Vogteistr. 38, 23570 Travemünde. primitive blaue Halbzweitsche, 3.7. ?, Material HL

- 1 Spr: 1. bh 2/3 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 bh3 + 2.2 b
 3 LBl: mgrün-fest, ell, ges, schwach keilfg + 9,2/2,2 + 4,4 + 48/63 %, + 3/3
 4 Fr: 5 + M VIII + 30,0 ~ 26,4 ~ 29,3 + 88 : 98 : 111
 5 St: 17,7 ~ 7,6 ~ 13,2 + 43 : 75 : 174
 6 Frucht mit Pflaumenfalte, Fleisch sehr steinhaltend, geringer Pflaumengeschmack. Stein nur wenig abgewinkelt, fast symmetrisch, Flanken flach gemuschelt, BNt kräftig, Material Xx aus HL.

- 41 **Z**, **3.0.1**, nBG, primitive blaue Halbwetsche, H.Egleder vom Hirtengang HL
 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 bh2 + 2. 0
 3 LBl: derb-mgrün, herzfg, grob gekerbt, rdl+8,2/0,7 +5,8 +71/77 % +3/2
 5c **S**, **3.0.1**, nBG, primitive blaue Halbwetsche, wie 41 **Z**
 1 Spr: 1.1 bh2? + 1.2 ? + 2. 0
 3 LBl: hellgrün, ellipt, gekerbt, noch keilfg+7,9/1,3 + 3,9 + 49/62 % + 3/1

3.0.2 kleine blaue Rostocker Primitivpflaume **2**

- 53a3 **O**, **3.0.2**, dBG, PPfl, kleine blaue Rostocker Primitivpflaume
 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 bh2 + 2. 0
 3 LBl: hellgrün, ellipt, ges, keilf + 5,6/0,8 + 2,6 + 46//54 % + 2/wollig
 59 **O** **3.0.2**, dBG, PPfl, kleine blaue Rostocker Primitivpflaume, 3.1.1/3.1.2, wie 3.7.3.1 ?
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 5 + 1.4 oval + 2.1 bh1 + 2.2 2 + 2.3 paa
 3 LBl: mgrün-glzd, ell, gkerbt, schwach keilf + 6,3/1,4 +3,5 +56/71 %/ + 3/1

3.03 Sliwa lubaszka, blaue PPfl, Bryki, östlich Warschau, Polen

3.0.4 Kriechele Dürnau, Utlg. Myrobalane **1**

- 25g **N**, **3.0.4**, dBG, Kriechele Dürnau, über W. Hartmann, 70794 Filderstadt, B-W
 1 Spr: 1.1 bh2 extrem-kurz + 1.2 bh 2, extrem kurz
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 4 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
 3 Lbl: graugrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 7,6/1,2 + 3,5 + 46/55 % + ka/2

3.0.5 Nichols kleine Hauspflaume **2**

- 70a2 **W**, **3.0.5**, euBG, Nichols kleine Hauspflaume, über W. Hartmann
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 bh3 + 2.2 d + 2.3 Paa
 3 Lbl: mgrün-glzd, ellipt, ges, rdl + 7,2/0,9 + 3,5 + 49 %/57 % + 3/2
 70a3 **W**, **3.0.5**, euBG, Nichols kleine Hauspflaume
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 bh3 + 2,2 d + 2.3 Paa
 3 Lbl: mgrün-glzd, verkehrt-eifg, gekerbt, rdl +6,9/0,8 +3,5 + 51/57 % + 3/3

3.0.6 Thüringer Hammelsäcke

6 Ergänzung: 30b S als 3.0.6 geliefert, es ist aber ein Apfel

3.0.7 Sarner-Bullace, Typ 2, kleine blaue PPfl der Halbinsel Llynn, NW-Wales, 3

Werte von gelieferten Fruchtzweigen: Indizes 68 : 90 : 132, St rundlich, starker Wulst, Fl vom Stiel über die Flächen gerieft, LBl Lg 7,9/1,8 cm, jg Trb bh3, LBl bh1. Weitere Ergebnisse können erst später erwartet werden. 3 euBG

52 **Z**, **3.0.7**, PPfl, euBG, Sarner-Bullace, Typ 2 Sarn, Llynn, Wales

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 3 + 2.
 3 LBl: hgrün, ell, ges, klfg + 6,2/1,3 + 3,2 + 52/65 % + 2/5

53 **Z**, **3.0.7**, PPfl, euBG, Sarner-Bullace, Typ 2, Sarn, Llynn, Wales

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
 3 LBl: mgrün, ell, br.ges, klfg + 6,8/1 + 3,4 + 50/59 % + 2/2

54 **Z**, **3.0.7**, PPfl, euBG, Sarner-Bullace, Typ 2, Sarn, Llynn, Wales

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 1 s.kurz + 2
 3 LBl: mgrün, ell, ges, klfg + 6/0,8 + 3 + 50/58 % + 1/2

3.0.7 bzw 3.0.10, Herkunft der Steine jeweils unsicher. **Stein Typ 2** : 13,5 ~ 7,0 ~ 9,3 mm + 52 : 69 : 133 + Stein linsig, Stiel ragt etwas hervor und ist abgeknickt, L-Achse gekrümmt, BNt ein wenig ausladend und mäßig kräftig, Fl stielnah etwas gerieft, sonst recht glatt

3.0.8 Pflaume aus Marchessy

2

5a S, **3.0.8**, euBG, Pflaume aus Marchessy, Reis von W. Hartmann, Uni Hohenheim

1.1 ka + 1.2 ka + 2 0.

3 Lbl: hellgrün, ellipt, s grob gekerbt, rdl +4,8/0,6 + 2,7 + 56/64 % + 3/3

5b S, **3.0.8**, euBG, Pflaume aus Marchessy, Reis von W. Hartmann, Uni Hohenheim

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ? + 2. 0

3 Lbl: hellgrün, eifg, gekerbt, rdl + 5,9/0,9 + 3,0 + 51/60 % + 2/1

3.0.9 Aprikosenpflaume, C. Städeles Aprikosenpflaume

1

30c3 S, **3.0.9a**, dBG, wie 30c2 S

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0

2 Blü. 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 03.04.2016 - 30.04.

3 Lbl mgrün, verkehrt-eifg, gekerbt, keilfg + 8,5/1,3 + 3,4 + 40/47 % + 2/2

4 Fr: 2 + A IX +

5 St: 21,8 ~ 8,1 ~ 12,6 + 37 : 58 ; 156

3.0.10 Sarn Bullace, Typ 1

2

Stein Typ 1 : 12,0 ~ 8,0 ~ 9,8 mm + 67 : 82 : 123 + St kugelig, Stiel ragt nicht hervor, breite BNt, Fl gerieft, dazwischen gemuschelt

17i S, **3.0.10**, euBG, PPfl, Sarn Bullace Typ 1, Sarn, Halbinsel Llynn, NW-Wales

1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 ? + 2. 0

3 Lbl: dgrün, ellipt, ges, keilf + 5,1/0,8 + 2,5 + 49/58 % + 2/1

17k S, **3.0.10**, euBG, PPfl, Sarn Bullace Typ 1

1 Spr: 1.1 ? + 1.2 2 + 2. 5

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 02.04.2016 - 02.05.

3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 5,7/1,6 + 2,6 + 46/63 % + 2/1

1a N, 3.0.11 kl bl Pflaume, Usedom, A. Kalesse, Billstedter Pfad 13591 Berlin, **1**

1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2 0

2 Blü:

3 LBl: hgrün, ell, ges-gekerbt, keilfg, 4,0/0,4 + 1,7 + 43/47% + ½

2a N, 3.0.12a, uBG, PPfl

3.0.12a – 3.0.13c

3

1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2 0

2 Blü:

3 LBl: dgrün, dicklich br-ell, gekerbt, br-keilfg + 3,7/0,4 + 2,3 + 62/70% + bh3, stark hervortretende Nerven / 1

2b N, 3.0.12b, uBG, PPfl

1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2 0

2 Blü:

3 LBl: grau-gelb-grün, dicklich s br-ell, gekerbt, rund
4,2/0,5 + 3,3 + 79/89% + bh3, stark hervortretende Nerven

2c N, 3.0.12c, uBG, PPfl

3a N, 3.0.13a, uBG, PPfl

1 Spr: 1.1 + 1.2 + 2

2 Blü:

3 LBl: grün-gelb, s dünn ell, nur Spitze gekerbt, rundlich
3,1/0,5 + 1-/1-

3b N, 3.0.13b, uBG, PPfl

3c N, 3.0.13c, uBG, PPfl

3.0.14 Brit. Shepherds-Bullace, Utlg St Julien, I NRA II 1

31e O, 3.0.14 euBG, Shepherds Bullace, England, 3.1.3b2, Engl Ziparte ?

3.0.15 Oberreuter Landpflaume, Utlg Myrobalane

3.0.19 3.1.2d, Wiechel, Beckele, euBG, Reis W.Hartmann, Uni Hohenheim

3.0.20 Kroosjes 2

25w N, 3.0.20, PPfl, Kroosjes, euBG, Reis W. Hartmann, Uni Hohenheim, tot

1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 bh3 + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 + 2.3 paa
2.4 20.04.2016 - 30.04.

3 Lbl: hellgrün, ellipt, gekerbt, rdl + 6,2/1,9 + 2,7 + 44 %/63 % + 3/2

25x N, 3.0.20, PPfl, Kroosjes, euBG, Reis W. Hartmann, Uni Hohenheim

1 Spr: 1.1 1 + 1.2 2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 20.04.2016 - 30.04.

3 Lbl: mgrün, br-ellipt, gekerbt, rdl+ 8,4/1,8 + 4,4 + 52 %/67 % + 3/3

3021

3022

3.0.23 bis 3.0.24: Die Reiser stammen von Andreas Kressin, Reiche Str. 25, 06493 Ballenstedt-Badeborn aus S-A. Da ein Befall auf Scharka nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden sie von Georg Henkel von der Landwirtschaftskammer S-H übernommen, auf eine Unterlage gesetzt und gegen Scharka behandelt.

3.0.23 Schutzberg-Spilling, S-A 1

18a1 S, 3.0.23, dBG, Schutzberg-Spilling, S-A

1 Spr: 1.1 + !.2 bh2 + 2.

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 5 + 1.4 oval + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa

3 LBl: hgrün, ell, br-ges, klfg + 8,1/2 + 3,6 + 44/59 % + 2/3

3.0.24 Katalonischer Spilling 3

18a3 S, 3.0.24, dBG, Katalonischer Spilling, S-A

1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz

3 LBl: hgrün, ell, ges, klfg + 7,3/1,5 + 3,1 + 42/53 % + 3/2

18a4 S, 3.0.24, dBG, Katalonischer Spilling, S-A

1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz

3 LBl: dgrün, ell, ges, klfg + 6,3/1,2 + 2,7 + 43/53 % + 1/2

53 06 O, 3.0.24, dBG, Katalonischer Spilling, S-A

1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.

- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 **bh2?** + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 19.04.2016 - 28.05.
- 3 Lbl: mgrün, ell, ges, noch klfg + 6,2/0,8 + 3,3 + 53/61 % ½

3.0.25 Bündel 1/1

Bündel 1.1 + 1.2 2

75 **W, 3.0.25**, Bündel 1/1, euBG, Blaue Ziparte? A.Lugmair, Gstocket 10, A-4072
Alkoven, OÖ

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 gezä + 2.
2 Blü: 1.1
3 Lbl: derb-mgrün, ellipt, gekerbt, keilf-rdl + 6,3/0,8 + 3,8 + 60/69 % + 2/2

3.0.25 Bündel 1/2

2 euBG

29b4 **Z, 3.0.25**, euBG, wie 29b3 Z

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 s kurz bh + 2.
3 Lbl: mgrün, eifg, gekerbt, rdl + 8,8/1,2 + 4,0 + 45/53 % + 3/3

Die Reiser **3.0.26 bis 3.0.32** sind von Gerhard Kleinhans, Ulanenstraße 17, 40468
Düsseldorf. Sie stammen alle aus der Schneeeifel.

3.0.26 Bündel 2/2, dBG, G. Kleinhans, Schneeeifel

3.0.27 Bündel 2/6

1

31b1.1 **Z, 3.0.27**, Bündel 2/6, dBG, G. Kleinhans, Schneeeifel

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
3 Lbl: mgrün, breit ellipt mit Spitze, s grob gekerbt, rdl + 8,2/0,5 + 4,0 + 49/
52 % + 3/3

3.0.28 Bündel 2/8

3

16c2 **Zb, 3.0.28**, Bündel 2/8, G. dBG, Kleinhans, Schneeeifel, **Kricke ? s klfrchtg**

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 1- + 2,1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
3 Lbl: mgrün, ellipt, ges, rdl + 6,2/0,4 + 2,3 + 37/40 % + 3/1
4 Fr: 1 + MIX + 15,4~14,0~15,4 + 92 100 : 110 %
5 St: 9,5~5,6~7,9 + 59 : 83 : 141
blau mit Hauch, wenig Säure

16c3 **Zb, 3.0.28**, Bündel 2/8, dBG, G. Kleinhans, Schneeeifel

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 1- + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
3 Lbl: dgrün, ellipt, ges, rdl + 5,1/0,3 + 2,3 + 45/48 % + 1/1

16c4 **Zb, 3.0.28**, Bündel 2/8, dBG, G. Kleinhans, Schneeeifel

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 1- + 2.1 ka 2.2 a 2.3 eiz
2.4 22.04.2016 - 02.05.
3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, ges, rdl + 6,3/0,6 + 2,5 + 40/44 % + 1/1

3.0.29 Bündel 2/9

1

29e3 **O, 3.0.29**, Bündel 2/9, dBG, G. Kleinhans, Schneeeifel

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
3 Lbl: hellgrün, eifg, gekerbt, rdl + 7,0/0,5 + 3,6 + 51 %/55 % + 4/3

3.0.30 Bündel 2/10

1

29e2 **O, 3.0.30**, Bündel 2/10, dBG, G. Kleinhans, Schneeeifel

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
3 Lbl: hellgrün, eifg, ges, rdl + 4,6/0,5 + 2,8 + 61/68 % + 3/2

3.0.31 Bündel 2/11

1

29e4 **O, 3.0.31**, Bündel 2/11, dBG, G.Kleinhans, Schneeeifel

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 1.4 oval + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
- 3 Lbl: hellgrün, ellipt, gekerbt, rdl + 7,3/0,6 + 3,3 + 45/49 % + 2/2

3.0.32 Bündel 2/13

1

16c5 **Zb, 3.0.32**, Bündel 2/13, dBG, G. Kleinhans, Schneeeifel

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
- 3 Lbl: matt-dgrün, eifg, gekerbt, rdl + 5,8/0,3 + 3,6 + 62/65 % + 2/ka

3.0.33 Landsorte gelb, vermutlich Reneklode

2

50 **Z, 3.0.33**, LSt, nBG, gelbe Pflaume, Reneklode? H.L. Kramp, Wendorf, NW-M

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 wollig + 2. 1
- 3 Lbl: hellgrün, ellipt, grob ges, kilfg + 6,7/1,1 + 3,9 + 58/70 % + 3/wollig

51 **Z, 3.0.33**, Lst, nBG, gelbe Pflaume, Reneklode? H.L. Kramp, Wendorf, NW-M

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 wollig + 2. 1
- 3 Lbl: hellgrün, ellipt, ges, rdl + 5,9/0,7 + 3,0 + 51 %/58 % +wollig

3.0.34 Kricke s.l.

1

38 **Z, 3.0.34**, uBG, PPfl., Kricke, s.l., nähere Herkunft unbekannt

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2 ohne Dornen
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 3 + 2,1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 22.04.2016 - 2.5
- 3 Lbl: dgrün, br-ell, gekerbt, lang keilfg + 3,9/0,3 + 2,7 + 69/75% + 2/2

3.0.35 ockerfarbige Dornpflaume

2

24b **Z, 3.0.35**, dBG, PPfl, ockerfg Dornpflaume, H. Gretzmeier, Wolfshöhle 3, 79291, Merdingen, Breisgau, Öko-Kelterei, Tel 07668/94230. Wahrscheinlich eine Oval-Pflaume, dann 3.7.1.3.6; vielleicht auch eine Rund-Pflaume, dann 3.6.4. Entscheidung mit vorgelegten Früchten möglich.

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2
- 3 Lbl: mgr, ell, ges, keilf + 5,4/0,4 + 2,2 + 41/44 % + 2/2
- 4 Fr: ca. 3 cm, dick-oval, lange grünlich, dann sonnenseitig rötlich-ockerfarbg
- 5 St: 15,6~6,3~11,5 + 40 : 74 : 183
- 6 St sehr flach, Di:Br 183%, BNt ein wenig stärker ausladend, mit schwachem Wulst, Stiel-Ende zum Teil schwach abdrehend, Flanken glatt. Frucht mehlig schmeckend, keine Adstringenz.

53 a1 O 3.0.35, , dBG, PPfl, wie 24b Z

3.0.36, 69a W, nBG, Aroma-Zwetsche ?, Herkunft Peter Klock

1

gleich 15 Zb? 3.7.2.1?

- 4 Fr: 7 + A VIII + 27,7 ~ 23,8 ~ 24,4 + 86 : 88 : 103
- 5 St: 15,3 ~ 7,1 ~ 11,8 + 46 : 77 ; 166

3.0.37, 69 O, euBG, Karl Lunds plommen, über Henk Woldring, Nietap NL, 1 aus Süd-Schweden

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh2, fast gezähnt, jüngster Teil einseitig rot
- 3 Lbl: graugrün, ell, gekerbt, rdl + 7,8/1,5 + 4,0cm + 51/63% + bh3/4

3.0.38, 29 b3 Z, euBG, Krikon, über Henk Woldring. Nietap NL, aus Süd- S 1

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh 2, sehr kurz, nahezu gezähnt +
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 1.4 oval + 2.1 bh2 + 2.2 c + 2.3 paa
- 3 LBl: braugrün, ell, gekerbt, keilfg + 7/1 + 4cm + 57/67 + ka/1

3.0.39, 86 W, euBG, Krikon, Balsgard, über Henk Woldring. wie oben, VVA-1 1

gepflanzt 7.9. 2018, 3.7.1.2.2? Eierpflaume ? 5.8.19 unreif

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh 2, sehr kurz, fast gezähnt
- 3 LBl: dunkelgrün, etwas glänzend dickoval, grob gekerbt, rundl + 10,4/1,8 cm
6,8 + 65/79 + 2/1, Ober- und Unterseite stark hervortretende Adern
- 4 Fr: 4 + A IX + 3,9 ~ 2,9 ~ 3,1 + 74 : 79 : 107, rot
- 5 St: 22,9 ~ 8,0 ~ ,6 + 35 : 55 : 158
- 6 Fr lange Falte, Stiel bh 3

F 3.0.4.0 22x Z, direkt NW-Hütte, Gruppe Wurzelbrut 3

- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 5 + 1,4 oval + 2.1 bh1 dünn + 2.2 b + 2.3 eiz

B) Systematik mehr oder weniger geklaert, 349 Expl. 49

3.1 Unterart Kricke (sensu lato), Varianten Kricke, Wiechel, Ziparte

Prunus domestica ssp. *insititia* Bonnier et Layens plus Schneider

In dieser Darlegung wird unter 3.1. eine mittlere Fassung gewählt, also die zwischen der engeren ssp. *insititia* nach Bonnier et Layens und einer weiteren liegt, z.B. nach Schneider, die also die ssp. *prisca* nach Bertsch einbezieht. So handelt es sich um 16-29 mm große, mehr oder weniger kugelige, blaue, selten auch gelbe, über Wurzelbrut vermehrbare Pflaumen, deren Stiel- und Narben des Fruchtsteines im Körper verbleibt und deren Verhältnis Breite zur Länge nicht unter 42 % liegt. Die Längsachse dieser Steine ist senkrecht und gerade und nicht wie bei den Spillingen mehr oder weniger bogenförmig. Nur Teile der süddeutschen Kricke dürften identisch sein.

Die drei Varianten haben Früchte bis maximal 28,6-26,6-27,0 mm Größe und sind steinhaltend. Die Steinform ist symmetrisch und zeigt keine über den Körper gerade oder abgewinkelte, hinausragende Teile. Sie sind vorwiegend linsig (fast doppelspitzig) bis oval (beiderseits abgerundet), auch beidseitig unterschiedlich und deutlich weniger rundlich und sehr selten kugelig. Die Längsachse des Steines ist stets senkrecht und gerade. Frucht blau und mild bis herb, auch gelb und stark adstringierend.

In einfacher Betrachtung sind bei der Identifikation der Sippengruppe die Hauptteile (Laubblatt, Frucht, Stein) im Vergleich zur Schlehe meist größer, jedoch zu den meisten Pflaumen kleiner. Minimale Länge der Steingröße 9,8 mm, maximale Länge 16,9 mm.

3.1 Unterart Kricke, sensu lato (mit Wiechel und Ziparte), 118 Expl.

Stein klein, kernig, gerade-senkrechte Achse, ohne Stiel

. *87 Expl **A) Ind LBl 50,2%** (35-76%); **Ind Sprei 62,3** (41-98%), **B) Fr, 1. Grö , 23,0** (16,5-28,7) ~ **21,4** (14,5-29,0) ~ **23,0** (15,3-29,0), **2. Ind 93** (81-115): **100** (85-120) : **107** (100-114), **C) St ,1. Grö 12,8** (9,8-18,3) ~ **7,0** (5,4-11,8) ~ **9,6** (7,4-11,8), **2. Ind 55** (40-78) : **75** (60-99) : **137** (113-162)

Vergleich der Hauptformen der drei Varianten:

3.1.1 B) Fr, 1. Grö 21,3~21,2~22,1, C) St, 1.Grö 12,0~7,1~9,4, 2.Ind 59 : 78 : 132

3.1.2 B) Fr, 1. Grö 24,8~22,8~24,1, C) St, 1.Grö 13,6~7,1~9,7, 2.Ind 52 : 71 : 137

3.1.3 B) Fr, 1. Grö 22,9~20,2~22,7, C) St, 1.Grö 12,8~6,9~9,8, 2.Ind 54 : 77 : 142

3.1.1, Variante Kricke, sensu stricto, 90 Expl.

3.1.1 Variante a, Kricke (sensu stricto), einschließlich der blauen Ziparte

Frucht blau, wenig Gerbsäure, **Blü-/FrStiel stets kahl, 78 Expl**

Frucht blau, 16,6-28,6 mm lang, annähernd kugelig bis oval oder kürbisförmig, weniger als Roggen-, meist als Haferpflaume ausgebildet. Das Fruchtfleisch schmeckt meist weniger süßlich, mehr säuerlich-herbe, reif nicht adstringierend wirkend, darum vorzüglich für Marmeladen, Säfte und Ansätze

3.1.1a Hauptform der Kricke (sensu stricto) 78 Expl.

***55 Expl A) Ind LBl 51 (35-74) %; Ind Sprei 61 (43-83) %, B) Fr, 1. Grö 21,3 (16,5-28,6)~21,2 (14,5-26,6)~22,1 (15,3-27,0), 2. Ind 99,5 (81-115) : 104 (85-120) : 104 (100-112), C) St, 1. Grö 12,0 (9,8-17,6) ~7,1 (5,4-9,1)~9,4 (7,4-11,4) , 2. Ind 59 (41-78) :78 (60-98) : 132(113-161),**

Vergleich der vier Typen der Hauptform der Kricke (sensu stricto)

3.1.1a1 B) Fr, 1.Grö 20,7~19,8~20,4, C) St,1.Grö 12,4~6,5~8,9, 2.Ind 52: 72: 137

3.1.1a2 B) Fr, 1.Grö 22,4~20,6~21,5, C) St,1.Grö 12,6~6,5~8,9, 2.Ind 52: 71: 137

3.1.1a3 B) Fr, 1.Grö 20,8~21,7~22,8, C) St,1.Grö 11,7~7,5~9,8, 2.Ind 64: 84: 131

3.1.1a4 B) Fr, 1.Grö 21,1~22,6~23,7, C) St,1.Grö 11,2~7,7~9,8, 2.Ind 69: 88: 127

Typ a1 3.1.1 a1 Fruchtstein schlank, eher beidendig +/- gleich, linsig bis oval

43 Expl., Abb Fr-54O: 1/4 ; St + Lbl-6N: 4b/19/a/b

***28 Expl. A) Ind LBl 48 (35-74) %; Ind Sprei 57 (43-82) %, B) Fr, 1. Grö 20,7 (16,7-26,7) ~ 19,8 (14,5-25,5) ~20,4 (15,3-25,4), 2. Ind 96 (81-105) :98,5 (85-104) : 103 (100-107), C) ST, 1. Grö 12,4 (10,0-17,6) ~ 6,5 (5,4-8,5) ~ 8,9 (7,4-11,4), 2. Ind 52 (43-63) :72 (61-80) : 137 (122-150)**

51 W, 3.1.1a1, PPfl, euBG, Kricke (Krikon), C. Krüss, Aryd, Blekinge, Schweden

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2-3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz/paa

2.4 22.04.2015 bis 05.05

3 LBl: dgrün, eifg, stu-ges, br-keilfg + 5,8/0,8 + 3,0 + 52 %60 % + 2/2

4 Fr: 10 + A X + 16,7 ~ 14,5 ~ 15,3 + 87 : 92 : 106

5 St: 12,5~6,6~8,8 + 53 : 70 : 133 + St linsig-oval, L-Achse gerade, BNt starke Riefen , Fl. etwas gemuschelt

53a W, 3.1.1a1, PPfl, euBG, Kricke (Krikon), E.Hakonsson, Aryd, Blekinge, Sw

1 Spr 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 b

2.4 24.04.2015 bis 30.04.

3 LBl: dgrün, ell, ges, keilf + 5,4/0,7 + 2,8 + 52 %60 % + ka/1

4 Fr: + E IX + 16,8 ~ 16,6 ~ 16,6 + 99 : 99 : 100

5 St: 11,9 ~ 6,3 ~ 9,1 + 53:76:144 + St linsig-oval, L-Achse gerade, BNt 2 starke Riefen, Fl sehr feingrbg gerieft

6 Frucht s süß-herb-fruchtg

53b W, 3.1.1a1, PPfl, euBG, Kricke (Krikon), Ebbe Hakonsson, Aryd, Blekinge, Sw

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 2

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa

2.4 19.04.2015 bis 02.05.

3 LBl: dgrün-glzd, eif, s-stumpf-ges, abgerdt + 7,2/1,1 + 3,7 + 51/61 %

4 Fr: 5 + M IX + 19,0 ~ 17,8 ~ 19,0 + 94 : 100 : 107

- 5 St: 11,3 ~ 6,3 ~ 8,3 + 56 : 73 : 132 + St oval, L-Achse gerade, Fl glatt
- 54 O, 3.1.1a1**, nBG, Ppfl, Kricke, Neuhofer Weg, Bäk, Lbg
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 1 umgewandelte Triebe
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka 2.2 c + 2.3 paa
2.4 24.04.2015 bis 28.04.
- 3 LBl: mgrün, lanz, anlg-ges, keilfg + 7,5/1,4 + 2,6 + 3543 % + ka/1
- 4 Fr: 10 + A X + 19,0 ~ 17,7 ~ 18,4 + 93 : 97 : 104
- 5 St: 12,8 ~ 6,6 ~ 9,1 + 52:71:138 + St linsig, L-Achse gerade, B-Furche mit 2 Riefen, Fl sehr flach feingrbg gerieft
- 6 frühe gleichmäßige Beduftung, ein wenig adstringierend
- 25p N, 3.1.1a1**, PPfl, dBG, Kricke, Sorte Wildpfl Deggingen , Reis W. Hartmann Fi
- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 wollig + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 15.04.2016 - 27.04.
- 3 Lbl: mgrün, br-ellipt, gekerbt, rdl + 6,8/1,4 + 4,2 + 62/78 % + 3/1
- 4 Fr: 5 + A IX + 22,7~20,5~21,5 + 90 : 95 : 105
- 5 St: 14,0~6,9~9,7 + 49 : 69 : 141
- 6 Fr schwach eifg, starke Falte, blau, St schlank, gerade Achse, beiderseits gleich spitz
- 6 Za, 3.1.1a1**, PPfl, Kricke, nBG, Betzinger/Clement, Einhaus, Lbg
- 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 einz
2.4 20.04.2015 bis 04.05.
- 3 LBl: dgrün-glzd, verk-eifg, br-ges, keilfg + 5.5/1,1 + 2,1 + 38/48 % + 2/2
- 4 Fr: 10 + E IX + 19,5 ~ 19,5 ~ 19,5 + 100 : 100 : 100
- 5 St: 12,3 ~ 6,4 ~ 8,5 + 52 : 70 : 133 + StEd abgrdt, NbEd spitz, L-Achse gerade, BNt schwach, Fl feingrbg gerieft, frühe gleichmäß Beduftung
- 6 O, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, Betzinger/Clement, Einhaus, Lbg
- 1 Spr: 1.1 ka 1.2 bh1 + 2. 1
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 04.05.
- 3 LBl: dgrün-glzd, ell, ges, keilf + 7,2/1,2 + 3,0 + 42/50 % + 1/1
- 4 Fr: 10 + E IX + 21,6 ~ 20,7 ~ 20,7 + 96 : 96 : 100
- 5 St: 12,9 ~ 7,4 ~ 9,6 + 57 : 74 : 130 + StEd abgrdt, NbEd spitz, L-Achse gerade, BNt mittelstark, Fl mittelstark gerieft
- 6 frühe gleichmäßige Beduftung
- 16c1 Zb, 3.1.1a1**, PPfl, euBG, Kricke, s. stricto, Sorte Farleigh-Damson, GB, .
G. Staffel, Ahornblatt, Mainz
- 1 Spr: 1.1 bh3, s. kurz gezähnt + 1.2 ebenso + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2/3 + 1.4 2 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz + 2.4 17.04.2016 - 02.05.
- 3 Lbl: mgrün, ellipt, gekerbt, keilf + 7,9/1,1 + 3,1 + 39 %/46 % + ka/1
- 4 Fr: 5 + EVIII/AIX + 24,9~20,1~21,1 + 81 : 85 : 105
- 5 St 13,3~5,8~8,1 + 44 : 61 : 140
- 6 Fr dunkelblau, oval, zum Stiel etwas verjüngt, noch unreif, zarte Falte, Stein schlank linsig
- 16 O, 3.1.1a1**, PPfl, euBG, Kricke, E. Rößler, Feldkirchen, Kärnten, 1000 m NN,
Österreich. Das Gehölz starb durch Schermausfraß im Winter 2009/2010 !
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1
- 2 Blü 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz

- 3 LBl: gelbgrün, eifg, br-ges, keilfg + 7,2/0,9 + 3,9 + 54/62 % + 1/1
 4 Fr: 6 + E VIII/A IX + 19,1 ~ 18,0 ~ 18,5 + 94 : 97 : 103
 5 St: 11,4 ~ 6,1 ~ 8,4 + 54 : 74 : 138 + St oval, L-Achse gerade, BNt schwacher Wulst, Fl mit schwacher Mittelriefe
 6 frühe gleichmäßige Beduftung, süß-herb-aromatisch!
- 71 W, 3.1.1a1**, Ppfl, dBG, Kricke, Jauernick/Görlitz, Sachsen
 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh1 + 2. 1
 2 Blü: 2.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
 2.4 22.04.2015 bis 02.05.
 3 LBl: dgrün, ell, br-ges, abgrdt + 5,7/0,7 + 3,5 + 61/70 % + 3/1
 4 Fr: 10 + E VIII + 26,0 ~ 24,2 ~ 25,4 + 93 : 98 : 105
 5 St: 11,4 ~ 5,4 ~ 7,4 + 47 : 65 : 137 + St linsig, L-Achse gerade, StEd etwas abgerundet, BNt mit 2 Riefen, Fl zierlich gerieft
 6 frühe gleichmäßige Beduftung und E VIII vollreif
- 72 W, 3.1.1a1**, Ppfl, dBG, Kricke, Jauernick/Görlitz, Sachsen
 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh1 + 2. 1
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
 2.4 27.04.2015 bis 02.05.
 3 LBl: hgrün, eifg, br-ges, abgrdt + 5,5/0,5 + 3,4 + 62/68 % + 3/1
 4 Fr: 10 + E VIII + 26,0 ~ 24,2 ~ 25,4 + 93 : 98 : 105
 5 St: 11,8 ~ 5,8 ~ 8,2 + 49 : 69 : 141 + St linsig, L-Achse gerade, StEd gerade auslaufend, Fl symmetrisch, fast glatt, BNt 2 Riefen
 6 frühe gleichmäßige Beduftung und E VIII vollreif
- 25 Z, 3.1.1a1**, Ppfl, nBG, Kricke, Geertz, Kastorf-Bahnhof, Lbg
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
 2.4 24.04.2015 bis 03.05.
 3 LBl: dgrün, verk-eifg, anlg-ges, abgrdt + 6,4/1,1 + 2,7 + 42 /51 % + 1/1
 4 Fr: 10 + E IX + 20,3 ~ 19,7 ~ 19,7 + 97 : 97 : 100
 5 St: 12,3 ~ 6,8 ~ 9,2 + 55 : 75 : 135 + St linsig, L-Achse gerade, BNt mit 2 starken Riefen, Fl etwas riefig
 6 früh beduftet, spät reif
- 10 S, 3.1.1a1**, Ppfl, nBG, Kricke, Geertz, Kastorf-Bahnhof, Lbg
 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 bh2 + 2. 1
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + paa
 2.4 20.04.2015 bis 02.05.
 3 LBl: dgrün-glzd, verk-eifg, ges, keilfg + 7,0/1,1 + 3,0 + 43/51 % + 1/2
 4 Fr: 10 + M10 + 22,3 ~ 21,3 ~ 21,9 + 96 : 98 : 103
 5 St: 12,2 ~ 6,8 ~ 9,1 + 56 : 75 : 134
 6 Stein schön geformt, St linsig, L-Achse gerade, BNt 2 Riefen, Fl feingrubig gerieft
- 11 S, 3.1.1a1**, Ppfl, nBG, Kricke, Geertz, Kastorf-Bahnhof, Lbg
 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 bh2 + 2. 1
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
 2.4 19.04.2015 bis 02.05.
 3 LBl: dgrün-glzd, verk-eifg, ges, keilfg + 7,5/1,2 + 3,2 + 43/51 % + ka/1
 4 Fr: 10 + E IX + 21,2 ~ 20,5 ~ 21,8 + 97 : 103 : 106
 5 St: 12,6 ~ 6,9 ~ 9,3 + 55 : 74 : 135 + St linsig, L-Achse gerade, BNt 2 Riefen, Fl feingrubig gerieft

- 32 O, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, Geertz, Kastorf-Bahnhof, Lbg
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
 2.4 28.04.2015 bis 04.05.
 3 LBl: dgrün-glzd, ell, anlg-ges, keilfg + 7,5/1,5 + 3,0 + 40/50 % + 1/1
 4 Fr: 10 + A X + 20,1 ~ 18,1 ~ 19,1 + 90 : 95 : 106
 5 St: 11,7 ~ 6,3 ~ 8,7 + 54 : 74 : 138 + St linsig, L-Achse gerade, BNt Wulst mit Riefen, Fl feingrbg gerieft, früh gleichmäßig beduftet
- 8 Za, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, Nissen, Löstrup, Angeln
- 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 + 2. 2
 2 Blü 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
 2.4 22.04.2016 - 2.5.
 3 LBl: dgrün-glzd, verk-eifg, br-ges, etw keilfg + 5,2/0,8 + 2,6+50/59 % + 2/1
 4 Fr: 10 + M IX + 21,6 ~ 22,7 ~ 24,3 + 105 : 113 : 107
 5 St: 12,2 ~ 7,7 ~ 9,4 + 63 : 77 : 122 + St breit-linsenf, L-Achse gerade, StEd betont, aber gerade. BNt breiter Wulst, Fl am Stiel schwach gerieft
 6 Fr lange ungleichmäßig beduftet, sehr aromatisch!
- 53a4 O, 3.1.1.a1**, dBG, PPfl, Kricke, als kleine blaue Rostocker Primitivpflaume
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
 2.4 23.04.2016 - 30.04.
 3 LBl.: hgrün, ell, gkerbt, keilf + 8,0/1,4 + 3,5 + 44/53 % + 3/1
 4 Fr: 5 + A IX + 2,8 ~ 2,7 ~ 2,8 + 96 : 100 : 104, ohne Falte
 5 St: 13,9 ~ 7,0 ~ 11,2 + 50 : 81 : 160
- 49a W, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke?, Erika Carstensen, Neukirchen-Hesbüll, NF
- 1 Spr: 1.1 bh1 s kurz + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2-3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c
 2.4 23.04.2015 bis 03.05.
 3 LBl: dgrün, derb, ell, br-ges, abgrdt + 9,4/1,7 + 4,9 + 52/64 % + 1/1
 4 Fr: 6 + ME VIII + 26,7 ~ 24,5 ~ 25,4 + 92 : 95 : 104
 5 St: 15,5 ~ 6,5 ~ 9,4 + 42 : 61 : 145 + St linsig-oval-symmetrisch, StEd abgerundet, NaEd spitz
- 6 N, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Knick, Friedrichshain, Oelixdorf, Steinburg
- 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 + 2. umgewandelte Triebe
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
 2.4 21.04.15 bis 01.05. **Abb** Fr-54O: 1/4 ; St + Lbl-6N: 4b/19/a/b
 3 LBl: dgrün, lanz, ges, keilfg + 7,6/2,2 + 3,3 + 43/61 % + 3/3
 4 Fr: 5 + E IX/A X + 18,0 ~ 18,0 ~ 18,5 + 100 : 103 : 103
 5 St: 11,5 ~ 6,5 ~ 8,5 + 57 : 74 : 131 + St dick linsig, L-Achse gerade, BNt deutlicher Wulst mit 2 Riefen, Fl flach, feingrubig gerieft
 6 früh gleichmäßig beduftet, angenehm kräftig herbe, nicht adstrgd.
- 7 N, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, Knick, Friedrichshain, Oelixdorf, Stbg
- 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 + 2. umgewandelte Triebe
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.2 4-6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
 2.4 21.04.2015 bis 01.05.
 3 LBl: dgrün, lanz, anlg-ges, abgrdt-keilfg + 7,2/1,8 + 3,0 + 42/56 % + 3/3
 4 Fr: 10 + E IX/A X + 19,5 ~ 18,8 ~ 19,4 + 96 : 99 : 103
 5 St: 12,0 ~ 6,5 ~ 8,6 + 52 : 72 : 132 + St dick linsig, L-Achse gerade, Bnt deutlicher Wulst mit 2 Riefen, Fl flach feingrbg gerieft,

- 6 früh gleichmäßig beduftet, angenehm kräftig herbe, nicht stringierend
- 66 W, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, Teschow, Uwe Arnsberg, Petersberg, NW-M
- 1 Spr: 1.1 wollig + 1,2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2-3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3
2.4 21.04.2015 bis 01.05.
- 3 LBl: dgrün, derb, eifg, br-ges, abgrdt + 7,1/1,2 + 4,8 + 68/81 % + 1/1
- 4 Fr: 5 + E VIII/A IX + 17,6 ~ 17,5 ~ 17,6 + 99 : 100 : 101
- 5 St: 10,0~6,0~7,6 + 60 : 76 : 127 + St linsig, L-Achse gerade, Fl glatt
- 6 Frucht kugelig, Stein sehr klein!
- 70a1 W, 3.1.1a1** PPfl, nBG, Kricke, Johs. Nath, RZ-Dermin
- 1 Sp 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 02.05.
- 3 LBl: dgrün, verk-eifg. ges, keilfg + 8,0/1,0 + 3,8 + 48 /54 % + 1/1
- 4 Fr: 10 + M IX + 18.5 ~ 18,1 ~ 18,4 + 98 : 99 : 102
- 5 St: 12,6~6,5~9,1 + 52 : 72: 144 + St oval, L-Achse gerade, BNt
breiter Wulst, 2 Riefen, Fl glatt
- 6 Frühe gleichmäßige Beduftung, fast keine Adstringenz, sehr saftig
- 85 W, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Johs. Nath, RZ-Dermin, Slg ?
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1,3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 19.04.2015 bis 01.05.
- 3 LBl: gelbgrün, lanz, br-ges, keilf + 8,3/1,3 + 3,7 + 45/53 % + 3/3
- 4 Fr: 6 + A X + 18.3 ~ 17,3 ~ 17,9 + 95 : 98 : 103
- 5 St: 10,9 ~ 5,9 ~ 8,0 + 54 : 73 : 136 + St oval-linsig, L-Achse gerade,
Fl zierlich gerieft
- 6 LBl stark genervt, Frucht wirkt sehr stark adstringierend!
- 37 S, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, E.Kudsk, RZ- Vorstadt
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1/2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz/paa
2.4 23.04.2016 - 07.05.
- 3 LBl: dgrün-glzd, br-ell, br-ges, keilfg + 7,1/1,1 + 3,3 + 46/55 % + ka/1
- 4 Fr: 10 + E IX/A X + 20,2 ~ 19,3 ~ 20,3 + 96 : 100 : 105
- 5 St: 11,7 ~ 6,8 ~ 9,3 + 58 : 79 : 137 + StEd abgrdt, NbEd etwas spitz,
L-Achse gerade, BNt mittlerer Wulst, Fl feingrubig gerieft
- 6 frühe gleichmäßige Beduftung, säuerlich, sehr kräftig
- 64 W, 3.1.1a1** PPfl, Kricke E. Kosin, RZ-Vorstadt,
- 1 Spr: 1. bh1 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3
einz + 2.4 18.04.2015 bis 06.05.
- 3 LBl: dgrün-glzd, ell, ges, keilf + 6,3/0,9 + 3,5 + 56/65 % + 1/1
- 2017**
- 4 Fr: 3 + X + 18,1 ~ 16,8 ~ 17,0 + 93 : 94 : 101
- 5 St: 12,2 ~ 6,7 ~ 9,7 + 55 : 80 : 145
- 6 Frucht stark adstringierend, FSt oval, Nt unauffällig, Fl fein marmoriert.
- 2018 extrem Trockenjahr, Ernte 17. August**
- 4 Fr: 4 + unreif, sehr hart + 18,7~17,3~18,2 + 93 : 97 : 105
- 5 St: 12,9~6,8~9,7 + 53 : 75 : 143
St gerade Achse, Fl gleichmäßig gemuschelt, typisch 3.1.2

2018 Ernte 30.09

- 4 Fr: 7 + s reif + 19,9~17,8~18,7 + 89 94 : 105
5 St: 12,7~7,7~10,6 + 61 : 83 : 138 Flanken kräftig gemuschelt
- 70c W, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, Heinrich Franzen, An de Pütt, Satrup, Angeln
1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh 1 + 2 0.
2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 bh0 + 2.2 b
2.4 28.04.2015 bis 10.05.
3 LBl: dgrün-glzd, ell, stumpf-ges, keilf + 7.6/1,5 + 3,3 + 43/54 % + 3/2
4 Fr 5 + E VIII/A IX + 21,8~21,9~21,9 + 100 : 100 : 100
5 St: 13,9~6,4~9,3 + 46 : 67 : 145 + ST etwas gebogen-linsig
6 Deutliche Furche, milder Geschmack; St mit langer Spitze. Achtung: FrST Extrem kurz behaart. **Überprüfung ob 3.1.3?**
- 70d W, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, Heinrich Franzen, An de Pütt, Satrup, Angeln
1 Spr: 1.1 ka 1.2 + 2. 0
2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 3 + 2.1 + 2.2 c
3 LBl: mgrün, ell, stumpf-ges, abgerdet + 6,7/1,2 + 3,6 + 54/65 % + 3/3
4 Fr: 1 + E VIII + 25,3~25,5~26,1 + 101 : 103 : 102
5 St: 13,9 ~ 7,0 ~ 9,9 + 50 : 71 : 141
6 blaue kugelige Frucht, St gerade Achse, schlank, beidseitig gleich spitz
- 32 Z 3.1.2a**, PPfl, nBG, Kricke, Heinrich Franzen, An de Pütt, Satrup, Angeln
1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + b + 2.3 eiz
3 LBl: mgrün, verkeif, groges, keilf + 6,2/1,1 + 3,1 + 50 / 61 % + 3/1
4 Fr: 5 + E VIII + 3,0 ~ 2,7 ~ 2,9 + 90 : 97 : 107
5 St: 16,1 ~ 7,7 ~ 10,1 + 48 : 63 : 131
Fr blau mit Hauch
- 26 N, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, 50m am Wegrand, Stakendorf, Plön
1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0, jg Triebe rt-violett
2 Blü: 1.1 w + 1.2 + 1.3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
2.4 02.05.2016 - 09.05.
3 LBl: mgrün, lanz, ges, abgr'dt + 5,8/1,0 + 3,5 + 60/73 % + 3/3
4 Fr: 5 + E VIII + 25,9~24,5~24,7 + 95 : 95 : 101
5 St: 17,6~7,6~11,4 + 43 : 64 : 150
6 Fr rotblau, St schlank, noch gerade Achse, beiderseits ähnlich. Gehölz ist feingliedrig. **Fruchtfarbe beobachten! Laubausbruch sehr spät!**
- 9 O, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, alter Schulknick, Stockelsdorf, OH,
1 Spr: 1.1 bh0 + 1.2 + 2. 1
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 21.04.2015 bis 03.05.
3 LBl: mgrün-glzd, verk-eifg, ges, keilf + 6,4/0,8 + 2,6 + 41/46 %+ ka/1
4 Fr: 5 + E IX + 18,4 ~ 17,5 ~ 19,2 + 95 : 104 : 110
5 St: 12,5 ~ 6,6 ~ 9,2 + 53 : 74 : 139 + St grob linsig, L-Achse gerade, BNt starke Riefen, Fl besonders am Stielende gerieft
6 sehr schwach adstringierend, mit Pflaumenfalte!
- 8 O, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, alter Schulknick, Stockelsdorf, OH
1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz

- 2.4 21.04.2015 bis 03.05.
- 3 LBl: mgrün-glzd, verk-eifg, ges, keilfg + 5,5/0,7 +2,1 + 38/44 % + !/1
 4 Fr: 8 + E IX + 16,9 ~ 16,2 ~ 17,1 + 96 : 101 : 106
 5 St: 12,0 ~ 8,5 ~ 8,9 + 54 : 74 - 137 + St oval, L-Achse gerade, BNt
 Wulst gering, Fl am Stiel gerieft
 6 sehr schwach adstringierend
- 37 Z, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, Stove, NW-M
 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
 2.4 24.04.2015 bis 03.05.
 3 LBl: mgrün-glzd, ell, s-stumpf-ges, keilf + 7,2/1,1 +3,6 + 59/59 % + 1/2
 4 Fr: 5 + M IX + 19,1~18,9~19,9 + 99 : 104 : 105
 5 St: 10,6~6,4~8,5 + 60 : 80 : 133 + St linsig-oval, L-Achse gerade
 6 LBl mit stark hervortretenden Nerven
- 23 W, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke von J. Mertens, Ziethen, Lbg
 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
 2.4 21.04.2015 bis 06.05.
 3 LBl: drün-glzd, verk-eifg, ges?, keilfg + 7,5/1,4 + 3,0 + 40/49 % + 2/2
 4 Fr: 10 + E IX + 18,7 ~ 19,2 ~ 19,2 + 103 : 103 : 100
 5 St: 11,8 ~ 6,6 ~ 8,9 + 56 : 75 : 135 + St oval-linsig, L-Achse gerade,
 BNt schmal, Fl feingrbg gerieft
 6 frühe gleichmäßige Beduftung, Gehölz großwüchsig
- 24 W, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, J. Mertens, Ziethen, Lbg, wie 23 W
 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka? + 2.
 2 Blü: 2.4 21.04.2015 bis 06.05.
 3 Lbl: dgrün-glzd,+/-rdl-ellipt, gekerbt, rdl + 6,2/0,6 +4,6 +74 /82 % + 2/1
 4 Fr: 7 + A IX + 20,e ~ 18,9 ~ 18,9 + 93 : 93 : 100
 5 St: 12,9 ~ 6,9 ~ 9,6 + 53 : 74 : 139
- 25 W, 3.1.1a1**, PPfl, nBG, Kricke, J. Mertens, Ziethen, Lbg
 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh1 + 2.
 2 Blü: 2.4 21.04.2015 bis 06.05.
 3 Lbl: dgrün-glzd, verkt-eifg, gekerbt, keilfg +7,8/1,2+ 3,3 + 42/50 %+ 2/1
 4 Fr: 7 + A IX + 19,0 ~ 16,8 ~ 16,8 + 84 : 84 : 100
 5 St: 12,0 ~ 7,0 ~ 9,6 + 58 : 80 : 137
- 59 N, 3.1.1a1**, euBG, PPfl, Kricke, Sliwa lubaszka, Bryki, östl Warschau, Polen
 1 Spr: 1.1 ka + 1,2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
 3 LBl: mgrün, lanz, ges, abgerdt + 5,7/0,7 + 2,8 + 49 %/56 % + 3/2
 4 Fr: 7 + A IX + 2,4 ~ 2,2 ~ 2,3 + 92 : 96 : 105, teilweise starke Falte
 5 St: 14,4 ~ 6,0 ~ 8,9 + 42 : 62 : 148
- 3.1.1a1 Kricke, Sorte Wissembourg : Alsace (F), bei Bad Bergzabern (D), Dieter.Schmidt, Marktstr. 4, 76889 Oberrotterbach, euBG, **Abb** St-54aW: 4b/19b
 LBl 6,3, davon Stiel 1,0 , Spreite 4,6, Indiz LBISprei 73/87 % + Indizes der Steine
 56 : 71 : 129 Geliefertes Material von D. Schmidt
 Junge Triebe mit vielen hervorragenden Lentizellen, grobe Struktur, auch die Lbl,
 Form br-ellipt bis rdl, breit ges., Stein linsig, L-Achse gerade, BNt wenig stärker
 gewölbt, Fr kürbisfg mit schwach rotem Saft
- 54a W, 3.1.1a1**, PPfl, euBG, Kricke, D. Schmidt, Wissembourg F, Utlg Myrobalane
 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 gzä + 2. 0 **Abb** St-54aW: 4b/19b

- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
3 Lbl: mgrün, elliptisch, anlg-ges, eilfg + 6,7/1 + 3,5 + 52/61 % + ka/1
4 Fr: 7 + A IX + 20-6 ~ 21,2 ~ 21,2 + 103 : 103 : 100
5 St: 13,4 ~ 7,1 ~ 9,9 + 53 : 74 : 139, **Abb St 4b/19b**
- 54b **W, 3.1.1a1**, Ppfl, euBG, Kricke, D. Schmidt, Wissembourg F, Utlg Myrobalane
1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 gzä + 2. 0
2 Blü: 1,1 sw 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2,2 + d + 2.3 eiz
3 Lbl: dgrün-glzd, br-ellipti, anlg-ges, br-keilfg +6,1/0,8 +3,5+57/61% + ka/1
4 Fr: 6 + A IX + 20,1 ~ 19,5 ~ 20,1 + 97 : 100 : 103
5 St: 13,0 ~ 7,2 ~ 9,0 + 55 . 69 : 125
- 54c **W, 3.1.1a1**, PPfl, euBG, Kricke, D. Schmidt, Wissembourg F, Utlg Myrobalane
1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 bh1 + 2. 0
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
3 Lbl: dgrün-glzd, br-ellipt-rdl, br-ges, gerdt + 4,6/0,8 +3,4 + 74/89% + ½
4 Fr: 7 + A IX + 20,0 ~ 19,6 ~ 20,0 + 98 : 100 : 102
5 St: 13,5 ~ 6,9 ~ 10,0 + 51 : 74 : 145
- 54d **W, 3.1.1a1**, PPfl, euBG, Kricke, D.Schmidt, Wissembourg F, Utlg Myrobalane
1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 k + 2. 0
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
2.4 21.04.2016 - 01.05.
3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, br-ges, keilfg + 6,1/1,1 + 2,9 + 48/58 % + ka/1
4 Fr: 7 + A IX + 20,2 ~ 21,5 ~ 21,5 + 106 : 106 : 100
5 St: 12,7 ~ 6,9 ~ 9,4 + 54 : 74 : 136
- 25a **N, 3.1.1a1** PPfl, euBG, Kricke, D.Schmidt, Wissembourg F, Utlg Myrobalane
1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 4 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
2.4 26.04.2015 bis 04.05.
3 Lbl: dgrün-glzd, br-ellipt, br-ges, noch keilfg +6,6/0,6+3,5+53/58%+ka/1
4 Fr: 1 + A IX + 19,0~19,4~20,1 + 102 :106 : 104
5 St: 11,0~6,5~7,6 + 59 : 69 : 117
6 Fr weich-fruchtig; St gerade Achse, ohne Stiel, linsig, Stielende gering breiter, Fl glatt. Grundlage für 3.1.1a noch nicht gegeben.
- 25b **N, 3.1.1a1**, PPfl, euBG, Kricke, D.Schmidt, Wissembourg F, Utlg Myrobalane
1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 2
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2-3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 a 2.3 einz
3 Lbl: dgrün-glzd, br-ellipt, br-ges, noch keilfg+6,3/1,1+ 4,0 + 63/77%, k
4 Fr: 6 + A VIII + 19,3 ~ 18,9 ~ 19,8 + 98 : 103 : 105
5 St: 12,9 ~ 6,9 ~ 9,1 + 53 : 71 : 132
- 28 **S, 3.1.1.a1**, euBG, PPfl, Kricke, sliwa lubaszka, Bryki, östl Warschau, Polen
1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d 2.3 eiz/paa
2.4 21.04.2016 - 27.04.
3 LBl: dgrün, ell, s-stumpf-ges, abgerdt + 6,0/0,7 + 3,2 + 53/60% + 3/2
4 Fr: 8 + A IX + 2,4 ~ 2,1 ~ 2,2 + 88 : 92 : 105, mit Stielgrube
5 St: 14,6 ~ 6,3 ~ 9,7 + 43 : 66 : 154
6 Derbe LBl, feingliedrige rote jg. Triebe

Typ a2, 3.1.1 a2 Fruchtstein noch schlank, mit ungleichen Enden

16 Expl., Abb St + Lbl-24aN: 4b/20

*14 Expl A) Ind LBl 51 % (37-73%); Ind Sprei 60 % (45-81%), B) Fr, 1. Grö 22,4 (16,5-28,6) ~20,6 (16,1-25,1) ~21,5 (17,0-26,2), 2. Ind 92 (86-98) : 96 (88-103) : 104 (100-107), C) St, 1: Grö, 12,6 (10,5-14,5) ~6,5 (5,6-7,5)~ 8,9 (7,7-10,3), 2. Ind 52 (41-64) : 71 (60-79) : 137 (120-161)

52a W, 3.1.1a2, PPfl, euBG, Kricke, Christiane Krüss, Aryd, Blekinge, Schweden

1 Spr: 1.1 ka + 1,2 + 2. 1

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 Paa
2.4 24.04.2015 - 03.05.

3 LBl: dgrün, ell, ges, keilf + 5,7/0,9 + 2,2 + 39/46 % + $\frac{3}{4}$

4 Fr: 7 + M VIII + 22,8 ~ 20,2 ~ 24,8 + 89 : 109 : 123

5 St: 17,3 ~ 8,7 ~ 11,6 + 50 : 81 : 133

61 O, 3.1.1a2, PPfl, nBG, Kricke? Neuhofer Weg, Bäk, Lbg

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh2 + 2. 5

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 5 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
2.4 24.04.2015 bis 01.05.

3 LBl: dgrün-glzd, derb, ell, keilf + 5,7/1,0 + 2,1 + 37 % 45 % + ka/1

4 Fr: 5 + M IX + 19,3 ~ 17,6 ~ 18,0 + 91 : 93 : 102

5 St: 11,1~6,1~8,1 + 55 : 73 : 133 + St oval, L-Achse gerade, NbEd spitz

6 Frucht tropfenförmig. Schwach adstringierend !

7 O, 3.1.1a2, PPfl, nBG, Kricke, Betzinger/Clement, Einhaus, Lbg

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 21.04.2015 bis 04.05.

3 LBl: dgrün, verk-eifg, ges, abgrdt-keilfg + 5,5/0,5 + 2,3 + 42/46 % + 1/ka

4 Fr: 10 + E IX/A X + 16,5 ~ 16,1 ~ 17,0 + 98 : 103 : 106

5 St: 10,5 ~ 6,7 ~ 8,2 + 64 : 78 : 122 + St oval, L-Achse gerade, BNt breiter Wulst, Fl kurzen Riefen am Stielende

6 frühe gleichmäßige Beduftung, säuerlich-fruchtig, etwas adstringierend

19 S 3.1.1a2, PPfl, nBG, Kricke, H. Björnsen, Falshöft, Angeln, Slg ?

1 Spr 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 1

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 01.05.

3 LBl: dgrün, ell, ges, keilfg-abgrdt + 5,5/0,7 + 2,7 + 49/56 % + 1/1

4 Fr: 10 + E IX + 17,3 ~ 16,8 ~ 17,9 + 97 : 103 : 107

5 St: 11,9~6,7~9,4 + 56 : 79 : 140, St linsig-oval, L.Achse gerade, BNt breit mit 2 schwachen Riefen, Fl schwach im Stielbereich gerieft

6 schmeckt mehlig, aber kräftig

25 O, 3.1.1a2, PPfl, nBG, Kricke, Knick Sußberg, Gr. Sarau, Lbg, siehe 24 O !

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh2 + 2. 3 Umbildung zu Kurztrieben

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 d + paa
2.4 20.04.2015 bis 05.05.

3 LBl: dgrün-glzd, ell, ges, keilf + 7,3/0,6 + 3,0 + 41 /45 % + 3/3

4 Fr: 3 + E IX/A X + 23,9 ~ 22,7 ~ 23,4 + 95 : 98 : 103

5 St: 12,7 ~ 6,6 ~ 9,5 + 52 : 74 : 144 + St oval, L-Achse gerade, BNt breiter Wulst, mit 2 Riefen, Fl fast glatt

- 6 fruchtig-herb, kaum adstringierend
- 27 S, 3.1.1a2**, PPfl, dBG, Kricke, Jauernick bei Görlitz, Sachsen
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c + einz
2.4 21.04.2015 bis 03.05.
- 3 LBl: grau-dgrün, verk-eifg, s-br-ges, gut abgrdt + 5,5/0,4+3,9 +71/76 % + 3/2
- 4 Fr: 5 + A/M VIII + 26,0 ~ 24,2 ~ 25,4 + 93 : 98 : 105
- 5 St: 11,7 ~ 5,9 ~ 8,5 + 50 : 73 : 144 + St gleichmäßig oval, L-Achse gerade, StEd kurz und gerade, BNt mäßig dick,
- 6 eine vorzügliche Frucht, s. lange StBl, E VIII voll reif
- 20 S, 3.1.1a2**, PPfl, nBG, Kricke, Geertz, Kastorf-Bhf, Lbg
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 2
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 18.04.2015 bis 01.05.
- 3 LBl: mgrün, lanz, ges, keilfg + 6,3/1,2 + 3,1 + 49/61 % + 3/2
- 4 Fr: 5 + E IX + 21,9 ~ 21,1 ~ 22,2 + 96 : 101 : 105
- 5 St: 12,3 ~ 6,7 ~ 8,9 + 54 : 72 : 133, St oval, L-Achse gerade, Stiel nicht ausladend, aber deutlich angedeutet, BNt kräftig, Fl fein-grubig gerieft,
- 6 Frucht kugelig, herbe, aber kaum adstringierend
- 22 N, 3.1.1a2**, PPfl, nBG, Kricke, Weg Lassahn-Neuenkirchen, NW-M
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 1 dickrutig
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.3 2 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 21.04.2015 bis 03.05.
- 3 LBl: dgrün, verk-eifg, br-ges, keilfg + 8,4/1,6 + 3,4 + 40/50 % + 1/1
- 4 Fr: 5 + E IX + 24,3 ~ 21,7 ~ 22,3 + 89 : 92 : 103
- 5 St: 14,5~7,5~10,3 + 52 : 71 : 139 + St grob oval, L-Achse gerade, BNt starker Wulst sehr breit, Fl etwas gemuschelt
- 33 W, 3.1.1a2**, PPfl, euBG, Kricke, über Horst Franzen, Maasholm, Lyoe (DK)
- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 2
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
2.4 9.04.2015 bis 01.05
- 3 LBl: dgrün, derb, br-ell, br-ges, abgrdt + 4,8/0,5 + 3,5 + 73/81 % + 2/2
- 4 Fr: 10 + A IX + 23,4 ~ 20,8 ~ 22,9 + 88 : 94 : 105
- 5 St: 12,5 ~ 6,7 ~ 8,7 + 54 : 70 : 130
- 6 Fr blau, kugelig, St noch gerade Achse, z.T. etwas abgewinkelt, beidendig unterschiedlich, Fr aromatisch, 3.4.2?
- 33 Z, 3.1.1a2** PPfl, nBG, Kricke, Erika Carstensen, Neukirchen-Hesbüll, NF
- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4/6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
2.4 24.04.2015 bis 03.05.
- 3 LBl: hgrün, eif, stumpf-ges, keilf + 6,3/1,6 + 2,9 + 46/62 % 3/1
- 2018** 4 Fr: 5 + AIX + 26,3~23,1~23,9 + 88 : 91 : 103
- 5 St: 13,5~5,6~9,0 + 41 : 67 : 161, Stielende deutlich breiter
- 2019** 4 Fr: 5 + AIX + 2,8 ~ 2,5 ~ 2,7 + 89 : 96 : 108
- 5 St: 14,8 ~ 6,4 ~ 9,5 + 43 : 64 : 148
- 48 W, 3.1.1a2**, PPfl, nBG, Kricke, Erika Carstensen, Neukirchen-Hesbüll, NF
- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 0

- 2 Blü 1.1 w + 1.2 2-3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 23.04.2015 bis 01.05.
- 3 LBl: dgrün, derb, eif, mäßig gek, abgrdt + 7/1 + 4 + 57/67 % + 3/3
- 4 Fr: 8 + A VIII + 28,6 ~ 25,1 ~ 26,2 + 88 : 92 : 104
- 5 St: 1 4,4~7,2~8,7 + 50 : 60 : 124 + Stein oval-symmetrisch,
Bauchende verdickt, Flanken glatt
- 49b W, 3.1.1a2**, PPfl, nBG, Kricke?, Erika Carstensen, Neukirchen-Hesbüll, NF
- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü 1.1 w + 1.2 2-3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 23.04.2015 bis 30.04.
- 3 LBl: dgrün, derb, ell, br-ges, abgrdt + 8,3/1,5 + 4,7 + 57/69 % + 1/2
- 4 Fr: 3 + A VIII + 25,6 ~ 22,0 ~ 22,6 + 86 : 88 : 103
- 5 St: 13,0~5,7~8,2 + 44 : 63 : 144 + St hat größte Dicke nach einem
Drittel, beidendig abgerundet
- 34 Z, 3.1.1a2**, PPfl, nBG, Kricke?, Erika Carstensen, Neukirchen-Hesbüll, NF
- 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 + 2. ka
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4/6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
- 3 LBl: mgrün, eif, ges, abgerdt + 4,7/1,1 + 2,3 + 49/64 % 3/1
- 4 Fr: 5 + EVIII + 2,8 ~ 2,6 ~ 2,8 + 93 : 100 : 108
- 5 St: 15,6 ~ 7,1 ~ 9,7 + 46 : 62 : 137
- 25 S, 3.1.1a2**, PPfl, nBG, Kricke, Johs.Nath, Ratzeburg-Dermin, über U.Mangelsen
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 02.05.
- 3 LBl: mgrün, ell, br-ges, keilfg + 7,0/1,3 + 3,3 + 47 %/58 % + ka/2
- 4 Fr: 8 + A IX + 18,4 ~ 17,8 ~ 17,8 + 97 : 97 : 100
- 5 St: 12,7~6,6~8,9 + 52 : 70 : 139 + St oval, L-Achse gerade, BNt 2
Riefen, am Stiel 2 halblg Riefen
- 6 Frühe gleichmäßige Beduftung, aber spät reif
- 30a S, 3.1.1a2**, PPfl, nBG, Kricke, Johs. Nath, RZ-Dermin
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b 2.3 paa
2.4 02.04.2015 bis 05.05.
- 3 LBl: mgrün-glzd, verk-eifg, ges, keilfg + 6,1/1,1 + 3,0 + 49 /60 % + ka/1
- 4 Fr: 10 + A X + 18,8 ~ 17,9 ~ 18,3 + 95 : 97 : 102
- 5 St: 12,5 ~ 6,7 ~ 9,2 + 54:74:137 + StEd abgrdt, NbEd etwas spitz, L-
Achse gerade, BNt 2 starke Riefen, Fl s schwach gerieft
- 6 frühe Beduftung, kräftig-fruchtig, nicht adstringierend
- 24a N, 3.1.1a2**, PPfl, nBG, Kricke, H. Franzen, Pütt, Satrup, Angeln
- 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 + 2. 0 + **Abb** St + Lbl-24aN: 4b/20
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 24.04.2015 bis 08.05.
- 3 LBl: dgrün-glzd, ell, br-ges, keilfg + 7,5/1,1 + 3,5 + 47/55 % + 3/2
- 4 Fr: 10 + E VIII/A IX + 25,9 ~ 23,7 ~ 25,4 + 92 : 98 : 107
- 5 St: 16,3~7,1~9,8 + 44 : 60 : 124, + StEd abgrdt, NbEd spitz, L-
Achse gerade, stark betonte BNt, breiter Wulst, Fl glatt
- 6 ange unterschiedlich beduftet, süßlich-herb-aromatisch, vorzüglich

Typ a 3, 3.1.1 a3 Stein rundlicher, Flanken glatt

11 Expl.Abb St + Lbl-30a O: 4b/21

LBL 48 % (46-55%); **Ind Sprei 55 %** (55-62 %), **B) Fr, 1. Grö 20,8** (18,8-24,1)~**21,7** (16,0-26,6)~**22,8** (17,9-27,0), **2. Ind 104** 85- 115) : **110** (95-120) : **105** (102-112), **C) St, 1. Grö 11,7** (10,4-12,3) ~**7,5** (6,0-9,1)~**9,8** (9.2-10,3), **+2. Ind 64** (52-76) : **84** (81-90) : **131** (113-156)

53 07 O, 3.1.1a3, euBG, PPfl, Kricke mit rdl Stein, Dalarna, SW

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 1 + 1.4 längl + 2.1 ka + 2,2 b + 2.3 eiz
17a **Zb, 3.1.1a3**, PPfl, dBG, Kricke, W. Illig, Ilsenburg, Fundort NW Bad Suderode

1 Spr: 1.1 bh2 s.kurz + 1.2 + 2. 0 **Abb** St-17a Zb: 4b/25

3 LBl: hgrün, breit-ell, ges, abgerdt + 5,0/0,7 + 2,5 + 50/58 % + 2/3

4 Fr: 9 + E VIII + 2,2 ~ 1,98 ~ 2,0 + 90 : 90,1 ~ 101, FrStiel ka

5 St: 13,2 ~ 6,1 ~ 9,7 + 46 : 73 : 159

35 W, 3.1.1a3, PPfl, dBG, Kricke, Tobias Vogel, Hauptstr. 58, 91355 Hiltpoltstein von MB Buckenreuth, Oberpfalz

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 19.04.2015 bis 02.05.

3 LBl: mgrün, eif, br-ges, abgrdt + 6,6/0,6 + 3,6 + 55/60 % + 3/3

4 Fr: 5 + M VIII + 20,0 ~ 20,1 ~ 21,6 + 101 : 108 : 107

5 St: 10,4 ~ 7,2 ~ 9,4 + 69 : 90 : 131 + St rundlich-symmetrisch, L-Achse gerade

6 Fl stark gerieft, StEd betont

77 W 3.1.1a3, PPfl, Kricke, als 3.0.25 blaue Ziparte von A. Lugmair, Alkoven, OÖ

1 Spr: 1.1 + 1.2 gezä + 2.

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz

3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 11,4/1,4 + 6,0 + 53/60 % + 2/2

4 Fr: 9 + A IX + 2,6 ~ 2,5 ~ 2,6 + 96 : 100 : 104. Falte unteres Drittel

5 St: 15,7 ~ 7,0 ~ 10,6 + 45 : 68 : 151

22 O, 3.1.1a3, Pfl, nBG, Kricke, H. Björnsen, Falshöft, Angeln

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 5 Umbildung zu Kurztrieben

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 19.04.2015 bis 30.04.

3 LBl: dgrün, derb, br-ell, br-ges, abgrdt +5,6/0,8 +2,7 + 48/56 % + 2/1

4 FR: 2 + A X + 22,5~23,8~24,7 + 106 : 110 : 104

5 St: 12,3~8,1~10,3 + 66 : 84 : 127 + St dick eiförmig

6 Spät reif, rötl Saft, etwas adstrgrd, St dicker Wulst, Fl am Stiel grft

38 O, 3.1.1a3 PPfl, dBG, Kricke, Fa E. Kiefer, Ortenberg, BD, Utlg. 2

1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 3-6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 28.04.2015 bis 03.05.

3 LBl: dgrün, verk-eif, anlg-ges, keilfg + 9,0/1,5 + 4,1 + 46/55 % + 3/1

4 Fr: 10 + E IX + 19,2 ~ 20,7 ~ 21,6 + 108 : 113 : 104

5 St: 11,1 ~ 6,0 ~ 9,2 + 54 : 83 : 153 + St rundlich, L-Achse gerade, Fl feingrubig gerieft, St-Größe variiert stark

6 Das Gehölz wurde als blaue Ziparte geliefert und schmeckt bei starker Reife saftig und wenig herbe

25v **N 3.1.1a3**. PPfl, Kricke, Beckele, als 3.0.19 Reis W.Hartmann, Uni Hohenheim

- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 bh3 + 2. 0
 3 Lbl: hellgrün, ellipt, ges, keilfg + 4,9/1,2 + 2,8 + 57 %/76 % + 3/wollig
 4 Fr: 6 + A IX + 2,5 ~ 2,4 ~ 2,6 + 96 : 104 : 108, FrStiel kahl
 5 St: 14,3 ~ 7,8 ~ 9,1 + 55 : 64 : 117
 6 leichte Falte beim Stielloch
- 30a O, **3.1.1 a3** PPfl, euBG, Kricke, T. Lindenthal, Ingelsbo/Garpenbo, Dalarna,
 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
 3 LBl: hgrün, ell, ges, klfg + 4,7/0,5 + 2,3 + 49/55 % + 1/ka
 4 Fr: 5 + A IX + 18,8~16,0~17,9 + 85 : 95 : 112
 5 St: 12,1~6,1~10,0 + 50 : 83 : 164, **Abb** St + Lbl-30a O: 4b/21
 6 Stein L-Achse gerade, oval, BNaht etwas hervorgehoben, Fl glatt
- 25i N, **3.1.1.a3**, dBG, PPfl, Kricke, Sorte Kriechele Hemmenhofen, dBG, Reis W.
 Hartmann, Filderstadt
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka +
 2 Blü: 1.1 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 5 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
 2.4 20.3.2015 – 12.4.
 3 Lbl: dgrün, ellipt, ges, rdl + 4,0/0,6 + 2,6 + 65 %/76 % + 1/ka, Lbl s. zart
 4 Fr: 7 + M IX + 20,8 ~ 22,1 ~ 22,1 + 106 : 106 : 100
 5 St: 11,7 ~ 7,9 ~ 10,2 + 68 : 87 : 129
 6 Fr kuerbisfg
- 3.1.1a3**, PPfl, nBG, Kricke, Thies Andersen, Olpenitzer Str. 12, Brodersby, Schwans
 1 Spr: 1.1 + !.2 beh in winziger Größe + 2.
 2 Blü:
 3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, ges, keilfg + 7,8/1,0 + 3,8 + 49/56% + 3/1
 4 Fr: 10 + A X + 20 (18-22)~23 (22-24)~24 (23-25) + 115 : 120 :104
 5 St: 4 + 12,3~8,4~9,9 + 68 : 81 : 118
 6 LBl unterseits stark hervortretende Nerven, Fr nicht adstringierend,
 pflaumiger Geschmack, spätreif. St mit geringer B- u.RNt, StE
 dreht winzig ab, Achse dennoch gerade, Fl recht glatt, sauberer
 rdl Stein
- 1+b N, **3.1.1a3**, PPfl, nBG, Kricke, Thies Andersen, Olpenitzer Str. 12, Brodersby,
 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
 3 LBl: dgrün, ell, ges, grdt + 3.3/0,4 + 1,8 + 55/62 % + ka/1

Typ a4, 3.1.1 a4 Fruchtstein kugelig, N erungen bei Lge, Breite, Dicke
Fruchtform balkenfg, mig7 Expl.Abb Fr-36 W: 1/6; St + Lbl-80 W: 4b/22

6 Expl A) Ind LBl 58% (43-72%); Ind Sprei 70 % (49-83 %), B) Fr, 1. Grö 21,1 (16,6-23,5) ~22,6 (18,9-24,4)~23,7 (19,8-25,2), 2.Ind 107 (102-114) :112 (106-119) : 105 (103-108), C) St, 1. Grö 11,2 (9,8-12,5) ~7,7 (6,7-8,2) ~ 9,8 (8,9-10,5), 2. Ind 69 (65-78) : 88 (83-98) : 127 (124-148),

- 80 W, **3.1.1a4**, PPfl, dBG, Kricke, Hasenkamp/Großschretstaken von nahe Stralsd
 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 0, **Abb** Fr-36 W: 1/6; St + Lbl-80 W: 4b/22
 2 Blü: 1.1 w+ 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
 3 LBl: dgr-glzd,derb, verk-eifg, ges, abgrdt +7,5/1,0+ 4,5+60 /69 %+ 3/2
 4 Fr 5 + M IX + 21,0 ~ 22,4 ~ 24,1 + 107 : 115 : 108
 5 St: 11,4~ 7,7~10,4 + 68 : 91 : 135 + St dick kugelig, L-Achse gerade,
 Fl feingrbg, aber stark gerieft, **Abb St 4b/22**
 6 Frucht kürbisförmig, keine Adstringenz, sehr angenehm!

- 81 **W, 3.1.1a4**, Ppfl, dBG, Kricke, Hasenkamp/Großschretstaken, Nähe Stralsund
- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 bh3 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
 - 3 Lbl: dgrün-glzd, verkehrt-eifg, ges, keilfg + 6/1,6 + 2,7 + 45/61 % + 2/1
 - 4 Fr: 5 + E IX + -- +
 - 5 St: 9,8~7,6~9,4 + 78 : 96 : 124
 - 6 starke Unterschiede zu 80 W, auch die Größe der St
- 36 **W, 3.1.1a4**, Ppfl, dBG, Kricke, Tobias Vogel, s.o. „MB Buckenreuth, Oberpfalz
- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 18.04.2015 bis 01.05
 - 3 LBl: mgrün, eifg, br-ges, abger + 7,6/0,8 + 4,5 + 59/66 % + 2/3
 - 4 Fr: 10 + E VIII + 23,5 ~ 24,0 ~ 24,8 + 102 : 106 : 103
 - 5 St: 12,5 ~ 8,1 ~ 10,4 + 66 : 83 : 128 + St kugelig-symmetrisch, L-Achse etwas gekrümmt, StEd etwas abgedreht, Bauch etwas aussld
 - 6 Frucht saftig, steinhaltend
- 21 **O, 3.1.1a4**, nBG, Kricke, H. Björnsen, Falshöft, Angeln
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 5 Umbildung zu Kurztrieben
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 18.04.2015 bis 03.05.
 - 3 LBl: dgrün-glzd, br-eifg, br-ges, abgrdt + 4,7/0,6 + 3,4 + 72/83 % + 2/1
 - 4 Fr: 8 + A X + 21,0 ~ 22,4 ~ 24,1 + 107 : 115 : 108
 - 5 St: 11,9 ~ 8,2 ~ 10,5 + 69 : 88 : 128
 - 6 Flache, große Früchte
- 22a **Z, 3.1.1a4**, Ppfl, nBG, Kricke, H. Björnsen, Falshöft, Angeln
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 2
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 24.04. 2015 bis 30.04.
 - 3 LBl: mgrün-glzd, verk-eifg, anlg-ges, keilfg-abgrdt+5,1/0,6 + 2,2 + 43 /49 % + 3/1
 - 4 Fr: 10 + E IX + 22,7 ~ 24,4 ~ 25,2 + 107 : 111 : 103
 - 5 St: 11,9~8,1~10,1 + 68 : 85 : 125 + St rdlich, BNt breit, Fl s feingrbg
 - 6 lange ungleichmäßig beduftet, aromatisch, vorzüglich für d Küche
- 23 **O, 3.1.1a4**, Ppfl, nBG, Kricke, H. Björnsen, Falshöft, Angeln
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh2 s kurz + 2. 5 Umbildung zu Kurztrieben
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 + 2.2 b
2.4 20.04.2015 bis 03.05.
 - 3 Lbl: dgrün-glzd, oval, ges, rdl-keilfg + 7,5/1,0 + 3,6 + 48/55 % + 2/2
 - 4 Fr: 10 + E IX + 24,1 ~ 26,6 ~ 27,0 + 110 : 111 : 102
 - 5 St: 11,9~9,1~10,3 + 76 : 87 : 113 + St rundlich, L-Achse gerade, BNt Wulst breit, hälftige schwache Riefen, Größe variiert stark
 - 6 lange unterschiedlich beduftet
- 22b **Z, 3.1.1a4**, nBG, vegetativer Abkömmling von 22a Z
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 2 + 2.
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 22.04.2015 bis 30.04
 - 3 LBl: dgrün, ell, ges, keilf + 7,2/1 + 4,6 + 64/74 % + .3/3
 - 4 Fr: 5 + M IX + 21,7~23,4~24,4 + 108 : 112 : 104
 - 5 St: 11,2~7,3~9,4 + 65 : 84 : 129
 - 6 unreif blau werdend, St gerade Achse, beidendig gleich, dick/rd

40 Z, 3.1.1.a4, PPfl, dBG, Kricke, als Spilling geliefert, C. Weinreich, "Ahornblatt", PF 1125, Mainz

1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. bh1, neuer Spross braun

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz/paa
2.4 18.04.2016 - 25.04.

3 LBl: hgruin, ell, oben s-stumpf-ges, keilfg +6,8/1,3+3,4 + 50/62%

4 Fr: 7 + AIX + 19~20~22 + 105 : 115 : 110

5 St: 11,6~8,0~10,2 + 69 : 88 : 128

6 Fr sehr herbe , dunkel blau mit Hauch

3.1.1b, 4 nBG Saemlinge von 3.1.1a Abb St-52 N: 4b/23

55 N, 3.1.1b, PPfl, nBG, Kricke, H. Haack/ G. Sötje, Brokdorf, Stbg, Slg

1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 3-4 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 03.05.

3 LBl: dgrün, lanz, ges, keilfg + 6,3/0,9 + 2,6 + 41/48 % + 1/1

4 Fr: 3 + A10 + 13,9~15,1~15,5 + 109 : 112 : 103

5 St: 8,0~6,3~7,7 + 79 : 96 : 122 + St sehr klein-kugelig, L-Achse gerade, zierlich gerieft

6 früh gleichmäßig und stark beduftet, wirkt stark adstringierend

18b S, 3.1.1b, PPfl, nBG, Kricke, Betzinger/Clement, Einhaus, Lbg, Slg

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2-3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 19.04.2015 bis 01.05.

3 LBl: graugrün-gld, ell, ges, etw-keilfg + 6,2/1,0 + 3,0 + 48/58 % + 1/2

4 Fr: 5 + E IX + 21,1~20,2~21,1 + 96 : 100 : 104

5 St: 12,6~6,7~9,2 + 53 : 73 : 137 + St Lg linsig, aber Bauch etwas gewölbt, L-Achse gerade, BNt stärkere Riefen , Fl 1-2 Riefen

6 Bei Vollreife keine Adstringenz. Stielende vom Stein nicht ganz symmetrisch.

51 N, 3.1.1b, PPfl, nBG, Kricke, Betzinger/Clement, Einhaus, Lbg, Slg

1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 + 2. 5 s stark

2 Blü: 1.1 . bw + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 03.05.

3 LBl: mgrün, lanz, stu-ges, abgrd + 4,6/0,5 + 3,0 + 65/73 % + 1/1

4 Fr: 10 + X + 15,2~15,8~16,7 + 104 : 110 : 106 (Stein extrem klein!)

5 St: 8,3~6,6~7,8 + 80 : 94 : 118 + St klein-rundlich-kugelig, wie 52 N, L-Achse gerade, BNt breiter Wulst m stärkeren Riefen, Fl-Stiel bis Narbe gerieft.

6 Fr früh gleichmäßig beduftet, stark adstringierend!

52 N, 3.1.1b, PPfl, nBG, Kricke, Geertz, Kastorf-Bhf, Lbg, Abb St-52 N: 4b/23

1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 + 2. 5

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 03.05.2015 bis 06.05.

3 LBl: dgrün, lanz, ges, lg-keilfg + 5,5/0,8 + 2,2 + 40/47 % + ka/ka

4 Fr: 10 + A X + 15,1~17,0~17,5 + 113 : 116 : 103 8,2-6,8-8,6

5 St: 8,3~6,6~7,8 + 83 : 105 : 126 + St klein-rundlich-kugelig, wie 51 N, St: L-Achse gerade, BNt breiter Wulst mit Riefen, Fl gerieft.

6 Sehr stark adstringierend.

3.1.1c 4 Expl., Nähere Bestimmung noch nicht möglich

17g S, 3.1.1c, PPfl, euBG, Kriecher, A. Lugmair, Gstocket 10, Pferdehof Aigner, A-4072 Alkoven, Oö,

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 1.4 dick oval + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz

3 Lbl: dgrün, eifg, gekerbt, rdl + 6,0/0,9 + 3,0 + 50%/59% + 3/2

17h S, 3.1.1c, PPfl, euBG, Kriecher, Pflzg 12/11, wie 17g S

1 Spr: 1.1 ka 1.2 ka + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz/paa
2.4 20.04.2016 - 30.04.

3 Lbl: mgruin, verkehrt-eifg, gekerbt, keilfg + 5,2/0,5 + 2,7 + 52/57% + 2/2

47 Z, 3.1.1c, Pp, euBG, Kricke, Christiane Krüss, Aryd, Blekinge, Schweden

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 2

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 12..04.2016 bis 19.04., sehr starke, behaarte Blüte

3 LBl: dgrün-glzd, ell, ges, keilf + 5,1/0,6 + 2,4 + 47/53% + 1/1

29 S, 3.1.1c, PPfl, nBG, Kricke, ?, Geertz, Kastorf-Bhf, Lbg

1 Spr: 1.1 ka, + 1,2 + 2. 0 braunrot

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2-3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 30.04.2015 bis 07.05.

3 LBl: mgrün-stark-glzd, breit-ell,grob ges, abgrdt-keilfg + 11,3/1,8 + 5,6
+ 50/59% + 2/1

4 Fr: 5 + M IX + 21,5~20,0~20,3 + 93 : 94 : 102

5 St: 12,0~5,8~8,1 + 48 : 68 : 140. + Stein oval, L-Achse gerade, BNt
etwas verstärkt. Untypisch große LBl, E 8 Früchte noch grün.
Untypische Kricke?

6 Frucht kugelig, LBl kräftig und atypisch für Kricke

3.1.2 Variante B, Wiechel , Wiecheln 15 Expl.

Frucht blau, kaum Gerbsäure, Blüten-/Fruchtstiel **stets behaart**

*11 Expl A) Ind LBl 53,5 (38-76) %; Ind Sprei 72(46-98) % B) Fr, 1. Grö 24,8 (20,7-29,7)~22,8 (18,8-29,0)~24,1 (19,1-29,0, 2. Ind 92 (88-105) : 97 (90-105) : 106 (100-114) C) St, 1. Grö 13,6 (11,9-18,3)~ 7,1 (6,0-7,8)~ 9,7 (8,0-11,8), 2. Ind 52 (40-60) : 71 (60-87) : 137 (115-162),

Eine mild schmeckende, etwas fleischigere heterogene Roggen-Pflaume, deren Reife der Beduftung schon während der ersten Hälfte im August beginnt und deren Genussreife ab Mitte August erfolgt. Nervatur, Rand und Behaarung der Laubblätter sind deutlich unterschiedlich. Vorzüglich für Marmeladen und Ansätze!

Der Name Wiechel ist heute noch in der Wilster Marsch (S-H) bekannt. In der Literatur wurde er bislang nur bei MARZELL (1977) gefunden. Er schreibt "eine Gattung kleiner Pflaumen mit Vorkommen Dithmarschen, Wilstermarsch, Westfalen, Niederlande.". Mit unseren Funden aus Nord-, Mittel-, West- und Süddeutschland ragt das Gebiet weit darüber hinaus. Aber offenbar sind Wiecheln deutlich seltener als Kricken. So ist bislang nur eine lückenhafte Verbreitung bekannt. Dringend sind weitere Funde erforderlich. Das Fruchtfleisch ist weich, saftig, angenehm pflaumig! Der Fruchtstein ist linsig, oval bis rundlich. Im BG wird häufig nicht zwischen der Wiechel, deren Längsachse wie bei der Kricke stets senkrecht und gerade ist, und dem blauen Spilling unterschieden, dessen Längsachse ein wenig bogenförmig ist.

3.1.2a Region a, Norddeutschland, Abb Fr-35O-1/7; St-17aS: 4b/24 2 nBG

***2 Expl A) Ind LBl 41 % (38-43%); Ind Sprei 53 % (48-58 %) B) Fr. 1. Grö 26,3 (22,9-29,7) ~ 23,8 (20,6-26,9) ~ 25,4 (21,7-29,0) 2. Ind 90 (90-91) : 97 (95-98) : 107 (105-108) C) St 1. Grö 15,1 (11,9-18,3) ~ 6,9 (6,4-7,3) ~ 10,3 (8,8-11,8) 2. Ind 46 (40-54) : 68 (64-74) : 149 (138-162),**

35 O, 3.1.2a, nBG, PPfl, Wiechel, E. Kosin, RZ-Vorstadt, Abb Fr-35O-1/7

- 1 Spr: 1.1 bh3 extrem kurz + 1.2 + 2. 1
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2-3 + 1.3 6 + 2.1 bh3 + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 21.04.2015 bis 01.05.
- 3 LBl: dgrünglzd, verk-eifg, gkbt, abger-keilfg +8,2/ 2,2 +3,5+43/58%+ 3/2
- 4 Fr: 5 + A IX + 29,7~ 26,9 ~ 29,0 + 91 : 98 : 108
- 5 St: 18,3~ 7,3 ~ 11,8 + 40 : 64 : 162
- 6 Fr blau, etwas oval, frühe gleichmäßige Beduftung, schwach süß-pflaumig, St mit deutlicher Bauchnaht, Fl glatt, gerade Achse

17a S, 3.1.2a, nBG, PPfl, Wiechel, A. Mißfeldt, Rondeshagen, Lbg

- 1 Spr: 1.1 wollig + 1.2 + 2. 0, Abb St-17aS: 4b/24
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 bh2 + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 24.04. 2015 bis 06.05.
- 3 LBl: mgrün, ell, anlg-ges, keilfg + 6,0/1,2 + 2,3 + 38/48 % + 3/4
- 4 Fr: 5 + A IX + 22,9 ~ 20,6 ~ 21,7 + 90 : 95 : 105
- 5 St: 11,9 ~ 6,4 ~ 8,8 + 54 : 74 : 138 + St rundlich-oval, L-Achse gerade, BNt deutlicher Wulst, Fl zierlich gemuschelt
- 6 lange. E7/A8 ungleichmäßig beduftet, aber schon E8 dick blau , vorzüglich für den Garten, sehr aromatisch! Kleiner als 3.0.2a!

3.1.2b Region b, Mitteldeutschland Abb St-17a Zb: 4b/25 6 dBG

5 Expl A) Ind LBl 51 % (38-76), Spr 63 % (/46-98 %) B) Fr 1. Grö 24,2 (21,3-27) ~ 21,6 (18,8-23) ~ 22,9 (19,1-25), 2. Ind 89 (81-105) : 95 (90-105) : 106 (102-131), C) St 1. Grö # 13,2 (12,7-13,7) ~ 6,4 (6,0-7,0) ~ 8,7 (8,3-9,9) 2. Ind 48 (45-52) : 66 (60-72) : 136 (124-157), 5 dBG

NW Bad Suderode, S-A, NSG im MTB 4232/41, Werner Illig, An der Schäferbrücke 12, 38871 Ilsenburg

BSt/FSt behaart. Stiellänge nur 6-10 mm. Fruchtgröße : Länge 21,3, Breite 18,8, Dicke 19,1 mm. Indizes Steine 48:64:134, Stein linsenförmig, Flanken feingrubig gerieft. Gelieferte Zweige mit Früchten. Die Werte von 55 Steinen durch W. Illig

17a Zb, 3.1.2b, dBG, Werner Illig, An der Schäferbrücke 12, 38871 Ilsenburg

- 1 Spr: 1. bh3 + 2. 0
- 2 Blü 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 bh1 + 2.2 b + 2.3 eiz
- 3 LBl: br-ell, grb ges, keilfg + 9,4/2,0 + 4,6 + 49 /62 % + bh3/bh1
- 4 Fr: 10 + M IX + 21,3 ~ 18,8 ~ 19,1 + 88 : 90 : 102
- 5 St: 12,9 ~ 6,2 ~ 8,3 + 48 : 64 : 134, St linsenfg, BNt zum Teil etwas ausladend, so erscheint bei diesen das StEd ein wenig verschoben. L-Achse noch gerade, Fl feingrubig gerieft,
- 6 Frucht dick eiförmig, süß-fruchtig-pflaumig, keine Tannine spürbar

30c1 S, 3.1.2b, dBG, PPfl, Wiechel, als 3.0.6 Thüringer Hammelsäcke W. Hartmann

- 1 Spr: 1. ka + 2. 0
- 2 Blü: 1,1 w + 1.2 2 + 1.3 6 + 1.4 oval + 2.1 bh3 + 2.2 b + 2.3 paa

- 3 LBl: dgrün, ell, s-stumpf-ges, keilf + 9,2/1,2 + 3,7 + 40/46 % + 3/1
 4 Fr: 2 + A VIII + 2,3 ~ 2,0 ~ 2,1 + 87 : 91 : 105, blau mit viel Hauch
 5 St: 13,3 ~ 6,0 ~ 9,4 + 45 : 71 : 157
- 63 N, 3.1.2b**, dBG, PPfl, Wiechel, Forst, Brandenburg
 1 Spr: 1.1 wollig + 1.2 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 **bh 3** + 2.2 c + 2.3 eiz
 2.4 18.04.2015 bis 30.04.
 3 LBl: mgrün, derb, eifg, grob-ges, abgrdt + 7,6/1,7 + 5,8 + 76/98 % + 4/3
 4 Fr: 1 + E VIII + 24,6 ~ 22,2 ~ 23,2 + 90 : 94 : 105
 5 St: 13,7 ~ 6,3 ~ 9,9 + 46 : 72 : 157 + Stein linsig
 6 St gerade Achse, gleichmäßig; weiche Frucht, kaum adstringierend

A. Lindner, Alte Ziegelei 19, 99974 Mühlhausen

Dort geführt als Bollstedter. Durchschnitt von 3 gelieferten Früchten : lg 23,6, br 21,9, di 22,4 mm, Indizes 93:95:102, Stein lg 14,2, br 6,9, di 9,5 mm, Indizes 49 : 67 : 135, Steine linsenförmig, glatt. L-Achse gerade, BSt/FSSt behaart

- 42 Z, 3.1.2b**, PPfl, dBG, Wiechel, Sorte Bollstedter, A.Lindner, Mühlhausen, Thüringen
 1 Spr: 1.1 bh3 1.2 + 2. 1
 2 Blü. 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4/6 + 2.1 **bh 1**, s kurz + 2.2 d + 2.3 paa
 2.4 21.04.2016 - 08.05.
 3 LBl: dgrün, ell, stumpf-ges, schwach-keilf + 7,8/1,3 + 3,5 + 45/54% + 4/3
 4 Fr: 5 + A/M VIII + 22~23~23 + 105 : 105 : 100
 5 St: 12,7~6,4~8,4 + 50 : 66 : 131
 6 St linsig, Achse etwas gebogen, mit Mittelgrat, sonst glatt
- 43 Z, 3.1.2b**, PPfl, dBG, Wiechel, Sorte Bollstedter, A. Lindner, Mühlhausen, Thüringen
 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 + 2 2
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 4/6 + 2.1 **bh 1**, s kurz + 2.2 d, dünn + 2.3 paa + 2.4 24.04.2015 bis 10.05.
 3 LBl: dgrün, ell, stumpf-ges, abgerdt + 7,6/1,3 + 2,9 + 38 /46 % 3/2
2017 Normal-Jahr
 4 Fr: 6 + M VIII + 27~22~25 + 81 : 93 : 131
 5 St: 13,4~7,0~8,7 + 52 : 65 : 124
 6 wie 42 Z
2018 Extrem Trocken-Jahr
 4 Fr : 9 + M VIII + 18,7~15,5~16,2 + 83 : 87 : 105
 5 St: 13,2~5,9~8,6 + 45 : 65 : 146
 Frucht dunkelblau, mit Hauch, eiförmig, süß-fruchtig
- 46 Z, 3.1.2b**, PPfl, dBG, Wiechel, Sorte Bollstedter A.Lindner, Mühlhausen, Thüringen
 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 + 2. 2
 3 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4/6 + 2.1 **bh1** + 2.2 d + 2.3 paa
 2.4 16.04.2016 - 04.05.
 3 LBl: dgrün, ell, abgerdt-ges, keilf + 7,8/1,5 + 3,2 + 41 /51 % + 4/4
 4 Fr: 5 + A/M VIII + 26~22~25 + 85 : 96 : 114
 5 St: 13,3~6,0~8,0 + 45 : 60 : 133
 6 wie 42 Z

***3 Expl A) Ind LBI 60 (59-61 %), Spr 71 (69-74) B) Fr 1. Grö 27,9 (27,8-28) ~27,1 (26,2-28)~28,4 (27,7-29), 2. Ind 97 (94-100) :102 (100-104) : 105 (104-106) C) St 1. Grö 14,0 (13,5-14,4) ~7,7 (7,6-7,8) ~ 11,3 (10,8-11,7), 2. Ind 55 (54-56) : 80 (75-87) : 146 (138-154),**

3.1.2 c1, Stein linsig

***2 Expl A) Ind LBI Sprei 60 % (59-61); Ind Sprei 72 % (69-74 %), B) Fr, 1. Grö 27,8 ~ 26,2 ~ 27,7, 2. Ind 94 : 100 : 106, C) St, 1. Grö 14,4~7,8~10,8, 2. Ind 54 : 75 : 138**

17d S, **3.1.2c1**, PPfl, dBG, Wiechel, über K. Vorderwülbecke, von Landwirt A. Aufmkolk, Brilon- Altenbüren, Hochsauerland **Abb St -17dS: 4b/26**

- 1 Spr 1.1 wollig + 1.2 wollig + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 **ka/bh?** + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 19.04.2016 - 25. 04.
- 3 Lbl: hellgrün, ellipt, ges, rdl + 8,2/1,2 + 4,8 + 59/69 % + 2/1

3.1.2c2, Stein oval

1 Expl A) Ind LBI 59 %, Ind Sprei 71%, B) Fr, 1. Grö 28 ~ 28 ~ 29, 2. Ind 100 : 104 : 104, C) St, 1. Grö 13,5 ~ 7,6 ~ 11,7, 2. Ind 56 : 87 : 154

48 Z 3.1.2 c2, PPfl, dBG, Wiechel, über Frieder Kötz, Marienborn in Siegen.

- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 3 breit + 2.1 bh2 + 2.2 b + 2.3 paa
- 4 Fr: 8 + M VIII + 2,5 ~ 2,2 ~ 2,4 + 88 : 96 : 109
- 5 St: 13,3 ~ 7,0 ~ 10,6 ++ 53 : 80 : 109

49 Z 3.1.2c2, PPfl, dBG, Wiechel, über Frieder Kötz, Marienborn in Siegen. Beispiel c2: Fund F. Kötz, Siegen, Marienborn/Siegen : Triebe stark behaart, Fruchtstiellänge 13 mm. Laubblätter dünn, graugrün, elliptisch, gesägt-gekerbt, Stielende keilförmig, Frucht etwas Hauch, 28~ 28~29 mm, Stein 13,5~7,6~11,7 mm, Indizes Steine 56 : 87 : 154, Stein oval, gerade Achse, BNaht etwas betont, Flanken etwas marmoriert.

- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 bh2 + 2.1. 2
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 **bh3** + 2.23 + 2.3 paa
 - 3 Lbl: hellgrün, eifg, gekerbt, rdl + 6,3/1,1 + 3,7 + 59/71 % + 3/2
- 2018 4** Fr: 6 + A VIII + 23 0 ~ 19,8 ~ 20,8 + 86 : 90 : 105
- 5 St: 13,0 ~ 6,5 ~ 9,4 + 50 : 72 : 145
- 2019 4** Fr 3 + A VIII + 2,7 ~ 2,6 ~ 2,7 + 96 100 : 104
- 5 St: 14,1 ~ 7,5 ~ 10,5 + 53 : 74 : 140
 - 6 Fr dunkelrot, noch unreif, mit Pflaumenfalte

3.1.2d Region Suiddeutschland

4 Expl

3.1.2d Wiechel, Utlg Myrobalane

25h N, Wiechel, **dBG, ehemals 3.0.16**, Sorte Kriechele Mehrstetten, Reis W Hartmann, Erika Weg 2, 70794 Filderstadt

- 1 Spr: 1.1 bh3, wollig + 1.2 wollig + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 **bh3** + 2.2 c + 2.3 einz
2.4 20.04.2015 bis 30.04.
 - 3 Lbl: dgrün-matt, rdl, gekerbt, rdl + 5,5/1,2 + 3,4 + 62/79 % 4/wollig
- 2016 4** Fr: 2 + M VIII, 20,7~18,8~19,8 + 91 : 96 : 105
- 5 St: 12,1~7,3~8,4 + 60 : 69 : 115 mit gerader Längsachse
 - 6 Fr weich, Hauch, mit Pflaumenfalte, leicht adstringierend
- 2017 4** Fr: 7 + E VIII + 17,4 ~ 16,1 ~ 17,4 + 93 : 100 : 108

5 St: 0,5 ~ 6,6 ~ 8,5 + 63 ; 81 : 129
17b S, **3.1.2d**, PPfl, 1 euBG, W. Danniger, Bahnhofplatz1, Linz, A, geliefert als
Blaue Ziparte

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 1 s kurz + 2.
 - 2 Blü: 1.1 1.2 1.3 6 + **2.1 bh3** + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 2.04.2016 - 16.04.
 - 3 Lbl: dgrün, brt-ell, brt-ges, ganz-brt-keilf + 8,9/1,6, 5,4 + 61/74 % + 3/3
 - 4 Fr: 10 + A VIII + 27,8~26,2~27,7 + 94 : 100: 106
 - 5 St: 14,4~7,8~10,8 + 54 : 75 : 138, St linsig-kugelig, L-Achse gerade
StEd gerade auslfd, BNt mäßig stark, Fl mit schwachem Mittelgrat
 - 6 grobblättrig, Frucht blau-rot, wenig Hauch, kleine Falte
- 25u N, 3.1.2d?** PPfl, Wieche? als Beckele Reis W.Hartmann, Uni Hohenheim

- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 bh3 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 bh2 + 2.2 c + 2.3 paa
- 3 Lbl: hellgrün, ellipt. Ges, keilfg + 5,3/1,3 + 2,8 + 53/70 % + 3/3
- 4 Fr: 7 + A IX + 2,5 ~ 2,2 ~ 2,4 + 88 : 96 : 109
- 5 St: 14,3 ~ 6,4 ~ 9,1 + 45 : 64 : 9,1
- 6 **Wiechel? Ziparte ? Geschmack? Farbe**

3. 1. 3 Variante C (gelbe) Ziparte **13 Expl.**

(ehemals) *Prunus domestica* ssp. *prisca* Bertsch, Frucht gelb, kräftige Gerbsäure.
Abb Fr-370: 1/8; St + Lbl-20 Zc: 4b/27

Seit 3.000 v. Chr. unveränderte, süße Primitivpflaume (in Ratzeburg 10/2011 85° Oechsle!) mit starker Adstringenz! Eine 2-3 cm große, kugelige bis schwach ovale, noch im Herbst herb, dann im Spätherbst duftende, milde, gelbe, sonnenseitig rötliche, bei Überreife etwas bläulich werdende Frucht. Längsachse der Fruchtsteine stets gerade. Vorzüglich für die Brennerei! Vorkommen selten, Liebhaber im nBG, häufiger in SW-Deutschland, Österreich, Tschechei, Schweiz. Deutliche Ähnlichkeiten zeigen die englischen Staffordshire-Bullace.

***12 Expl A) Ind LBl 46 % (35-59%); Ind Sprei 54 % (41-68 %), B) Fr, 1. Grö 22,9 (17,8-29,6)~20,2(16,9-28,5)~22,7 (18,2-28,5), 2. Ind 88 (83-102): 99 (89-111) : 112 (100-114), C) St, 1. Grö 12,8 (10,7-15,8) ~ 6,9 (5,5-9,3) ~ 9,8 (8,3-11,8), 2. Ind 54 (45-65) : 77 (63-99) 142 (130-153)**

3.1.3a1 Deutsche Ziparte **5 Expl.**

Blüten-/Fruchstiel behaart oder kahl. Fr bei der Reife mit rötlichen Punkten und bei Überreife auch blaue Töne. Frucht bis zur Überreife stark adstringierend, Fruchstiel 11-15 mm. Laubblätter 6,5, davon Stiel 0,8, Spreite 3,0 cm, Indiz Spreite 53 %. Fruchtgrößen 19,6-19,6-20,1 mm. Stein 10,7-5,5-8,3 mm, linsig, Stielende etwas abgerundet, Narbenende etwas spitz, Längsachse gerade, Fl mit Riefen, Indizes 51 : 78 : 151

3.1.3.a1 Deutsche Ziparte. Abb Fr-370: 1/8; St + Lbl-20 Zc: 4b/27

Ind LBl 44 % (36-52%); Ind Sprei 52 % (41-68 %) B) Fr, 1. Grö 24,8 (19,6-29,6) ~ 22,5 (16,9-28,5) ~ 23,8 (18,2-28,5), 2. Ind 91 (83-100) : 96 (89-103) : 106 (100-114), C) St, 1. Grö 13,4 (10,7-15,8) ~ 6,9 (5,5-9,0) ~ 9,8 (8,3-11,7), 2. Ind 51 (45-57) : 73 (63-85) : 142 (130-151),

19 Zc, 3.1.3a1, PPfl, dBG Ziparte, Fa E. Kiefer, Ortenberg, BD, Utlg

- 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 **bh2** + 2.2 c + 2.3 paa
 2.4 23.04.2015 bis 09.05.
 3 LBl: dgrün, verk-eifg, anlg-ges, etw abgrdt +6,5/0,8 + 3,0 + 46/53 % + 3/2
 4 Fr: 10 + E IX + 19,6 ~ 19,6 ~ 20,1 + 100 : 103 : 103
 5 St: 10,7 ~ 5,5 ~ 8,3 + 51 : 78 : 151 + linsiger Stein, StEd leicht abgrdt, NbEd etwas spitz, L-Achse gerade, BNt mittelstark, Fl mit 1 mittelständigen Riefe, dazwischen sehr flach feingrbg gerieft
 6 Frucht sonnenseitig rötliche Pusteln, Herbst stark adstringierend, Spätherbst sehr süß und nur noch leicht adstringierend
- 20 Zc, 3.1.3a1**, PPfl, dBG, Ziparte, E. Kiefer, Ortenberg, BD, Utlg,
 1 Spr: 1.1 bh2 1.2 + 2. 0, **Abb** St + Lbl-20 Zc: 4b/27
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 **bh1** + 2.2 c + 2.3 paa
 2.4 23.04.2015 bis 09.05.
 3 LBl: wie 19 Z, aber 6,1/0,9 + 3,2 + 52/62 % + 2/1
 4 bis 6 wie 19 Zc
- 37 O, 3.1.3a1**, PPfl, dBG, Ziparte, Fa Kiefer, Ortenberg, BD, Utlg, **Abb** Fr-37O: 1/8
 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 bh3 s kurz + 2. 1
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 **bh1** + 2.2 d + 2.3 paa
 2.4 18.04.2015 bis 29.04.
 3 LBl: dgrün-glzd, br-ell, anlg-ges, rdl-keifg + 6,0/1,0 + 3,4 + 57/68 % + 3/2
 4 Fr: 6 + E IX + 20,4 ~ 16,9 ~ 18,2 + 83 : 89 : 108
 5 St: 11,0 ~ 6,3 ~ 9,3 + 57 : 85 : 148
 6 NEd kurz-spitz, SEd gerade, Fl glatt mit mittelständiger Riefe
- 53 03 O, 3.1.3a1**, dBG, PPfl, Deutsche Ziparte, Sorte dort Haferpflaume, S-A
 1 Spr: 1.1 + 1.2 dunkelrot 2, s.kurz + 2
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 **ka?** + 2.2 c + 2.3 paa
 2.4 26.04.2016 - 02.05.
 3 LBl: hgrün, ell, ges, keifg + 11,2/1,5 + 4,0 + 36/41 % + 2/2
 4 Fr: 1 + A VIII + 29,5~28,5~28,5 + 97 : 97 : 100
 5 St: 14,9~6,7~10,0 + 45 : 67 : 149
 6 Fr gelb, glatt, saftig, St gerade Achse, beidseitig gleich,
- 53 04 O, 3.1.3a1**, dBG, PPfl, Deutsche Ziparte, Sorte dort Haferpflaume, S-A
 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 **ka?** + 2.2 d+ + 2.3 eiz
 2.4 26.04.2016 - 02.05.
 3 LBl: hgrün, ell, gkrbt, keifg + 10,4/1,9 + 4,3 + 41/51 % + 2/1
 4 Fr: 3 + E VII/A VIII + 29,6~26,1~27,7 + 88 : 94 : 106
 5 St: 14,7 ~ 6,9~9,3 + 47 ; 63 ; 135
 6 Fr gelb, Geschmack? Kugelig, mit Falte, St beidendig gleich spitz
- 3.1.3 b/c Englische Ziparte** Blüten-/Fruchtstiel behaart. **8 euBG**
Abb Fr-56 W: 1/9; St + Lbl-56 W: 4b/28

Bei der Reife im Oktober mit rötlichen Punkten und bei Überreife im November auch blaue Töne, Frucht bis zur Überreife stark adstringierend, Blüten-/Fruchtstiel 11-15 mm. Laubblätter 7,3 cm, davon Stiel 1,1, Spreite 3,4 cm, Indizes Spreite 55 %. Fruchtgrößen 17,8-24,6 ~ 17,8-23,2 ~ 19,8-23,2 mm. Stein dick-rundlich, mit beidendig sehr kurzen Spitzen, Längsachse senkrecht und gerade, Wulst breit, Flanken gleichmäßig mittelstark grubig gerieft, Größen 10,8-14,1 ~ 6,1-7,7 ~ 8,7-11,8, Indizes 46-65 : 70-99 : 141-153

*6 Expl A) Ind Lbl 47 % (35-59%); Ind Sprei 55 % (41-68 %), B) Fr, 1. Grö 21,0 (17,8-24,6) ~ 20,4 (17,8-23,2) ~ 21,5 (19,8-24,6), 2. Ind 97 (90-102) : 102 (94-111) : 105 (102-111, C) St, 1. Grö 12,1 (10,8-14,1) ~ 6,8 (6,1-7,7) ~ 9,8 (8,7-11,8), 2. Ind 56 (46-65) : 81 (70-99) : 144 (141-153),

3.1.3b1, Engl Ziparte, Sorte Staffordshire-Bullace **3 Expl**

Typ 1 der heterogenen Gehölze des Gebüschmantels. Die Gliederung soll versucht werden. St: Narbenende etwas spitz, Längsachse gerade, Flanken mit Riefen, Indizes 55 : 79 : 143.

56 W, 3.1.3b1, PPfl, euBG, Sorte Staffordshire-Bullace Bentley-Hall-

Farm,Staffords- UK, Abb Fr-56 W: 1/9; St + Lbl-56 W: 4b/28

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 0 + jg Triebe blau-rot
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 4 + 1.4 3 + 2.1 **bh1** + 2.2 b + 2.3 paa .
- 3 LBl: mgrün, ell, grb-ges, abgrdt + 5,8/0,8 + 3,4 + 59/68 % + 3/1
- 4 Fr: 10, M XI, 20,9 ~ 21,2 ~ 22,4 + 101 : 107 : 106
- 5 St: 2,7 ~ 7,0 ~ 10,0 + 55 : 79 : 143 + Die Steine sind von dem Gehölz in Mittelengland : Stein dick-rundlich, mit beidendig sehr kurzen Spitzen, L-Achse gerade, Wulst breit, Fl gleichmäßig mittelstark grubig gerieft
- 6 Frucht kugelig, von orange-gelb bis später blaurötlich, erst bei voller Reife süß-pflaumig, dann kaum noch adstringierend! Jüngere Triebe "blau"-rot

36 O, 3.1.3b1, PPfl, euBG, Sorte Staffordshire-Bullace, Bentley-Hall-Farm, Staffords, UK

- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 **bh1** + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 18.04.2015 bis 05.05.
- 3 LBl: grau-dgrün, br-eifg, br-ges, abgrdt + 6,2/1,0 + 3,0 + 48/58 % + 2/1
- 4 Fr: 5 + M IX + 24,6 ~ 23,2 ~ 24,6 + 94 : 100 : 106
- 5 St: 11,6 - 6,6 - 9,3 + 57: 80 : 141 + St dick-rdl. mit kurzen Spitzen, L-Achse gerade, Bauch stark, Fl 1 Riefe, mittelstark grubig gerieft
- 6 gelbe Frucht mit Pflaumenfalte! Wenig rtl Flecken, saftig-fruchtig

88b W, 3.1.3b1, PPfl, euBG, Sorte Staffordshire-Bullace, Bentley-Hall-Farm, UK

- 1 Spr: 1. bh3 s kurz + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 3 + 2.1 **bh2** + 2.2 b + 2.3 einz
- 3 LBl: mgrün, ell, br-ges, keilfg + 7,3/1,0 + 3,6 + 49/57 % + 4/3
- 4 Fr: 5 + A X + 20,4 ~ 19,9 ~ 21,2 + 98 : 104 : 107
- 5 St: 11,6 ~ 6,6 ~ 9,3 + 57 : 80 : 141 + St wie 36 O, aber kleiner
- 6 Frucht saftig, gelb, sonnenseitig rötlich, wirkt sehr kräftig adstringierend, ab November etwas schwäche

3.1.3b2, Engl Ziparte, Sorte Brit.Shepherds Bullace **2 Expl**

31e O, 3.1.3b2 PPfl, euBG, Engl. Ziparte, Sorte Brit. Shepherds Bullace, G. Staffel, Ahornbltt, Mainz, Utlg St. Julien, INRA II

- 1 Spr: 1.1 kurz-wollig + 1.2 wollig + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 **schwach gez** + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 25.04.2016 - 02.05.
- 3 Lbl: matt-dgrün, ellipt, ges/gekerbt, rdl, + 7,6/1,3 + 3,5 + 46/56 % + bh3/1
- 4 Fr: 10 + M VIII + 23,0 ~ 20,8 ~ 21,7 + 90 94 : 104
- 5 St: 14,1 ~ 6,5 ~ 9,8 + 46 : 70 : 151
- 6 Fr unterschiedlich groß, gelb, rot punktiert, rdlich eifg, fruchtig-bitter,

gering adstringierend, St linsig, Stielende etwas stärker, gerade Achse, Fl glatt

- 4 N, **3.1.3b2**, Sorte Shepherds Bullace, PPfl, euBG, über G. Staffel
- 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 wollig + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
 - 3 Lbl: dunkelgrün, ellipt, gekerbt, abgerundet +8,2/1,8 + 4,1 +50/64 %+ 3/1 wollig
 - 4 Fr: 7 + E IX + 22,9 ~ 19,3 ~ 19,3 + 84 . 84 : 100
 - 5 St: 13,6 ~ 5,9 ~ 8,3 + 43 : 61 : 141

3.1.3 c Sämlinge, Staffords Bullace **3 Expl.**

Fruchtsteine von Bentley-Hall-Farm. Staffords , UK. Weitere Ergebnisse müssen noch abgewartet werden

Gebüsch 53b O, 3 Sämlinge :**3.1.3c** Jge Triebe am 20.6. 2009 d-viol-rt , LBl derb

1) 53b1 **O S**, **3.1.3c**, euBG

- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 5
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 **bh1** + 2.2 a + 2.3 eiz
2.4 28.04.2015 bis 09.05
- 3 Lbl: dgrün-glzd, derb, eif, br-ges, abgrdt +8,4/1,1 + 4,5 + 54/62 %+ 3/3
- 2016 4 Fr: 3 + X + 19,1~19,5~19,9 + 102 : 104 : 102
- 5 St: 11,9~7,7~11,8 + 65 : 99 : 153 + St breit oval
- 6 St Fl runzelig
- 2017 4 Fr: 6 + E VIII + 19,3 ~ 18,2 ~ 19,3 + 94 : 100 : 106
- 5 St: 13,1 ~ 7,7 ~ 11,2 + 59 : 85 : 145

2) 53b2 **O NO**, **3.1.3c**, euBG

- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 bh3 + 2. 5
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 4 + 1.3 4 + 2.1 **bh2** + 2.2 a + 2.3 paa
2.4 28.04.2015 bis 09.05.
- 3 LBl: derb-dgrün-glzd, Verkehrt-eifg, br-ges, keilfg-abgerdt + 8,6/1,3 + 3,0
35/41 %+ 2/1
- 2016 4 Fr: 2 + A IX + 17,8~17,8~19,8 + 100 : 111 : 111
- 5 St: 10,8~6,1~8,7 + 56 : 81 : 143 + St eiförmig
- 6 St kräftiger Wulst, Fl gering runzelig
- 2017 4 Fr: 1 + E VIII + 18,9 ~ 18,8 ~ 19,5 + 99,5 : 103 : 104
- 5 St: 12,4 ~ 7,4 ~ 10,0 + 60 : 81 : 135
- 2018 4 Fr: 2 + E IX + 17,3~16,9~17,4 + 98 : 100,6 : 103
- 5 St 11,2~6,3~9,8 + 56 : 88 : 156
blau mit Hauch,

3) 53b3 **O NW**, **3.1.3c**, euBG

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 5
- 2 Blü:
- 3 LBl: mgrün-glzd, verkehrt-eifg, ges, keilfg +7,0/1,0 + 2,7 +39/45% + 2/1

3.3 Unterart Kreeke **19 Expl., alle nBG**

Pr.domestica ssp. "*acuticarpa*" ined **Abb** Fr-22 W: 2/45; St + Lbl-28 Z: 4b/29

Die gelblich-rötliche, eiförmige Frucht hat einen markanten, unterschiedlich großen Stein mit geschwungener Längsachse, die vom Stielende selten nur über ein Drittel, meist über die Hälfte und auch über zwei Drittel der Länge bis zum Narbenende *nadelspitz* zuläuft. Das Verhältnis Dicke : Br liegt bei der Kreeke zwischen 122

und 149. Nach den bisherigen Werten ist die Möglichkeit einer Untergliederung der Kreeke nicht erkennbar. Das Schaubild und die Morphologie der Gehölze, Laubblätter, Früchte und Steine ist jeweils sehr ähnlich.

Vergleich a) 3.3 Kreeke und b) 3.7.1.4.1 Kreete

a)B)Fr,1.Grö 21,5~17,9~18,1, 2.Ind 83: 84: 101, C) St,1.Grö 13,0~5,7~7,6, 2.Ind 44: 59: 133
b)B)Fr,1.Grö 25,0~22,0~23,3, 2. Ind 88: 93: 106,C) St, 1.Grö 13,6~5,7~9,4, 2.Ind 42: 69: 165

Die alte Sippe Kreeke, die sich über Wurzelbrut laufend erneuert, steht z. B. neben dem Ratzeburger Dom, den es schon seit 950 Jahren gibt. Sie ist gleichförmig und zeigt als Sippe eine starke Sonderstellung. Der stets unbehaarte BSt/FSst ist ca. 15 mm lang. Die meist saftig-süßaromatische Frucht ist eiförmig mit gerader Längsachse und mit etwas dickerem Stiel- und dünnerem Narbenende versehen und hat nach einem Drittel der Länge die größte Dicke. Die gelblich-rötliche Fruchtfarbe wechselt bei *starker* Überreife auf bläuliche Töne

15 Expl A) Ind LBl 42 % (31-57%), Ind Sprei 54%(41-70 %), B) Fr, 1. Grö 21,5 (18,3-23,8)~17,9 (15,8-20,7)~18,1 (16,2-20,7), 2. Ind 83 (80-88) : 84 (82-88) : 101 (100-106), C) St, 1. Grö 13,0 (11,7-13,9) ~ 5,7 (4,9-7,2) ~7,6 (6,8-8,8) 2. Ind 43,8 (40-52) : 58,5 (54-64) : 133 (122-149)

7 S, 3.3, PPfl, nBG, Kreeke, von Keiser, Berkenthin, Lbg

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 30.04.

3 LBl: dgrün-glzd, lanz, ges, keilfg + 7,9/1,7 + 3,1 + 39/50 % + ka/1

4 Fr: 7 + A IX + 22,5 ~ 18,6 ~ 19,2 + 83 : 85 : 103

5 St: 43 : 64 : 149, NbEd etwas abgedreht, St nicht ganz symmetrisch, L-Achse geschwungen, BNt sehr stark, Fl sehr glatt

10 Za, 3.3, PPfl, nBG, Kreeke, H.Stooß, Einhaus, Lbg

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2-3 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c
2.4 23.04.2015 bis 10.05.

3 LBl: mgrün-glzd, ell, stu-ges, keilfg + 8,0/2,0 + 2,8 + 35/47 % + 1/1

4 Fr: 8 + E VIII/A IX + 22,3 ~ 18,3 ~ 18,3 + 82 : 82 : 100

5 St: 13,7 ~ 5,9 ~ 7,4 + 43 : 54 : 125 + StEd abgerdt, NbEd mit langer, gerader, scharfer Spitze, L-Achse geschwungen, BNt stark, Fl teilweise ganz flach gemuschelt. Bevorzugt von Bienen

28 Z, 3.3, PPfl, nBG, Kreeke, H. Stooß, Einhaus, Lbg, **Abb St + Lbl-28 Z: 4b/29**

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 24.04.2015 bis 29.04.

3 LBl: dgrün-glzd, verk-eifg, ges, keilfg + 6,4/1,6 + 2,4 + 38/50 % + 1/1

4 Fr: 10 + E VIII + 21,1 ~ 17,3 ~ 17,3 + 82 : 82 : 100

5 St: 13,4 ~ 5,5 ~ 7,5 + 41 : 56 : 136 + wie 10 Za

7 W, 3.3, PPfl, nBG, Kreeke, H. Stooß, Einhaus, Lbg

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 21.04.2015 bis 03.05.

3 LBl: dgrün-glzd, eifg, stu-ges, keilfg + 8,3/2,0 + 2,6 + 31/41 % + 1/1

- 4 Fr: 10 + E VIII + 22,0 ~ 18,1 ~ 18,1 + 82 : 82 : 100
 5 St: 13,8 ~ 5,9 ~ 7,8 + 43 : 57 : 132 + wie 10 Za
- 9 N, 3.3, PPfl, nBG, Kreeke, Grafe, Gnutz bei Nortorf**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 ka 2.2 c + 2.3 paa
 2.4 21.04.2015 bis 30.4.
 3 LBl: dgrün-glzd, eifg, anlg-ges, keilfg + 8,6/1,7 + 3,5 + 41/51 % + 3/1
 4 Fr: 2 + E VIII + 21,5 ~ 17,9 ~ 17,9 + 83 : 83 : 100
 5 St: 12,1 ~ 5,6 ~ 7,2 + 46 : 60 : 129 + wie 10 Za
- 10 N, 3.3, PPfl, nBG, Kreeke, Grafe, Gnutz bei Nortorf**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
 2.4 21.04.2015 bis. 29.04.
 3 LBl: derb dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 9,8/2,0 + 3,7 + 38/ 47 % + ka/0
 4 Fr: 10 + E VIII + 21,9 ~ 18,1 ~ 18,1 + 83 : 83 : 100
 5 St: 13,1 ~ 5,4 ~ 7,1 + 41 : 54 : 131 + wie 10 Za, nach der Hälfte nadelspitz
- 14 S, 3.3, PPfl, nBG, Kreeke, H. Törner, Gr. Grönau, Lbg.**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 3
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.1 d + 2.3 paa
 2.4 24.04.2015 bis 02.05.
 3 LBl: dgrün-glzd, eifg, gek, keilfg-abgrdt + 10,5/1,6 + 4,4 + 42/49 % + 1/1
 4 Fr: 6 + M VIII + 20,9 ~ 18,8 ~ 19,3 + 90 : 92 : 103
 5 St: 14,3 ~ 6,5 ~ 8,1 + 45 : 57 : 125
- 15 S, 3.3, PPfl, nBG, Kreeke, H. Törner, Gr. Grönau, Lbg**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 + 2.2 d + 2.3
 2.4 24.04.2015 bis 02.05.
 3 Lbl: dgrün-glzd, ellpt, gekerbt, keilfg + 10,5/2,0 + 3,8 + 36/45% + 1/s
 4 Fr: 5 + E VIII + 20,5 ~ 16,7 ~ 16,7 + 81 : 81 : 100
 5 St: 13,5 ~ 6,4 ~ 8,5 + 47 : 63 : 133
- 16 S, 3.3, PPfl, nBG, Kreeke, H. Törner, Gr. Grönau, Lbg**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c/d + paa
 2.4 23.04.2015 bis 02.05.
 3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 7,8/2,3 + 3,3 + 42/60 % + 2/1
 4 Fr: 5 + E VIII + 23,8 ~ 20,7 ~ 20,7 + 87 : 87 : 100
 5 St: 13,9 ~ 7,2 ~ 8,8 + 52 : 63 : 122 + L-Achse geschwungen, NbEd
 kurz und spitz, BNt sehr stark
 6 größere, rötlich-gelbe Frucht mit etwas Hauch
- 34 S, 3.3, PPfl, nBG, Kreeke, H. Arnold, Gudendorf, Dithm**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 5
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
 2.4 24.04.2015 bis 02.05.
 3 LBl: mgrün, derb, lanz, br-ges, abgrdt + 6,2/1,2 + 2,8 + 45/56 % + ka/1
 4 Fr: 5 + E VIII-A IX + 19,2 ~ 15,8 ~ 16,3 + 82 : 85 : 103
 5 St: 12,1 ~ 4,9 ~ 6,8 + 40 : 56 : 122 + St etwas kleiner, NbEd ein wenig
 abgedreht, L-Achse geschwungen
 6 bunte, kleinfruchtige Sorte

- 60a O, 3.3**, PPfl, nBG, Kreeke, H. Arnold, Gudendorf, Dithm
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + paa
2.4 24.04.2015 bis 30.04.
 - 3 LBl: mgrün, derb, verk-eifg, stu-ges, abgrdt +8,3/1,3 + 4,4 + 53/63 % + 1/1
 - 4 Fr: 10 + A IX + 20,8 ~ 16,6 ~ 17,6 + 80 : 85 : 106
 - 5 St: 12,3 ~ 5,6 ~ 7,7 + 46 : 63 : 138 + St kleiner, ausla-
dende Bauchlinie, etwas kürzer zugespitzt, L-Achse gering ge-
schwungen, Fl glatt
- 30 W, 3.3**, PPfl, nBG, Kreeke, Manfred Nehls, Harmsdorf, Lbg
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 29.04.
 - 3 LBl: mgrün-glzd, br-ell, br-ges, keilf + 11,0/1,8 + 4,0 + 36/43 % + 3/1
 - 4 Fr: 6 + E VIII + 2,2 ~ 2,0 ~ 2,1 + 91 : 95 : 105
 - 5 St: 14,2 ~ 7,1 ~ 9,0 + 50 : 63 : 127
- 31 W, 3.3**, PPfl, nBG, Kreeke, Manfred Nehls, Harmsdorf, Lbg
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3/4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 26.04.2015 bis 01.05
 - 3 LBl: mgrün, br-ell, br-ges, keilf + 7,0/1,3 + 4,0 + 57/70 % + ka/1
 - 4 Fr: 6 + E VIII + 24,9 ~ 19,2 ~ 19,4 + 77 : 78 : 101
 - 5 St: 16,2 ~ 6,4 ~ 8,9 + 40 : 55 : 139
- 12 N, 3.3**, Ppf, nBG, Kreeke, V. Petersen, Olpenitzfeld, Schwansen
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 21.04.2015 bis 01.05.
 - 3 LBl: wie 13 PN, 9,3/2,3 + 3,7 + 40/53 % + 2/1
 - 4 Fr: 10 + E VIII + 22,7 ~ 18,7 ~ 18,7 + 82 : 82 : 100
 - 5 St: 13,6 ~ 5,8 ~ 7,6 + 43 : 56 : 134 + St wie 10 Za, BNt sehr stark
- 13 N, 3.3**, PPfl, nBG, Kreeke, V. Petersen, Olpenitzfeld, Schwansen
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
2.4 21.04.2015 bis 01.05.
 - 3 LBl: dgrün-glzd, ell, stu-ges, keilfg + 8,3/1,6 + 3,3 + 40/49 % + 3/1
 - 4 Fr: 10 + E VIII + 22,3 ~ 18,3 ~ 18,3 + 82 : 82 : 100
 - 5 St: 13,5 ~ 5,6 ~ 7,5 + 41 : 56 : 134, St wie 12 N
- 39 Z, 3.3**, PPfl, nBG, Kreeke, Claus Nickel, RZ-Domhof
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 22.04.2016 - 30.04.
 - 3 LBl: mgrün-glzd, verk-eif, stumpf-ges, keilf + 7,0/1,6 + 3,4 + 49/63 % 4/0
 - 4 Fr: 6 + E VIII + 2,3 ~ 2,0 ~ 2,1 + 87 : 91 : 105
 - 5 St: 14 ~ 6 ~ 8 + 43 : 57 : 133
- 35 S, 3.3**, PPfl, nBG, Kreeke, Wegrund Domäne, Römnitz, Lbg
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 24.04.2015 bis 02.05.
 - 3 LBl: mgrün, ell, br-ges, abgrdt-keilf + 8,4/1,8 + 3,7 + 44/56 % + 1/1
 - 4 Fr: 10 + E VIII/A IX + 20,4 ~ 16,7 ~ 17,6 + 82 : 86 : 105

- 5 St: 12,8~5,7~7,9 + 45 : 62 : 139 + St mittellang zugespitzt, Ende abgedreht, L-Achse geschwungen, BNt starker Wulst, Fl flach, sehr feingrubig
- 6 bunte, kleinfruchtige Sorte
- 36 S,3.3, PPfl, nBG, Kreeke, Wegrand Domäne, Römnitz, Lbg
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2-3 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 24.04.2015 bis 02.05.
- 3 LBl: mgrün-glzd, ell, s-stumpf-ges, keilf +7,5/1,9 + 3,4 + 45/61% + 1/ka
- 4 Fr: 5 + E VIII/A IX + 18,3 ~ 16,1 ~ 16,2 + 88 : 89 : 101
- 5 St: 11,7~5,4~7,4 + 46 : 63 : 137 + wie 36 S, etwas kleine, bunte, Sorte
- 22 W, 3.3, PPfl, nBG, Kreeke, Museum, Seedorf, Lbg Abb Fr-22 W: 2/45
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c/d + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 30.04.
- 3 LBl: dgrün-glzd, verk-eifg, anlg-ges, abgrdt +7,5/1,7 +3,3 + 44/57% + 3/2
- 4 Fr: 10 + E VIII/A IX + 22,1 ~ 19,0 ~ 19,6 + 86 : 89 : 103
- 5 St: 12,8~5,9~8,2 + 46 : 64 : 139 + NbEd wenig abgedreht und kürzer

3.4. UNTERART SPILLING, SPILLN, SPENLING UND AEHNLICHE 61 EXPL

Prunus domestica ssp. pomariorum Werneck

A. echte Spillinge 51 Expl.

Frucht mit ein wenig gebogener Längsachse, auch oval-trapezförmig mit Anhang. Stein deutlich sichelförmig, aber auch gerader Rücken und gebogener Bauch bis schwach ausladender Rücken und stärker gebogenem Bauch.

Stets ein über den Körper des Steines hinausragender, +/- gebogener Stiel mit +/- Länge! Dadurch ist die Längsachse +/- bogenförmig, der Stein in Seitenlage also nicht symmetrisch, **ein wichtiges, abgrenzendes Kennzeichen aller Spillinge!**

Früchte bis 37,4-24,4-25,8 mm.. Süß-saftig, später auch mehlig schmeckend. Reife Ende Juli - Anfang August. Spillinge sind eine besonders robuste Unterart und gar nicht so selten im nBG, wie es noch vor wenigen Jahren angenommen wurde, was auch für den Namen gilt, der allerdings inzwischen leider auch für vielerlei Primitiv-pflaumen benutzt wird. Die Zusendung von Zweigen mit Früchten ist dringend erbeten! Vielleicht sollten 3.4.2 und 3.4.3 wegen schwächerer morphologischer Merkmale eines Spillings in Anlehnung an 3.7 und 3.8 "Halbspilling" und 3.4.1 "Echter Spilling" heißen.

3.4.1 Variante Gelbroter/Roter Spilling 7 Expl.

Die Frage, ob der Wohlriechende Spilling (3.4.5) eine eigenständige Sippe ist (var. *odorata* Körber-Grohne 1996), Pflanzplätze 69b/c W oder zu 3.4.1 gehört, rückt erst näher heran, nachdem erste Früchte der Wiese vorliegen. Das gilt auch für den Weidenberger Spilling (3.4.4 Pflanzplätze 38 Z und 84 W).

Die Form a Gelbroter und die Form b Roter Spilling unterscheiden sich nicht nur in der Farbe. Deutliche Unterschiede zeigen auch die Steine:

Form a: 26 Z, 22,4~6,9~9,2 mm + 31 : 41 : 133, Abb St + Lbl-26a Z-: 4b/30

Form b: 31 N, 20,3~6,8~10,8 mm + 33 : 53 : 159

3.4.1a Form a, Gelbroter Spilling, BSt/FSt kahl 4 Expl.

***3 Expl, A) Ind LBl 41,8 % (34-57%); Ind Sprei 49,5% (44-64 %), B) Fr, 1. Grö 37,4 ~ 24,4 ~ 25,8, 2. Ind 65 : 69 : 106, C) St. 1. Grö 19,9 (18,2-22,4)~ 6,3 (5,6-6,9) ~ 9,2 (8,3-10,0), 2. Ind 32,3 (31-34) : 46,7 (41-53) : 146,3 (133-156)**

Abb Fr-26a Z: 1/14; St + Lbl-26a Z: 4b/30

LBl etwas verkehrt-eiförmig, Basis keilförmig, Indizes LBl 43 % / Spreite:50,7 %. Kronblätter ansehnlich groß, leuchtend gelb-rote Frucht, sichelförmig (Klassische Form eines Spillings), Fruchtsiel lang und kahl. Stein lang und bogenförmig. Indizes 29:42:146. Fruchtreife M/E VII, Geschmack süß-fruchtig, leider häufig bald mehlig. Zweimal im nBG gefunden! 3 nBG, 2 dBG.

26a Z, 3.4.1a, PPfl, dBG, Gelbroter Spilling, Fa Fischer, Wiesenburg/Mark, Utlg 2

1 Spr: 1.1 ka 1.2 + 2. 0 + jüng-Trb hell grün-rot

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3-4 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa

2.4 20.04.2015 bis 08.05. **Abb** Fr-26a Z: 1/14; St + Lbl-26a Z: 4b/30

3 LBl: gelbgrün! verk-eifg, anlg-ges, keilfg + 8,9/1,0 + 3,5 + 39/44% + 3/2

4 Fr: 10 + M/E VII + 37,4 ~ 24,4 ~ 25,8 + 65 : 69 : 106

5 St: 22,4~6,9~9,2 + 31 : 41 : 133 + typischer Spillingstein, L-Achse bogenfg: St länglich, BNt bogenförmig, Wulst gut betont, Stiel folgt der geschwungenen Linie und ragt weit hervor, RNt fast gerade, Fl sehr flach gerieft

6 leuchtend gelb-rote Früchte. Gelieferte Steine von A. Kalesse

27 Z, 3.4.1a, PPfl, dBG, Gelbroter Spilling, Fa Fischer, Wiesenburg/Mark, Utlg 3.1

1 Spr: 1.1 ka 1.2 ka + 2. 0

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3-4 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 3.3 paa

2.4 17.04.2015 bis 29.04.

3 Lbl: matt dgrü, ellipt, gekerbt, keilfg + 11,7/2,6 + 4,0 + 34/44 % + 3/1

4 Fr: 10 + M/E VII + - +

5 St: 18,2~5,6~8,3 + 32 : 47 : 150 + St sonst wie 26 Z

6 leuchtend gelb-rote Früchte

87 W, 3.4.1a, PPfl, nBG, Gelbroter Spilling, Johs. Nath, RZ-Dermin

1 Spr: 1.1 ka? + 1.2 . bh2? + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 **bh1?** + 2.2 d+ + 2.3 Paa

3 LBl: gelbgrün, lanz, br-ges, keilfg + 9,2/1,8 + 3,4 + 37/46 % + 4/4

4 Fr 3 + A VIII + 33,7~21,7~24,0 + 64 : 72 : 115

5 St: 19,1~6,4~10,0 + 34 : 52 : 156

6 Fr typische Spillingform, St mit abgesetztem, fast geradem Stiel

53 01 O, 3.4. 1a, PPfl, nBG, Gelbroter Spilling, Wüstmark/Schwerin, G. Michaelis, 23760 Fehmarn/Burg, Lotsenwg 31, noch Jugendstadium.

1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.

2 Blü: 1.1 bW + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa

3 Lbl: mgrün, ellipt, gekerbt, rdl + 4,7/0,5 + 2,7 + 57/64% + 2/1

3.4.1b Form b, Roter Spilling 3 Expl.

Bislang nicht im nBG gefunden.

***1 Expl A) Ind LBl 41 % (38-45%); Ind Sprei 51% (47-56 %), B) Fr 1. Grö 37,2 ~ 28,7 ~ 28,8, 2. Ind 77 : 77 : 100, C) St 1. Grö 20,3 ~ 6,8 ~ 10,8, 2. Ind 33 : 53 : 159**

31 N, 3.4.1b, PPfl, euBG, Spilling, E. Rößler, Feldkirchen, Kärnten, Österreich

- 1 Spr: 1.1 bh3 lg-grannig + 1.2 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 bh3 + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 25.04.2015 bis 03.05.
- 3 LBl: dgrün, lanz, ges, abgrdt + 10,5/2,0 + 4,0 + 38/47 % + 3/3
- 4 Fr: 2 + E VIII + 37,2~28,7~28,8 + 77 : 77 : 100
- 5 St: 20,3~6,8~10,8 + 33 : 53 : 159
- 6 Fr rot, zum Stielende verjüngt, typ. Spillingform, St mit wenig abgedrehtem Stiel, Rückennaht spitz, Bauch gefurcht

29b O, **3.4.1.b**, euBG, "Roter" Spilling, Reis A. Lugmair, Gstocket 10, A-4072

Alko-

ven, Oö von Fuchsberg bei Ungenach, Oö, Pflzg 10/11

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 4 + 1.3 4/6 + 2.1 ka + 2.2 d+ + 2.3 paa
2.4 20.04.2016 - 01.05.
- 3 Lbl dgrün-gldz, eifg, gekerbt, rdl + 8,9/1,7 + 4,0 + 45/56 % + 2/2

31b6 Z,**3.4.1b**, dBG, Roter Spilling, von Hausmann, Guben, über C. Schmidt, Wiesenrain 2, 03130 Spremberg

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
- 3 LBl: mgrün, ell, ges.gkrbt, kförmig + 6,8/1,2 + 2,8 + 41/50 % + 2/1

3.4.2 Variante Blauer Spilling. BSt/FSt behaart oder kahl 32 Expl

Im nBG gar nicht so selten, weil häufig verkannt. Frucht etwas weniger prägnant, häufiger gerundet trapezförmig. Stein typisch für einen Spilling. - Absolute Werte der LBl z.B. bei 8 S : Länge 7 cm, davon Stiel 1,6 cm, Spreite 2,5 cm. Indizes Lbl 48,6 %; Indizes Spreite 59,8 %. LBl recht dünn, Rand eher kerbig als gesägt. Nerven der Unterseite bis zum Rand behaart. Fruchtstiel kahl oder behaart. Die Bauchnaht des Steines ist ausladend, der sehr kurze Stiel folgt dieser Linie. Weitere bekannte Fundorte dBG : Raum Guben, Oberlausitz, Havelland..12 nBG, 9 dBG, 3 euBG.

5 St: 15,3~6,4~7,9 + 42 : 52 : 123 + L-Achse bogenfg, RNt ganz schwach gewölbt, BNt ausladend gewölbt, Stiel folgt ein wenig dieser Wölbung, BNt mäßig breit mit 2 Riefen, Fl glatt. Gelieferte St von A. Kalesse, B-Spandau

***16 Expl A) Ind LBl 47,5 % (35-66%); Ind Sprei 58,3% (43-77 %), B) Fr, 1. Grö 24,4 (18,5-33,2) ~ 20,4 (14,4-29,9) ~ 21,6 (14,9-32,2), 2. Ind 80 : 85 : 106, C) St, 1. Grö 14,9 (12,2-18,9)~ 6,1 (5,4-8,4) ~8,6 (7,2-12,2), 2. Ind 41 (35-56) : 58(50-77) :141 (124-167)**

Die folgende Einteilung bedarf der dringenden weiteren Beobachtung! Folgend ein Vergleich der Zusammenfassungen:

3.4.2a, B)Fr, 1.Grö 25,9~20,8~22,1, C) St, 1.Grö 17,0~6,6~9,2, 2.Ind 39: 54: 139
3.4.2b, B)Fr, 1.Grö 26,7~23,8~25,3, C) St, 1.Grö 15,1~6,9~9,9, 2.Ind 46: 66: 143
3.4.2c, B)Fr, 1.Grö 26,4~22,6~24,2, C) St, 1.Grö 14,3~5,6~7,9, 2.Ind 39: 55: 141
3.4.2d, B)Fr, 1.Grö 18,5~14,4~14,9, C) St, 1.Grö 13,3~5,4~7,2, 2.Ind 41: 54: 133

Typ 3.4.2a des Blauen Spillings, 5 nBG, 2 dBG, 1 euBG 8 Expl.

Stein lang, stark gebogene Achse, Bauch mit Wulst, etwas gewölbt, Rücken schmaler, so gebogener, längerer Stiel, Flanken wenig runzelig, typisch 18 O von Nieby I: 18,9~6,7~9,4 mm, 35 :50 ;140, Abb Fr-18 O: 1/15: St + Lbl-18 O: 4b/31

6 Expl A) Ind LBl 41 % (36-46%); Ind Sprei 53% (44-64 %), B) Fr, 1. Grö 25,9 (23-28,9) ~ 20,8 (18-25,1) ~ 22,1 (20-26,4), 2. Ind 80 : 85 : 106, C) St, 1. Grö 17,0(14,7-18,9)~ 6,6 (5,5-7,5) ~ 9,2 (8,6-9,9), 2. Ind 39 (35-45) : 54(50-59)

:139 (124-156)

18 O, 3.4.2a, PPfl, nBG, Blauer Spilling, alter Knick, Parkplatz/N, **Nieby I, Angeln**

1 Spr: 1.1 lg-wollig + 1.2 + 2. 0, **Abb** Fr-18 O: 1/15: St + Lbl-18 O: 4b/31

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3/4 + 1.3 4-6 + 2.1 bh2 + 2.2 c/d + 2.3 Paa
2.4 20.04.2015 bis 30.04.

3 LBl: graugrün, ellipt, br-ges, keilfg, - 7,7/2,0 + 3,3 + 43/58 % + 3/2

4 Fr: 10 + E VIII/A IX + 28,9 ~ 25,1 ~ 26,4 + 87 : 91 : 105

5 St: 18,9~6,7~9,4 + 35 : 50 ; 140, + St linsig, L-Achse bogenfg, deutlich abgewinkelter Stiel mit Riefen, NbEd spitz, BNt kräftig, FL im unteren Teil mit Riefen, **Abb St 4b/31**

6 Fr blau beduftet, ein wenig eiförmig, herb-aromatisch, steinhaltend

19 O, 3.4.2a, PPfl, nBG, Blauer Spilling, wie 18 O, **Nieby I**

1 Spr: 1.1 lg-wollig + 1.2 wollig + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4-6 +
2.4 21.04.2015 bis 30.04.

3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 9,8/2,4 + 3,8 + 39/51 % + 2/2

20 O, 3.4.2a, PPfl, nBG, Blauer Spilling, wie 18 O, **Nieby I**

1 Spr: 1.1 lg-wollig + 1.2 wollig + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4-6 +
2.4 22.04.2015 bis 30.04.

3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 9,8/2,2 + 3,5 + 36/46 % + 2/1

4 Fr: 6 + EVIII + 2,7 ~ 2,5~ 2,7 + 93 : 100 : 108, dicke Falte

5 St: 19,2 ~ 7,6 ~ 10,3 + 40 : 54 : 136

60b O, 3.4.2a, PPfl, nBG, Blauer Spilling, Hohlweg (oben), **Nieby II, Angeln**

1 Spr: 1.1 bh 3 + 1.2 bh3 + 2

2 Blü: 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa

3 LBl: graugrün, ell, gekerbt, gerdt + 6,9/1,7 + 2,8 + 41/54% + 4/5

4 Fr: 5 + E VIII + 25~19~22 + 76 : 88 : 116

5 St: 17,9~7,5~9,9 + 42 : 55 : 132

6 Fr A VIII unreif, zum Stiel schlanker, starke Falte, St mit deutlichem Spillenschwung, kräftige Bauchfurche

39b O, 3.4.2a PPfl, nBG, Blauer Spilling, Hohlweg (unten), **Nieby II, Angeln**

1 Spr: 1.1 bh 1 + 1.2 bh2 + 2

2 Blü: 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa

3 LBl: wie X1, aber 7,8/1,2 + 3,3 + 42/73 + 3/5

4 Fr: 5 + E VIII + 23~18~20 + 78 : 87 ; 111

5 St 16,7~7,5~9,3 + 45 : 56 : 124

6 wie X1

8 S, 3.4.2a, PPfl, dBG, Blauer Spilling, M. Krüger, Gr. Breesen/Guben, Brdgb

1 Spr: 1,1 bh1 + 1.2 bh2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 bh3 + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 24.04.

3. LBl: mgrün, ell, ges, keilfg, + 7,0/1,6 + 2,5 + 36/46 % 99+ 3/3

4 Fr: 6 + A VIII + 4,0 ~ 3,0~3,1 + 75 : 77 : 103

5 St: 20,6 ~ 6,5 ~ 9,7 + 32 : 47 : 149 + St typisch gestielt

29b2 Z, 3.4.2a, blauer Spiling, als 3.0.2 G. Kleinhans, Schneeeifel

1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 d + paa

- 2.4 12.04.2016 - 01.05.
- 3 Lbl: derb-dgrün, ellipt. grob gekerbt, rdl + 9,1/1,6 + 4,5+ 49/60 % + 2/2
- 4 Fr: 7 + E VIII + 3,6 ~ 2,9 ~ 3,0 + 81 : 83 : 108, blau mit Hauch
- 5 St: 28 ~ 25 ~ 27 + 89 : 96 : 108
- 6 Früchte verschieden groß, lange Falte
- 14 N, 3.4.2a**, PPfl, dBG, Blauer Spilling, wrzucht, H. Arnold, s.o. Hoch-Schwld
- 1 Spr: 1.1 bh2 + !:2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 5 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 24.04.2015 bs 02.05.
- 3 LBl: gelbgrün-gld, eifg, ges, abgrdt-keilfg +6,7/1,5 +3,1 + 46/60%+ ka/1
- 4 Fr: 10 + M/E VIII + 24,7 ~ 20,9 ~ 21,1 + 85 : 85 : 101
- 5 St: 14,7 ~ 5,5 ~ 8,6 + 37 : 59 : 156, St wie 10 W
- 6 Frucht dunkel-blau, leicht eiförmig, z.T. mit Spitze, vollreif beduftet, süßpflaumig, etwas Säure
- 30c2 S, 3.4.2a**, dBG, PPfl, Bl Spilling, Sorte C.Städeles Aprikosenpflaume, C. Städele, 88667 Warthausen, Meggelinstr.23.
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 6 + 2.1 bh + 2.2 c ,extr dünn + 2.3 eiz
2.4 4. 4. 2016 - 30.04.
- 3 Lbl: mittelgrün, ellipt, ges, rdl + 4,8/0,6 + 2,0 + 42/48 % + 1/1
- 2017**
- 4 Fr: 4 + M IX + 21,3 ~ 19,3 ~ 19,5 + 91 : 91,5 : 101
- 5 St: 14,0 ~ 6,2 ~ 9,0 + 44 : 64 : 145
- 6 Fr kugl, dunkelrot, unten spitzig
- 2018**
- 4 Fr: 8 + E VIII + 23,8~19,9~20,8 + 84 : 87 : 105
- 5 St: 16,0~6,5~9,4 + 41 59 : 145
Fr dunkelblau, mit Hauch, eifg, spitz zulaufend, rt Saft, säuerlich-fruchtig, St Flanken glatt
- 17b1 Zb, 3.4.2a**, euBG, PPfl, Bl. Spilling, Sorte Shropshire Damson, Typ 2, Caerphilly, Süd-Wales, UK
- 1 Spr: 1.1 bh3, s wollig + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 bh3 + 2.2 c + 2.3 eiz/paa
2.4 18.04.2016 - 28,04.
- 3 LBl: mgrün, ell, ges, keilf + 5,4/1,1 + 2,4 + 44/43 %
- 2015**
- 4 Fr: 5 + A IX + 27,8~21,0~21,0 + 76 : 76 : 100
- 5 St: 16,6~5,8~8,9 + 35 : 54 : 153
- 6 Fr blau, am Stiel deutlich schmaler, Stein deutlich gestielt, Stiel abgewinkelt, Bauch stärker als Rücken
- 2017**
- 4 Fr: 5 + A IX + 26,2 ~ 19,5 ~ 19,9 + 74 : 76 ; 102:107:104
- 5 St: 16,7 ~ 6,3 ~ 9,7 + 38 : 58 : 154
- Sorte **3.4.2a** Usedomer Pflaumenbaum
Gehölz von Andreas Kalesse, Stein gerade Achse, ganz leicht gebogen gestielt, Flanken glatt, Frucht eifg, also keine Oval-Pflaume, wohl schmeckend
- 1 Spr 1.1 ka + 1.2 + 2.3
- 2 Blü: 2.3 paa
- 3 LBl mgrün, dünn eifg, fast gekerbt, gerundet + 5,1/1,0 + 2,5 + 49/61 + -/bh
- 2018**
- 4 Fr: 13 + E VIII + 26,4~20,7~20,7 + 78 : 78 ; 100

5 St: 19,2~6,5~9,1 + 34 : 47 : 140 %

Typ 3.4.2b des Blauen Spillings

9 Expl.

Stein kräftig sowie breiter und dicker als Form a, Flanken mit starkem Mittelgrat, gebogener Stiel, noch kürzer als a, typisch 17 O Dorf Tirol: 12,2~6,6~9,2 mm, 56 : 75 : 135, **Abb** Fr-34W: 1/5; St-25s N: 4b/32

6 Expl A) Ind LBl 45 % (37-58%); Ind Sprei 58% (43-68 %), B) Fr, 1. Grö 26,7 (20,4-33,2) ~ 23,8 (20-29,9) ~ 25,3 (21-32,2), 2. Ind 90 : 95 : 106, C) St, 1. Grö 15,1 (12,2-17,8)~ 6,9 (6,2-8,4) ~ 9,9 (8,4-12,2), 2. Ind 46 (42-56) : 66(57-77) :143 (133-167)

62 N, 3.4.2b, dBG, PPfl, blauer Spilling, Fruchtreife A8, Forst, Brandenburg wie 63 N ?

- 1 Spr: 1.1 wollig + 1.2 wollig + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 sw 1.2 3 1.3 6 2.1 **bh3** + 2.2 c 2.3 eiz
2.4 19.04.2015 bis: 30.04.
- 3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdl + 8,5/1,9 + 4,5 + 53/60 % + 3/3
- 4 Fr: 6 + A VIII + 3,1 ~ 2,9 ~ 3,0 + 94 : 97 : 103
- 5 St: 15,4 ~ 8,4 ~ 11,1 + 55 : 72 : 132

17 O, 3.4.2b, PPfl, euBG, Bl. Spilling, Dorf Tirol, 1300 Höhe, Italien

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 19.04.2015 bis 30.04.
- 3 LBl: dgrün, eifg, br-ges, abgrdt + 7,2/1,2 + 4,0 + 56 %/67 % + 1/2
- 4 Fr: 10 + A X + 20,4 ~ 20,0 ~ 21,0 + 98 : 103 : 105
- 5 St: 12,2~6,6~9,2 + 56 : 75 : 135 + St oval, L-Achse gering gebogen, BNt breiter Wulst, Fl mäßig gerieft
- 6 frühe gleichmäßige Beduftung, herb-säuerlich-fruchtig, kräftig

33 O, 3.4.2b, PPfl, nBG, Bl. Spilling, H. Bieger, von Stakendorf, Plön

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 32 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz/paa
2.4 28.04.2016 - 04.05.
- 3 LBl: dgrün-glzd, lanz, ges, kfg + 9,1/2,0 + 3,7 + 41/52 % + 2/1

2016 4 Fr: 5 + M/E IX + 27,5~23,e~24,1 + 85 : 88 : 103

5 St: 15,9~7,3~12,2 + 46 : 77 : 167

6 Fr blau, eifg, St schwach abgerückt gestielt, Bauch ausladend

2017 4 Fr: 6 + E IX + 20,7 ~ 17,5 ~ 18,4 + 85 89 : 105

5 St: 14,7 ~ 6,5 ~ 9,9 + 44 : 67 : 152

6 Fr schwarz mit Hauch, oval

4 O, 3.4.2b, PPfl, nBG, Blauer Spilling, H. Haack/ G.Sötje, Brokdorf, Steinbg

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 21.04.2015 bis 01.05.
- 3 LBl: dgrün-glzd, ell, br-ges, abgrdt + 6,3/1,0 + 2,3 + 37/43 % + ka/ka
- 4 Fr: 5 + ME VIII + 27,2 ~ 23,9 ~ 25,9 + 88 : 95 : 108
- 5 St: 15,3 ~ 6,5 ~ 9,5 + 42 : 62 : 146, St länglich gekrümmt, L-Achse schwach bogenfg, RNt schwach, BNt stärker gewölbt, Stiel folgt der Wölbung, Fl mit 1 durchlfd Riefe, sonst etwas warzig
- 6 Unterschiedliche, auch frühe Reife der Früchte

- 24b N, 3.4.2b**, PPfl, nBG, Blauer Spilling, H. Haack/G. Sötje, Brokdorf, Steinbg.
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0 + jüngere Triebe grünrot
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 19.04.2015 bis 03.05.
 - 3 LBl: dgrün, derb, ell, br-ges, keilfg + 8,5/1,9 + 4,0 + 47/61 % + 1/1
 - 4 Fr: 10 + ME VIII + 26,9 ~ 24,0 ~ 25,6 + 89 : 95 : 107
 - 5 St: 14,3 ~ 6,6 ~ 8,8 + 46 : 62 : 133, St sonst wie 4 O
 - 6 Früh gleichmäßig beduftet, früh reif, süßlich-herb-aromatisch !
- 11 N, 3.4.2b**, PPfl, nBG, Blauer Spilling, Wegrđ, Im Heisch, Gnutz bei Nortorf
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. umgewandelte Triebe
 - 2 Blü: 1.1 .sw + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
2.4 20.04.2015 bis 27.04.
 - 3 LBl: dgrün-glzd, verk-eifg, anlg-ges, lg-keilfg + 10/2,5 + 3,9 + 39/52 % + 1/1
 - 4 Fr: 10 + A9 + 25,2 ~ 21,8 ~ 22,8 + 87 : 90 : 105
 - 5 St: 14,8 ~ 6,2 ~ 8,4 + 42 : 57 : 135 + St wie 18 O, etwas kleiner
 - 6 Frucht eiförmig, dblau, weich und aromatisch-pflaumig, steinhaltend, früh gleichmäßig beduftet
- 34 W, 3.4.2b**, PPfl, euBG, Kricke, über Horst Franzen, Maasholm, Lyoer (DK)
- 1 Spr: 1.1 bh3 c kurz + 1.2 + 2 3. + **Abb** Fr-34 W: 1/5
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
2.4 19.04.2015 bis 01.05.
 - 3 LBl: dgrün, derb, br-eifg, br-ges, abgrdt + 6,0/0,6 + 4,3 + 72/80 % + 2/2
- 2016**
- 4 Fr: 1 + M IX + 19,9 ~ 17,7 ~ 18,7 + 89 : 94 : 106
 - 5 St: 11,0 ~ 6,4 ~ 7,7 + 58 : 70 : 120 + StEd abgerundet, NaEd spitz.
- 2017**
- 4 Fr 7 + M IX + 22,3 ~ 18,7 ~ 19,2 + 84 : 86. : 103
 - 5 St: 13,2 ~ 6,8 ~ 8,8 + 52 : 67 : 129
- 25s N, 3.4.2b**, dBG, Bl. Spilling, Sorte Eibenbacher Aprikosenpflaume, W. Hartmann, Uni Hohenheim, **Abb** St-25s N: 4b/32
- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 bh3 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh3 + 2.2 c, kräftig + 2,3 eiz
2.4 23.04.2016 - 02.05.
 - 3 Lbl: derb-dgrün-glzd, gekerbt, rdl, 7,8/1,2 + 4,5 + 58/68 % 2/wollig
- 2016**
- 4 Fr: 5 + M VIII + 33,2 ~ 29,9 ~ 32,2 + 90 : 97 : 108
 - 5 St: 17,8 ~ 8,4 ~ 11,5 + 47 : 65 : 137
 - 6 Fr dunkel rotblau, dick tropfenförmig, deutliche Falte, Stielende des Steines deutlich abgedreht
- 2017**
- 4 Fr: 5 + A VIII + 31,2 ~ 27,8 ~ 28,3 + 89 : 94 : 105
 - 5 St: 16,5 ~ 9,1 ~ 11,2 + 55 : 68 ; 123
- 2018, extrem trocken**
- 4 Fr: 6 + M VIII + 15,4 ~ 14,1 ~ 14,6 + 92 : 95 : 104
 - 5 St: 13,9 ~ 7,3 ~ 10,0 + 53 : 72 : 137
- Fr dunkelblau, mit Hauch, flache Falte, mehlich-pflaumig-süßlich, St schwache Biegung, steinlösend
- 25t N, 3.4.2b**, dBG, Bl Spilling, Sorte Eibenbacher Aprikosenpflaume, wie 25s N
- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 bh3 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh2 + 2.2 c, normal + 2.3 Paa
2.4 23.04.2016

3 LBl: derb-dgrün-gldz, gekerbt, rdl + 9,8/2,1 + 4,4 + 45/57 % + 2/wollig
2017

4 FR: 1 + M VIII + 28,2~26,1~27,0 + 93 : 96 : 103

5 St: 15,2~6,8~10,1 + 45 : 66 ; 149

6 LBl kräftig, großblättrig, Fr kugelig, rot, saftig, St gerade Achse, beidseitig spitz, starke Bauchnanht

2018

4 Fr: 5 + M VIII + 15,2~14,2~14,7 + 93 : 97 : 104

5 St: 14,8~7,3~11,2 + 49 : 76 : 153

Typ 3.4.2c Blauer Spilling, _____, _____ 4 Expl.

Abb Fr-69f W: 2/35; St-69f W: 4b/33. Stein klein, schlank, Flanken völlig glatt, Bauch etwas stärker gebogen als Rücken und glatt, Stiel und Spitze etwas abgebogen, typisch 89a W von Brockdorf, Kreis Steinburg, S-H: 15,4~5,6~8,1 mm, 36 : 53 : 145

***3 Expl A) Ind LBl 54 % (35-66%); Ind Sprei 65% (43-77%), B) Fr, 1. Grö 26,4(23,9-30,2) ~ 22,6 (19,7-26,8) ~ 24,2 (21,6-29,3), 2. Ind 86 : 92 : 107, C) St, 1. Grö 14,3 (13,5-15,4)~ 5,6 (5,5-5,6) ~ 7,9 (7,3-8,4), 2. Ind 39 (36-41) : 55(53-60) :141 (130-153)**

89a W, 3.4.2c, PPfl, nBG, Blauer Spilling, H. Haack/G. Sötje, Brokdorf, Stbg

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa

3 LBl: mgrün, ell, br-ges, keilfg + 7,8/1,5 + 4,6 + 59/73 % + 4/3

4 Fr: 10 + M VIII/A IX + 30,2 ~ 26,8 ~ 29,3 + 89 : 97 : 109

5 St: 15,4 ~ 5,6 ~ 8,1 + 36 : 53 : 145

6 Fr schwache Falte! Etwas steinlösend, rötliches Kochwasser, lange ungleichmäßig reif. Frucht rot-blau, blauer Hauch. Wenig adstringierend, aber fruchtig. St länglich, sehr glatt, kleiner als Form a und b, deutlich gestielt

69f W, 3.4.2c. LSt, euBG, Spilling aus der Schweiz, Baumschule Ritthaler, s.o., R-P Form Fr und St gemäß Spilling, Farbe dunkelrot, unreif ?

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0. **Abb** Fr-69f W: 2/35; St-69f W: 4b/33.

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 1 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d, sehr dünn + 2.3 eiz
2.4 20.3.2016 - 12.4.

3 LBl: matt-grün, eifg, gekerbt, rdl + 4,4/1,0 + 2,6 + 59/76 % + 1/1

2017

4 Fr: 8 + ? + 26,0 ~ 22,6 ~ 24,6 + 87 : 95 : 109

5 St: 14,5 ~ 6,6 ~ 9,1 + 46 : 62 : 138

2018

4 Fr: 7 + M VIII + 25,6~20,7~21,7 + 81 : 85 : 105

5 St 15,9~5,8~8,2 + 36 : 52 : 141

Fr dunkelblau, eifg, säuerlich-fruchtig, St Flanken s glatt, typisch

16a Zb, 3.4.2c PPfl, euBG, Bl. Spilling, Sorte Farleigh-Damson, G. Staffel, Ahornblatt, Mainz, Postfach 1125, Utlg St. Julien, INRA II

1 Spr: 1.1 bh 3 s. kurz gezähnt + 1.2 ebenso + 2. 2

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 2/3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 20.04.2016 - 02.05.

- 3 Lbl: mgrün, ellipt, ges, keilfg + 6,8/1,2 + 2,4 + 35/43 % + fast ka/1
- 4 Fr: 5 + A IX + 23,9~19,7~21,6 + 82 90 : 110
- 5 St: 13,5~5,6~7,3 + 41 : 54 : 130
- 6 Fr blau, am Stielende verjüngt, St am Stielende etw abgewinkelt, Narbenende spitz

25c N, 3.4.2c, PPfl, dBG, blauer Spilling, als 3025 Oberreuter Ldpfl, D.Schmidt , 76889 Oberrotterbach, R-P

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3-6 + 2.1 ka + 2,2 d + 2.3 Paa
2.4 5.5.2015 bis 09.05.
- 3 Lbl: mgrün-glzd, ellipt, ges, keilfg + 6,4/1,0 + 3,1 + 48/57 % + 3/2
- 2018 4 Fr: 5 + E VIII + 2,1 ~ 2,0 ~ 2,3 + 95 : 110 : 115
- 5 St: 14,0 ~ 6.1 ~ 10,4 + 44 : 74 : 170
- 2019 4 Fr: 8 + M VIII + 2,7 ~ 2,5 ~ 2,6 + 93 : 96 : 104
- 5 St: 14,1 6,7 ~ 10,5 + 48 : 74 : 157
- 6 Fr blau mit Hauch, starke Falte von oben bis unten

25d N, 3.4.2c PPfl, dBG, bl Spilling, als 3.0.15 Oberreuter Ldpfl, über D. Schmidt

- 1 Spr: 1 1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 6 + 2.1 bh2 ? + 2,2 d + 2.3 paa
2.4 01.05.2015 bis 09.05.
- 3 Lbl: mgrün-glzd, ellipt, ges, keilfg + 6,6/1,2 + 3,1 + 47/57 % + 3/3
- 4 Fr: 10 + A IX + 2,7 ~ 2,5 ~ 2,6 + 93 : 96 : 104, ohne Falte
- 5 St: 13,2 ~ 6,7 ~ 10,3 + 51 : 78 : 154

29a4 O, 3.4.2c blauer Spilling, als 3.0.14 Brit Shepherds Bullace, euBG, PPfl, über G. Staffel, wie 31 e O

- 1 Spr: 1.1 wollig s kurz + 1.2 wollig + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 21.04.2016 - 30.04.
- 3 Lbl: matt-grün, ellipt, gekerbt, keilfg + 6,8/1,2 + 2,8 + 41/50 % + 3/3
- 4 Fr: 8 + E VIII + 1,5 1,2 ~ 1,3 + 80 : 87 : 108, Paa
- 5 St: 14,1 ~ 6.0 ~ 8,8 + 43 : 62 : 147, geringe Spillingsähnlichkeit

10 W, 3.4.2c, PPfl, dBG, Blauer Spilling, wrzecht, H.Arnold, Berliner Str. 61, Heide, v. Hochschwarzwald

- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 paa
2.4 18.04.2015 bis 30.04.
- 3 LBl: dgrün, verk-eifg, anlg-ges, abgerundet + 7,0/1,0 + 4,6 + 66/77% + 1/1
- 4 Fr: 7 + A VIII + 25,2~21,2~21,6 + 84 : 86 : 102
- 5 St: 13,9-5,5-8,4 + 40 : 60 : 153 + L-Achse bogenfg, St mit ausladender BNt etw abgewinkelt gestielt, Narbenende spitz, Fl glatt
- 6 Früchte eiförmig, blau wie überreife Kreeken

30b O, 3.4.2c, PPfl, dBG, Blauer Spilling, A. Kalesse, s.o., Berlin-Gatow

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 22.04.2016 - 29.04.
- 3 LBl: dgrün-glzd, ell, gkerbt, abgrdt + 8,3/0,7 + 5,0 + 60/66 % + 3/2
- 4 Fr: 1 + EIIIV + 2,2 ~ 1,8 ~ 1,9 + 81 : 86 : 105
- 5 St: 15,5 ~ 6,4 ~ 8,5 + 41 : 55 : 133 + typ c-Form deutlich

Typ 3.4.2d des Blauen Spillings, Abb 2 nBG

Dieser Typ wurde im nBG erstmalig in Voßhörn der Stadt Schenefeld, Kreis Pinneberg, durch Florian Pitzke, Lohkampstraße 163, 22523 Hamburg gefunden. Die kleine, blaue Frucht ist typisch lang-eiförmig, Der Bauch des Steines ist breiter als der Rücken, das Stielende zeigt die deutliche Abwinkelung eines Spillings. Auffällig ist der sehr lange, dünne, grüne Fruchtsiel.

1 Expl A) Ind LBl 50 % (; Ind Sprei 57% , B) Fr, 1. Grö 18,5 ~ 14,4 ~ 14,9, 2. Ind 78: 81 : 103, C) St, 1. Grö 13,3 ~ 5,4 ~ 7,2, 2. Ind 41 : 54 : 133

53.0.8 O, 3.4.2d, PPfl, nBG, Bl Spilling, F. Pitzke, Lohkampstr.163, 22523 HH

1 Spr: 1.1 kahl, glatt Abb St-53 08 O: 4b/34

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 + 1 + 2.1 kahl + 2.2 d+, s. dünn + 2,3 Paa

3 LBl dunkelgrün, ell, gesägt, keilfg + 6,8/0,8 + 3,4 + 50/57% + ka/1

2016

4 Fr: 2 + VIII + 18,5~14,4~14,9 + 78 : 81 : 103

5 St: 3 + 13,3~5,4~7,2 + 41 : 54 : 133

6 Frucht und Stein zeigen deutlich die Merkmale eines Blauen Spillings.

2017

4 Fr: 7 + M VIII + 17,9 ~ 13,9 ~ 14,6 + 78 : 82 : 105

5 St: 12,8 ~ 5,8 ~ 7,9 + 45 : 62 : 105, Abb St 4b/34

6 Fr: Fr blauschwarz, Hauch, oval, unten schlanker

53 02 O, 3.4.2d, PPfl, nBG, Bl Spilling, F. Pitzke, Lohkampstr.163, 22523 HH

1 Spr: 1.1 ka 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 4 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa

Achtung : Der "so genannte blaue Spilling", Form d, (über W. Hartmann aus dem Lager von A. Kalesse), dessen Stein keinen abgewinkelten Stiel hat, dürfte zur Unterart Halb-Zwetsche gehören. Zur sicheren Bestimmung sind weitere Früchte erforderlich. Leider sind unsere beiden Gehölze noch zu klein 30a O .+ 30b O.

X Wegen fehlender Früchte ist die nähere Form noch nicht erkennbar 4 Expl

30a O, 3.4.2, PPfl, dBG, Blauer Spilling ,A. Kalesse, Billstedter Pfad 2, 13591
aus Gatow, Berlin-Spandau

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 22.04.2016 - 29.04.

3 LBl: dgrün-glzd, ell, gkerbt, abgrdt + 5,7/0,5 + 3,9 + 68/75 % + 2/2

16b Zb, 3.4.2, PPfl, dBG, Blauer Spilling ?, H.Woldring, Tollendorf Hitzacker, NS

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2.

3 LBl: dgrün, br-ell, gkerbt, abgrdt + 6,9/1,0 + 4,0 + 58/68 % + ka/1

4 Fr: 3

5 St: 17,3~6,4~8,6 + 37 : 49 : 134, Steine am Fundort aufgelesen

6 Kräftige Triebe , Steingröße atypisch!

49a N, 3.4.2, PPfl, dBG, Blauer Spilling? über H.Woldring, Tollendorf b. Hitzacker

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0

3 LBl: mgrün, ellipt, s.breit gekerbt, rdl + 10,2/2,3 + 4,8 + 47/61 % + ka/1

31b7 Z, 3.4.2, PPfl, dBG, Blauer Spilling, über C. Schmidt, Wiesenrain 2, 03130
Spremberg, von Kucher aus 03130 Türkendorf

1 Spr: 1.1 + 1.2ka + 2.

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 1.4 oval + 2.1 bh3 + 2.2 c 2.3 eiz

3 LBl: dgrü,-glzd, ell, gkrbt, grdt + 4,8/0,5 + 2,4 + 50/56 % + 2/3

3.4.3 Variante Gelber Spilling/Spenling, BSt/FSt kahl,

12 Expl

Lübeck 1766 "gelbe Spelge", in Österreich "Spenling" genannt. Selten, z.B. 23 N über H. Illig, Uckro. LBl-länge 9,7 cm, davon Stiel 2,3 cm, Spreite 4,3 cm. Indizes LBl 44 %; Indizes Spreite 58 %. Fruchtreife A8, Fruchtgröße 30,3-24,1-24,8 mm, absolute Werte der Steine 15,3-6,8-9,8 mm, Indizes 44 : 64 : 144. Typische Spillingform erkennbar, also L-Achse bogenförmig. Stein aber deutlich weniger lang als bei 3.4.1. Frucht wohlschmeckend, aber nicht sehr saftig. Bislang nicht im nBG gefunden, häufig in Österreich. **Abb** Fr-23N: 2/36; St + Lbl-23 N: 4b/35

***3 Expl A) Ind LBL 51 % (41-67%); Ind Sprei 62 % (50-77 %), B) Fr, 1. Grö 30,3 ~ 24,1 ~ 24,8, 2. Ind 80 : 82 : 103, C) St, 1. Grö 15,3 ~ 6,8 ~ 9,8, 2. Ind, 44 : 64 : 144.**

23 N, 3.4.3, PPfl, dBG, Gelber Spilling, H. Illig, Uckro bei 15926 Luckau, Brandbg

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 1 , jünge Trb dunkel-rot-violett

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 21.04.2015 bis 01.05.

3 LBl: dgrün, ell, anlg-ges, lg-keilfg + 9,7/2,3 + 4,3 + 44/58 % + 3/1

4 Fr: 10 + A VIII + 30,3 ~ 24,1 ~ 24,8 + 80 : 82 : 103

5 St: 15,3~6,8~9,8 + 44 : 64 : 144 + typische Spillingform erkennbar, also L-Achse bogenfg, St aber deutlich weniger lang als z.B 26 Z und auch deutlich dicker, **Abb** Fr-23N: 2/36; St + Lbl-23 N: 4b/35

6 Frucht wohlschmeckend, aber nicht so saftig

30d S 3.4.3, PPfl., dBG, Gelber Spilling, H. Illig, s.o. Luckau, Brandenbg

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 6 + 1,4 3a + 2.1 ka + 2. d, dünn + 2.3 Paa
2.4 24.04.2015 bis 01.05.

3 LBl: mgrün, schön-brt-ell, s-stumpf-ges, abgerdt + 4,8/0,5 + 3,2 + 67/74 % + 4/2

2017 4 Fr: 1 + M VIII + 31,4 ~ 22,4 ~ 23,3 + 71 : 74 : 104

5 St: 19,2 ~ 7,6 ~ 10,2 + 40 : 53 : 134

2018 4 Fr: 2 + M VIII + eif, gelb- Stielende rötlich, süß-fruchtig

5 St: 17,7~7,2~12,3 + 41 : 59 : 146

48a N, 3.4.3, PPfl, euBG, Gelber Spenling, Reis A. Lugmair, Gstocket 10, A-4072 Alkoven von Fam Jungwirth, Ödenkirchen, Schlägl, Oö

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. ka

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c, dünn + 2.3 Paa
2.4 17.04. 2016 - 24.04.

3 Lbl: mgrün, breit ellipt-rdl, gekerbt, rdl + 6,9/1,3 + 4,3 + 62/77 % + 3/2

2017 6 Fr mit roten Punkten

2019 4 Fr: 7 + A VIII + 3,96~3,3~3,5 + 83 : 88 : 106

5 St: 25,2~8,9~13,9 + 35 : 55 : 156

Fr eifg, Stielende rötlich-gelb, süß-fruchtig, schwache Falte

48b N, 3.4.3, PPfl, dBG, Gelber Spilling, Reis Fa BSch. Ritthaler, 66882-Hütschenhausen

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa

3 LBl: derb-mittel-grün,ellipt, gekerbt, keilf-rdl + 8,8/1,6 + 3,6 + 41/50 % + 2/1

- 54h W, **3.4.3**, PPfl, dBG, Gelber Spilling, Reis Baumschule Ritthaler, s.o., R-P.
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
 - 3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdlf + 7,2/1,2 + 3,5 + 49/58 % + 3/1
- 47b W, **3.4.3**, dBG, PPfl, Gelber Spilling, K. Schenzle, Ernst Bloch-Str 5, 03648 Cottbus, Niederlausitz
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2 ohne Dornen
 - 3 Lbl: grau-grün, lg-oval, gekerbt, keilfg + 6,8/1,8 + 2,8 + 41/56% + 3/3
- 31b8 Z, **3.4.3**, PPfl, dBG, Gelber Spilling, Typ 2, Lausitz, über C. Schmidt, Wiesenrain 2, 03130 Spremberg
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2
 - 2 Blü: 1.1 bw 1.2 2 + 1.3 4/6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 24.04.2016 - 02.05.
 - 3 Lbl: dgrün-glzd, ell, gkrbt, keilfg + 7,6/1,2 + 4,3 + 57/67 % + 1/4
- 31b9 Z, **3.4.3**, Ppfl, dBG, Gelber Spilling, wie 31 b8 Z
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
 - 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 1.3 4/6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3
2.4 21.04.2016 - 05.05.
 - 3 Lbl: dgrün-glzd, ell, ges-gkrbt, keilf + 9,4/1,5 + 4,3 + 46/54 % + 1/4
- 31b10 Z, **3.4.3**, Ppfl, dBG, Gelber Spilling, Typ 1, sonst wie 31b8 Z
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 1 + 1.3 1 + 1.4 2 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
 - 3 Lbl: dgrün, ell, ges -gekrbt, gerdt + 6,4/0,6 + 3,6 + 56/62 % + 1/ka
- 35 Z, **3.4.3**, dBG, PPfl, Gelber Spilling, Karl Sulzer, Ruppersdorf, 91604 Flachslanden, eig Wrz
- 1 Spr:
 - *3 Lbl: mgrün, ell-beidendig spitz, ges, keilfg + 8,1/3,2 + 3,6 + 44/73 % + 1/ka
- 29 e1 O, 3.4.3**, LSt, Grünblaugelb bereifter Spilling, Reis A. Lugmair. Gstocket 10, A 4072 Alkoven, von Familie Zimmerhackl, nördl. St. Willibald, Oö, Utlg St. Julien, I
- 1 Spr: 1.1 wollig + 1.2 s kurz wollig + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 6 1.4 oval + 2.1 bh3 + 2.2 c + 2.3 paa
 - 3 Lbl: matt-mittelgrün, ellipt, gekerbt, keilf + 8,0/1,3 + 4,4 + 55/66 % + 3/wollig
 - 4 Fr: 6 + E VIII + 2,3 ~ 2,1 ~ 2,28 + 91 : 99 : 109
 - 5 St: 14,0 ~ 7,2 ~ 9,9 + 51 : 71 : 138
- 25r N, 3.4.3, ?** LSt, Grünblaugelb bereifter Spilling, Reis A. Lugmair von Familie Zimmerhackl, nördl. St. Willibald, Oö, wie 29e O
- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 bh 3 + 2.
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 g + 2.3 eiz
2.4 24.04.2016 - 01.05.
 - 3 Lbl: hellgrün, verkehrt-eifg, ges, keilfg + 7,4/1,5 + 3,7 + 50/63 % + 3/4
 - 4 Fr: 1 + x + 2,1 ~ 1,9 ~ 1,96 + 90 : 93 : 103
 - 5 St: 11,8 ~ 6,4 ~ 8,9 + 54 : 75 : 139
 - 6 Falte unten
- 31f O, 3.4.3**, blauer Spilling, als 3.0.14 Brit Shepherds Bullace, euBG, G Staffel, Ahornblatt
- 1 Spr: 1.1 kurz-wollig + 1.2 wollig + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w 1.2 2 + 1.3 3 + 1.4 oval + 2.1 ka 2.2 c + 2.3 paa
 - 3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, ges, rdl + 8,7/1,4 + 3,6 + 41/49 % + 1-2/1

- 4 Fr: 8 + M VIII + 2,5 ~ 2,3 ~ 2,4 + 92 : 96 : 104
 5 St: 13,6 ~ 6,2 ~ 9,4 + 46 : 69 : 152
 6 Fr gelblich nit Hauch, saftig-süß pflaumig

B) 1. Weitere Spillinge, 2. ähnliche Spillinge, 3. unklare Spillinge 10 Expl.

B) 1. weitere Spillinge 5 Expl

3.4.4 Weidenberger Spindling, C. Schamel, Eichendorffrg 14, 95466 Weidenberg, O-Frk, vielleicht eine Form von 3.4.3. Frucht ist aber deutlich kleiner
84 W, 3.4.4, -, ka, PPfl, dBG, Weidenbg Spindling, C.Schamel, Weidenberg, O-Franken, 1 dBG

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. ka
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 3 + 2.1 + 2.2 b +
 3 LBl: mgrün, derb, lanz, ges, abgrdt + 7,9/0,6 + 4,7 + 59/64 % + 1/1
 4 Fr: 8 + AIX + 2,6 ~ 2,3 ~ 2,4 + 88 : 92 : 104, 5.8.blau, voll unreif
 5 St: 16,6 ~ 8,7 ~ 10,8 + 52 : 65 : 124
 6 derbe LBl, rote junge. Triebe, schöne Stielgrube mit Falte, typ. Spilling

3.4.5 Wohlriechender Spilling, Baumschule Ritthaler, s.o., R-P, Utlg St. Julien
69b W, 3.4.5, PPfl, dBG, Wohlriechender Spilling, Reis Baumschule Ritthaler, Hütschenhausen, R-P.

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 5 + 1.4 oval ++2.1 ka + 2.2 d '2.3 paa
 3 Lbl: hellgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 8,9/1,5 + 3,5 + 39/47 % + 3/1
69c W, 3.4.5, PPfl, dBG, Wohlriechender Spilling, wie 69b W

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 5 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
 2.4 19.04.2016 - 01.05.
 3 LBl: hellgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 9,8/2,0 + 3,5 + 36/45 % + 2/2

3.4.6 "Grüner" Spilling

31 b4 Z, 3.4.6, PPfl, dBG, "Grüner" Spilling, über C. Schmidt, Wiesenrain 2, 03130 Spremberg, Havelländer Typ, aus/von Neuzelle

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 1 s.kurz + 2. 0
 2 Blü: 1.1 gw + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
 2.4 15.4.2016 - 23.04.
 3 LBl: mgrün, ell, gkerbt, keilf + 7,9 cm/1,2 + 3,1 + 39/46 % + 3/2

31 b5 Z, 3.4.6, PPfl, dBG, "Grüner" Spilling, wie 31b4 Z

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 gw + 1.2 2 + 1.3 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
 2.4 15.04.2016 - 23.04.
 3 LBl: mgrün, ell, br-ges, keilf + 7,5/1,1 cm + 3,0 + 40/47 % + ka/1

B 2. Aehnliche Spillinge 2 Expl

Zweispitz, var. *bisacuminata* Werneck. Zuordnung bei ssp. *pomariorum* durch Scholz et Scholz, Hegi 1995, heutige Verbreitung unbekannt. Gemäß WERNECK (1961/2) ein mittelgroßer Baum, Frucht gelb, rötlich oder fuch-sig, deutlich gestielter Stein, *gerade* auslaufend. Die Einordnung bei den Spillingen ist also fraglich. FSt 12,8-14,5 ~ 5,3-6,5 ~ 6,7-7,7 mm. Indizes 41-45 : 52-53 : 126-118.

29c O, 3.4.7, PPfl, euBG, Zweispitz, Reis A. Lugmair, Gstocket 10, A-4072 Alkoven, von Familie Geigg, Steinwänd, Attersee, Oö.

- 1 Spr: 1.1 ? + 1.2 ka + 2. 0

- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 3 + 1.4 oval + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
- 3 LBl: hellgrün, rdl, gekerbt, rdl + 5,0/0,7 + 3,5 + 70/81 % + 2/1
- 4 Fr: 5 + AIX + 1,2 ~ 1,1 ~ 1,2 + 92 : 100 : 109 + 10.8. noch sehr unreif somit wohl noch zu klein
- 5 St: 14,4 ~ 7,0 ~ 9,7 + 49 : 67 : 139
- 6 St nur mit geringer Spilling-Ähnlichkeit

3.4.8 Pemsen, ssp. *versicolor* Werneck. Zuordnung bei ssp. *pomariorum* durch Scholz et Scholz, Hegi 1995, heutige Verbreitung unbekannt. 1 euBG.

Gemäß WERNECK (1961/2) ein großer Pflaumenbaum, BlSt kahl, Frucht dick-oval-eiförmig, dunkle Tupfen, stark beduftet. FSt Lg 17,7-18,7 ~ Br 5,0-6,0 ~ Di 9,8-10,5. Indizes 28-32 : 55-56 : 175-196

70b W, 3.4.8, PPfl, euBG, Pemsen, Reis A. Lugmair, Gstocket, A-4072 Alkoven, von Neißing, Seewalchen am Attersee, Oö

- 1 Spr: 1.1 wollig? + 1.2 ? + 2. bh2
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 5 + 2.1 bh3 + 2.2 d + einz
- 3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdl + 7,9/1,0 + 3,9 + 49/57 % + 2/2
- 4 Fr: 4 + 23.8. überreif, matschig, war blau mit Hauch
- 5 St: 19,2 ~ 7,6 ~ 13,1 + 40 : 68 : 172, ein wenig abgewinkelt am Stielende

B 3. noch unklare Spillinge

3 Expl

9 S, **3.4.9**, -, ka, PPfl, dBG, Spilling, K. Scharfenberg, Guben, Brandenburg

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 5 1.4 oval + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
- 3 LBl: gelbgrün, verk-eifg, br-ges, keilf + 9,0/2,1 + 3,2 + 36/46 % + 3/1

30a 0 und 30b O, 3.4.9 Hier wird zunächst auch die „Abbildung Frucht und Stein“ von W. Hartmann, Filderst. eingeordnet, die er von A. Kalesse aus Berlin-Spandau erhalten hatte. Frucht klein und tropfenförmig, Stein wenig typisch, da ein abgewinkelter Stiel fehlt! Näherungen zur kleinen Blauen S-H Oval-Pflaume. Entscheidung mit kommenden Früchten von 30a 0 und 30b O

5 Unterart Mirabelle, 3 Abb St-28 O: 4c/36

4 Expl.

Prunus domestica ssp. *syriaca* (Borkhausen) Jannchen

Eine kleine Unterart mit kugelig, gelber, sonnenseitig mit roten Punkten versehener, süß-aromatischer, aber wenig saftiger, 2-3 cm großer Frucht, die angenehm steinlösend ist. BSt/FSt behaart. Diese Sippe ist wärmebedürftig. Die Früchte der Nancy-Mirabelle reifen jedoch im südöstlichen S-H gut heran. Das gilt besonders für den Klon 1510.

Leider wird die Kirschpflaume im Norden und Osten volkstümlich auch Mirabelle/Mirabelka genannt. Mirabellen kommen nur selten vor im nBG, häufig aber in SW-Deutschland und Frankreich.

3 Expl, A) Ind LBl 46 % (39-57%); Ind Sprei 53 % (44-64 %) B) Fr, 1. Grö 27,0 ~ 24,9-25,7 ~ 26,1-26,5, 2. Ind 92-95 : 97-98 : 103-105, C) St, 1. Grö 13,2 (12,8-13,5) ~ 6,6 (6,5-6,6) ~ 10,5 (10,0-10,1), 2. Ind 50 (48-52) : 76,5 (74-79) 104 (103-105)

3.5.1 Landsorten

53a2 O, **3.5.1**, LSt, nBG, Mirabelle, Dadow, Pflz 12/11, wie 53a1 O

- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 wollig + 2 0.
- 3 LBl: matt-hellgrün, ellipt, ges, rdl + 5,3/0,7 + 2,6 + 49/57 % + 2/wollig

3.5.2 Kultursorten

3.5.2a, Sorte Nancy-Mirabelle

28 O, 3.5.2a, KSt, Nancy-Mirabelle, Fa M. Bahr, HL, Utlg. **Abb** St-28 O: 4c/36

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 bh1 + 2.2 c + 2.3 einz
2.4 23.04.2015 bis 08.05.
 - 3 LBl: mgrün, verk-eifg, anlg-ges, keilf + 8,8/1,4 + 3,6 + 41/49% + 2/3
 - 4 Fr: 6 + A IX + 27,0 ~ 24,9 ~ 26,1 + 92 : 97 : 105
 - 5 St: 2,8~6,6~10,1 + 52 : 79 : 153 + St rundlich-oval, StEd ein wenig aus der Achse lfd und mit Riefen gut angedeutet , BNt etwas ausladend mit 2 Rief, Fl mit halber Riefe, sonst glatt
- 68 O, **3.5.2a**, KSt, Sorte Mirabelle von Nancy, Fa Cordes, Holm, Pinneberg, Utlg
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 4 +
2.4 22.04.2015 bis 01.05.
 - 3 LBl: hgrün, lanz, ges, keilfg + 8,0/1,2 + 3,5 + 44/51 % + 3/2
 - 4 Fr: 3 + A IX + 22,3~21,0~21,5 + 94 : 96 : 102
 - 5 St: 11,5~5,6~8,6 + 49 : 75 : 154 + St eiförmig
 - 6 St gerade Achse, sehr schwacher Wulst

3.5.2b Nancy-Mirabelle, Sorte Klon 1510

- 1 S, **3.5.2b**, KSt, Mirabelle 1510, Fa E. Kiefer, Ortenberg, BD ,Utlg 2

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 3 + 2. 0
- 2 Blü: 1,1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh1 + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 25.04.2015 bis 06.05.
- 3 LBl: dgrün, lanz, br-ges, keilfg + 9,0/1,0 + 3,5 + 39/44 % + 3/3
- 4 Fr: 10 + M VIII + 29,3 ~ 27,5 ~ 28,4 + 94 : 97 : 103
- 5 St: 13,4 - 6,7 - 10,8 + 50 : 81 : 161
- 6 Fr gelb, z.T. Rot punktiert, mit Falte, St abgewinkelt, starke Bauchnaht, Fl mit Riefen, Verdickung und Verbreiterung kurz vor St-ende

3.6 Unterart Rund-Pflaume

22 Expl

Prunus domestica ssp. *italica* (Borkhausen) Gams

Früchte 3-6 cm groß, gelb, grün, blau, rot, dickoval-kugelig, häufig sehr süß und saftig sowie leider häufig auch steinhaltend. Stein häufig annähernd rundlich-kugelig, Stein Dicke : Breite um 160 % %. Die Unterart ist vielgestaltig.

3.6.1 Variante Echte Rund-Pflaume, var. *subrotunda* (Bechstein)Werneck, **5 Expl**.

Große, blaue, süßlich saftige, aromatische Frucht für Frischgenuss und Küche. Beispiel Bradley`s King, eine dick-ovale Damson, die fruchtig-saftig, mäßig süß, aber sehr aromatisch ist. Vorzüglich für Marmeladen und Frischgenuss. Schmückende Blüten mit 2 Kreisen recht großer, weißer und somit schmückender Kronblätter. Fr 46,4 ~ 37,9 ~ 41,6 mm + St 20,2 ~ 8,2 ~ 15,1mm + Indizes 41 : 75 : 160.

- 15 N, **3.6.1**, Damson, Bradley`s King, gemäß Henk Woldring, als Kirkes geliefert von Fa H.Cordes, Holm, Pinneberg, Utlg., **Abb** St + Lbl-15 N: 4c/37

- 1 Spr: 1. bh0 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2-3 + 1.3 6 + 1.4 3 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 einz
2.4 24.04.2015 bis 10.05.
- 3 LBl: hgrün, eifg, ges, abger-keilfg + 10,0/2,0 + 5,5 + 55/69 % + 3/2
- 4 Fr: 10 + E VIII + 46,4 ~ 37,9 ~ 41,6 + 82 : 90 : 110
- 5 St: 20,2 ~ 8,2 ~ 15,1 + 41 : 75 : 160 + grober St, L-Achse leicht bogenfg, also abgewinkelt und deutlich gestielt, BNt etwas ausladend und B-Furche mit starken Riefen, Fl mit 1 Längsriefe, sonst gemuschelt

6 2 Ringe KrBl, sehr schmückend, große, blaue, weiche, sehr saftig aromatische Echte Rund-Pflaume

9 R 3.6.1, Kirkes? Echte Rund-Pflaume

10 R bis 11 R, 3.6.1, Sorte Ontario, Echte Rund-Pflaume, 1874 USA, ertragreich mit grünlich-gelber Frucht, starker Wuchs mit runder Krone.

3.6.1 Sorte Stapelholmer Echte Rund-Pflaume, Frank Kahlbrandt, Tel 04883.253

Frucht blau, mit Heisch, vielleicht Abkömmling der grünlich-gelben Ontario.

LBl-Spitze gekerbt, Fr 4 cm lg, dick.oval, Fleisch fest, mit starker Falte, aromatisch, backfähig, Reife E IX, St leicht lösend, St gerade Achse, ungestielt, Spitze leicht gerundet, Ende 3 mm quer, Flanken gerieft, Bauch mittelbreit, 19,2 ~ 8,1 ~ 12,9 mm, 42 : 67 : 159 %, Gehölze durch H.G.Dierks, Groß Steder Weg 16, 25879 Süderstapel

18a2 S, 3.6.1, nBG, Stapelholmer Echte Rund-Pflaume, durch H.G.Dierks, Groß Steder Weg 16, 25879 Süderstapel

1 Spr: 1.1 + 1.2 kahl + junge Teile an der Spitze rot, andere Seite grün

3 LBl: dunkelgrün, ell, gekerbt, rdl + 9,3/1,4 + 4,6 cm + 49/58 % + ½ Adern treten beidseitig hervor

3.6.2 Variante Reneklode, var. claudiana Gams, Ringelotte 16 Expl.

Besonders weiche und besonders saftig-süße, auch aromatische Frucht mit nur kurzer Haltbarkeit, die wegen der nässenden Wirkung weniger backfähig ist. Viele Land- wie auch Edelsorten sind nicht selbstfruchtbar. Das gilt *nicht* für die Sorte Quillins. Sie ist selbstfruchtbar und ein sehr guter Befruchter!

*15 Expl, A) Ind LBl 45,9 % (33-62%); Ind Sprei 55,4 % (42-74 %), B) Fr, 1. Grö 33,5 (27,8-43,6) ~ 32,1 (26,6-41,7) ~ 34,5 (28,5-43,9), 2. Ind 96 (93-100) : 100-107 : 100-113, C) St, 1. Grö 16,9 (12,3-22,0) ~ 8,2 (6,5-10,5) ~ 12,9 (9,0-17,9), 2. Ind 48,5 (43-53) : 76,3 (75-107) : 157,3 (137-249)

3.6.2.1 Landsorten. 11 Expl.

*9 Expl, A) Ind LBl 41,7 % (33-48%); Ind Sprei 52,7% (42-60 %), B) Fr, 1. Grö 29,6 (27,8-31,4) ~ 28,2 (26,6-30,3) ~ 30,5 (28,5-33), 2. Ind 95 (93-96) : 103 (98-107) : 108 (103-113), C) St, 1. Grö 15,6 (12,3-17,1) ~ 7,2 (6,5-7,9) ~ 11,5 (9,0-17,9), 2. In 46 (43-56) : 88 (63-107) : 194 (137-249).

3.6.2.1a, blaue Landsorte 3 Expl.

*1 Expl, A) Ind LBl 43,3 % (39-48%); Ind Sprei 53,3 % (50-60 %) B) Fr, 1. Grö xxx 2. Ind xxx C) St, 1. Grö 15,6 ~ 7,2 ~ 17,9, 2. Ind 43 : 107 : 249.

35 Z, 3.6.2.1a, LSt, euBG, blaue Reneklode, Christiane Krüss, A^oryd, Blekinge, S

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2.

3 LBl: hgrün, ell, ges, keilf + 4,9/1,2 + 1,9 + 39 %/51 % + 3/3

1 O, 3.6.2.1a, LSt, nBG, blaue Reneklode, H. Stooß, Klärwerk, Einhaus, Lbg

1 Spr: 1 1 bh2 + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 5 + 2.1 bh2 + 2.2 c + 2.3 paa

2.4 26.04.2015 bis 06.05.

3 LBl: dgrün, verk-eifg, s-br-ges, keilfg + 11,5/1,5 + 5,0 + 43/50 % + 2/1

4 Fr: 4 + MIX + 27,3 ~ 25,3 ~ 25,3 + 93 : 93 : 100

5 St: 15,2 ~ 7,0 ~ 11,3 + 46 : 74 : 161

6 Baum trägt wenig, Pflaumenfalte.

57 W, 3.6.2.1a?, LSt, nBG, blaue? Reneklode, E. Kosin, RZ-Vorstadt

1. Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
- 3 LBl: graugrün, verk-eifg, grb-ges, keilfg + 9,5/1,6 + 4,1 + 43/52 % + 1/1
- 4 Fr: 7 + E VIII + 3.1 ~ 2,8 ~ 2,0 + 90 : 94 : 104, saftig-Pflaumig
- 5 St: 18,7 ~ 7,8 ~ 12,1 + 42 : 65 : 155, 25.8.19 Fr braun-blau-gelb

3.6.2.1b, gelbe und grüne Landsorte, sehr saftig, Bestäuber sehr wichtig!**7 Expl.**
4 Expl, A) Ind LBl 41,0 % (33-48%); Ind Sprei 52,6 % (42-60 %), B) Fr, 1. Grö 29,6 (27,8-31,4) ~ 28,2 (26,6-30,3) ~ 30,5 (28,5-33), 2. Ind 2 95 (95-96) : 103 (98-107) : 108 (103-113), C) St, 1. Grö 14,4 (12,3-17,1) ~ 7,1 (6,5-7,9) ~ 9,9 (9,0-10,8), 2. Ind 49 47-53) : 69 (63-75) : 139 (137-145). Abb Fr-26 W: 2/47; St + Lbl-26W: 4c/38

88a W, 3.6.2.1b, LSt, nBG, gelbe Reneklode, Uwe Rothe, Rondeshagen, Lbg

- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 3 + 2.1 bh2 + 2.2 c + 2.3
- 3 LBl: mgrün, ell, ges, keilf + 7,1/1,4 + 3,4 + 48/60 % + 3/4
- 4 Fr: 5 + A VIII + 3,1 ~ 3,0 ~ 3,2 + 97 : 103 : 107
- 5 St: 14,6 ~ 7,5 ~ 11,2 + 51 : 77 : 149
- 6 zuckersüß, teilweise rötlich punktiert, Stielloch 3 mm

89b W, 3.6.2.1b, LSt, nBG, nBG, gelbe Reneklode, Uwe Rothe, Rondeshagen, Lbg

- 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 bh4 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 4 + 2.1 bh3 + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 01.05.2016 -
- 3 LBl: mgrün, ell, s-stumpf-ges, keilf + 7,8/1,3 + 3,8 + 49/58 % + 4/4
- 4 Fr: 5 + A VIII + 3,1 ~ 3,2 ~ 3,2 + 103 : 103 : 100
- 5 St: 15,0 ~ 7,7 ~ 11,9 + 51 : 79 : 155
- 6 Kräftige Falte ab Stielloch

8 N, 3.6.2.1b, LSt, gelbe Reneklode, Grafe, Gnutz bei Nortorf

- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 bh4 + 2.2 c + 2.3 einz
2.4 01.05.2015 bis 07.05.
- 3 LBl: hgrün, verk-eifg, anlg-ges, keilf + 7,0/1,6 + 3,0 + 43/56% + 3/4, einz
LBl aufwärtsstrebend
- 4 Fr: 3 + EVIII + 27,8 ~ 26,6 ~ 28,5 + 96 : 103 : 107
- 5 St: 13,1 ~ 6,7 ~ 9,4 + 51 : 75 : 140 + L-Achse gerade, St schwach gerade
- 6 süß, fruchtig-pflaumig

13 O, 3.6.2.1b, LSt, nBG, gelbe Reneklode, B. Sthamer, Gr Grönau, Lbg

- 1 Spr: 1.1 wollig + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 3 + 2.1 wollig + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 24.04.2015 bis 08.05.
- 3 LBl: gelbgrün, verk-eifg, br-ges, keilfg + 8,7/1,7 + 4,2 + 48/60 % + 4/4
- + 4 Fr: 5 + M VIII + 29,0 ~ 27,7 ~ 28,5 + 96 : 98 : 103
- 5 St: 15,2 ~ 7,1 ~ 10,3 + 47 : 68 : 145
- 6 Fr kugelig, gelb, glatt, saftig, starke Falte, St zum Stielende schmaler,
gerade Achse, Bauchfurche stärker als Rücken

14 Zb, 3.6.2.1b, LSt, nBG, gelbe Reneklode, Wessel, Gr Hundorf, NW-M

- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 bh4 + 2.2 c
2.4 28.04.2015 bis 07.05.
- 3 LBl: hgrün, verk.eifg, stu-ges, keilfg + 7,2/1,8 + 2,8 + 39/52 % + 4/4
- 4 Fr: 5 + M VIII + 31,4 ~ 30,3 ~ 33,0 + 96 : 105 : 109
- 5 St: 17,1 ~ 7,9 ~ 10,8 + 46 : 63 : 137

- 6 Fr gelb, saftig-pflaumig, mit Falte, St zum Stiel auslaufend, dort breiter als Spitze
- 26 W, 3.6.2.1b**, LSt, nBG, gelbe Reneklode, Mertens, Ziethen, Lbg.
- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 bh 3 + 2. 0.
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 4-5 + 2.1 bh3 + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 25.04.2015 bis 06.05. **Abb** Fr-26 W: 2/47; St + Lbl-26W: 4c/38
- 3 LBl: hgrün, derb, ellipt, grb-ges, keilfg + 9,1/2.0 + 3,0 + 33/42 % + 4/3
- 4 Fr: 10 + A VIII + 30,0 ~ 28,5 ~ 32,1 + 95 : 107 : 113
- 5 St: 12,3~6,5~9,0 + 53 : 74 : 138 + L-Achse des St gerade, schwach gerade gestielt, oval, BNt mäßig dick, etwas ausladend, Fl glatt
- 6 süß-fruchtig-pflaumig, leider steinhaltend., Befruchter 3-S
- 27 W, 3.6.2.1b**, LSt, nBG, gelbe Reneklode, Mertens, Ziethen, Lauenbg. wie 26 W
- 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 wollig + 2.0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 4-5 + 2.1 bh3 + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 25.04.2015 bis 06.05.
- 3 Lbl: dgrün-glzd, vkhrt-eifg, brt ges, keilfg +10,0/2,1 + 4,2 + 42/53 % + 4/4
- 4 Fr: 7 + A VIII + 31,5 ~ 28,2 ~ 29,7 + 90 : 94 : 105
- 5 St: 16,4 ~ 8,0 ~ 11,8 + 49 : 72 : 148
- + 6 Fr gelb, dicke Pflaumenfalte

3.6.2.1c Landsorte, rötliche Farbe

1 Expl

25e N 3.6.2.1c, LSt, Kaiserslauterer Reneklode, D Schmidt, Marktstr 4, 76889 Oberrotterbach, R-P

- 1 Spr: 1.1 .ka + 1.2 ka +
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 2.2 ka + 2.3 Paa
2.4
- 3 Lbl: mgrün-glzd, grob-ellipt, ges-gekerbt, keilfg +10,6/2,2 + 5,4 + 51/64 %
2/2 + Lbl sehr derb
- 4 Fr: 2 + E VIII + 30,1 ~ 29,6 ~ 32,2
- 5 St: 18,5 ~ 9,2 ~ 13,1 + 50 : 71 : 142
- 6 Fr kräftige Pflaumenfalte

3.6.2.2 Kultursorte

5 Expl.

4 Expl, A) Ind LBl 50 % (46-62%); Ind Sprei 58 % (53-74 %), B) Fr, 1. Grö 37,3 (27,3-43,6) ~ 36 (27,0-41,7) ~ 38,4 (29,8-43,9), 2. Ind 97 (93-100) : 104 (99-109) : 107 (105-110), C) St, 1. Grö 18.1 (13,1-22) ~ 9,1 (7,3-10,5) ~ 14,2 (11,2-16,7), 2. Ind 50 (48-56) : 78 (75-85) : 156 (152-159)
Abb Fr-2S: 2(48: St-2S: 4c/39

3.6.2.2.a1 wurzelechte "Große Grüne" Reneklode

Wurzelbrut von Horst Bjørnsen, Fallshöft, Angeln. Zweige mit sehr vielen Kurztrieben

21b W, 3.6.2.2a1, KSt, wurzelecht.Sorte Große Grüne Reneklode, Horst Bjørnsen, Fallshöft, Pflzg 4/17

- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
- 3 LBl: grau-grün, lg-oval, gekerbt, keilfg + 6,8/1 + 2,9 + 43/50% + 1/3

3.6.2.2a2 Sorte Große Grüne Reneklode, mit Unterlage

2 S, 3.6.2.2a2, KSt, Große Grüne Reneklode, Fa E. Kiefer, Ortenberg, Utlg

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh1 + 2. 0 **Abb** Fr-2S: 2(48: St-2S: 4c/39

- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 + 2.2 d
2.4 25.04.2015 bis 08.05.
- 3 LBl: derb dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg +12,5/1,5 + 5,8 + 46/53 % + 2/2
- 4 Fr: 9 + E VIII + 34,4 ~ 34,4 ~ 36,4 + 100 : 106 : 106
- 5 St: 16,3~8,6~13,1 + 53 : 80 : 152 + kräftiger St, etwas rdl-linsfg, L-Achse gerade, BNt mit einem sehr kräftigen Wulst, Fl mittelständig 1 halblange Riefe, sonst s flach feingrubg gerieft
- 6 Saftig, sehr wohlschmeckend, Bestäuber wichtig!
- 65 O, 3.6.2.2a2, KSt, Große Grüne Reneklode, Fa H. Cordes, Holm, Utlg**
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh1 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 + 2.2 d
2.4 22.04.2015 bis 30.04.
- 3 LBl: derb dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg +8,6/1,4 + 4,2 + 49/58 % + 1/1
- 2015** 4 Fr: 1 + A IX + 27,3 ~ 27,0 ~ 29,8 + 99 : 109 : 110
- 5 St: 13,1~7,3~11,2 + 56 : 85 : 153
- 2017** 4 Fr: 7 + M VIII + 32,2 ~ 27,9 ~ 24,4 + 87 : 93 : 108
- 5 St: 18,0 ~ 8,4 ~ 12,7 + 47 : 71 : 151
- 6 Fr gelb, marmoriert

3.6.2.2.b, Sorte Althanns Reneklode

- 66 O, 3.6.2.2a, KSt, Althanns Reneklode, Fa H. Cordes, Holm, Utlg**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 + 2.2 d
2.4 24.04.2015 bis 02.05.
- 3 LBl: dgrün-glzd, breit ellipt, gekerbt, keilfg-rtl +8,5/1,3 + 5,3 + 62/74% + 1/2
- 4 Fr: 5 + E VIII + 43,9~40,7~43,3 + 93 : 99 : 106
- 5 St: 21,0~10,0~15,8 + 48 : 75 : 158
- 6 Dicke Pflaumenfalte. St mit s dicker Bauchfalte, Stiel gerieft

3.6.2.2c Sorte Qullins

- 3 S, 3.6.2.2c, KSt, Qullins, Fa E. Kiefer, Ortenberg Baden, Utlg 2**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 gw + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 + 2.2 c
2.4 25.04.2015 bis 08.05.
- 3 LBl: derb dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg +12,1/1,7 + 5,6 + 46/54% + ka/1
- 4 Fr: 5 + M VIII 43,6 ~ 41,7 ~ 43,9 + 96 : 101 : 105
- 5 St: 22,0 ~ 10,5 ~ 16,7 + 48 : 76 : 159
- Sehr guter Bestäuber für Renekloden! Fr sehr saftig, im guten Sommer aromatisch, L-Achse zum StEd etwas abgedreht, B-Naht kräftig, Fl mit Mittelgrat

3.6.3 Bonne de Bry

1 Expl.

Gelieferte Steine eines Gehölzes bei Groningen, NL: Längsachse gerade, symmetrisch, sehr breit-dick-linsig, Stielende abgerundet, Narbenende spitz, Bauchfurchen breit gerieft, Flanken glatt, mittig mit Grat. Bestimmung von Ms. Nina Plumbe, Norfolk, GB. Äquivalente Steine wurden gemäß Woldring von der Sorte in Haithabu und Alt-Schleswig, S-H, gefunden. Ähnliche Funde sind auch die "Blaue Pflaume" aus Dorf Tirol, "Muthöfe", I, die "Kriecher von Escherndorf", Unterfranken, und die Steine von V. Wissemann aus Thüringen.

53a6 O, 3.6.3, PPfl, euBG, Bonne de Bry, H. Woldring, Groningen, J.B. Santee Weg 117, NL 9312 Nietap, Proben von Henk Woldring :

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh2 + 2. 0
- 2 Blü: 2.1 ka + 2.2 c
- 3 LBl: dgrün, lg-ell, stark ges, lg keilfg + 9,0/1,7 + 4,3 + 48/59 % + 2/3

- 4 Fr: 3 + M VIII + 30,2-33,6-35,8 + 111 : 119 : 107
 5 St: 15,8-10,3-14,6 + 65 : 92 : 142 + St kugelig, BaNt ausladend

3.7 POLYMORPHE UNTERART HALBZWETSCHKE, 76 EXPL.

Prunus domestica ssp. *intermedia* Röder

Eine sehr große, polymorphe Sippe! Die Abgrenzung von 3.8. ist durchgängig kaum möglich. Dringend bedarf die heterogene Sippe einer weiteren taxonomischen Bearbeitung. - Es handelt sich um eine (2-) 4-8 cm lange, weiche, saftige Pflaume, die bei Typ I beidendig gleich stark dick-oval abgerundet oder bei Typ II nur am Stielende dünner ist. Blau, violett, rot oder gelb. Leider bei Landsorten häufig eher steinhaltend und auch nicht immer backfähig.

3.7.1Typ 1 : Frucht beidendig +/- gleich oval, 68 Expl.

3.7.1.1 Variante Küchenzwetsche, var *culinaria* Werneck, 13 Expl.

Abb St-40 N: 4c/40

Eine sehr süße Halbwzetsche, die ihre Sü ße auch beim Kochen und Backen behält!
 +Sehr gutes Beispiel: 3.7.1.1b, Edelsorte Wangenheims Frühzwetsche. Sie ist selbst-fruchtbar und sehr anspruchslos.

3.7.1.1a, Landsorte 1 Expl.

4a W+, 3.7.1.1a, LSt, Küchen-Zwetsche, 3.7.1?, E. Kosin, RZ-Vorstadt

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
 2.4 24.04.2015 bis 10.05.
 3 LBl: dgrün, verk-eifg, anlg-ges, keilfg + 7,3/1,4 + 2,9 + 40/49 % + 3/2
 4 Fr: 7 + M IX + 28,7 ~ 23,5 ~ 25,8 + 82 : 90 : 110
 5 St: 17,2 ~ 7,7 ~ 10,9 + 45 : 63 : 142_

3.7.1.1b, Kultursorte 12 Expl.

40 N, 3.7.1.1b, KSt, Wangenheims Zwetsche, Fa M. Hammerschmidt, Sörup, Utlg

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. Abb St-40 N: 4c/40
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 6 + 1.4 3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
 2.4 20.04.2015 bis 03.05.
 3 LBl: dgrün-glzd, oval, gekerbt, rdl + 7,9/1,3 + 4,1 + 52/65 % + 2/1
 4 Fr: 1o + VIII + 35,7~29,9~30,6 + 84 : 86 : 102.
 5 St: 18,5~7,5~15,3 + 41 : 83 : 204 + L-Achse bogenfg, BNt gerieft, stärker gewölbt als RNt, NbRd spitz, StEd breit, folgt dem Bogen der BNt, Fl unterer Teil je 2 Riefen. Bildet sehr schöne Bäume mit sehr guten Früchten

41 N, 3.7.1.1b, KSt, Wangenheims Zwetsche, Fa M.Hammerschmidt, Sörup, Utlg.

44 N, 3.7.1.1b, KSt, Wangenheims Zwetsche, Fa M. Hammerschmidt, Sörup, Utlg.

67 O, 3.7.1.1b, KSt, Wangenheims Zwetsche, Fa H. Cordes, Holm, Pinnebg., Utlg.

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
 2 Blü: w + 2 + 4 + ka + c + paa
 2.4 22.04.2015 bis 05.05.
 3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdl + 7,4/1,4 + 4,1 + 55/68 % + 3/1
 4 Fr: 5 + M/E VIII + 40,1~32,5~33,6 + 81 : 84 : 103
 5 St: 18,5~7,7~13,8 + 42 : 75 : 179
 6 St: BSeite stärker gewölbt, L-Achse fast gerade, Fl gemuschelt, Stiel gerieft Fr mit Falte

6 R bis 8R, 3.7.1.1b, KSt, Wangenheims Frühzwetsche

30 R bis 32 R, 3.7.1.1b, KSt Wangenheims Frühzwetsche

- 63 O, 3.7.1.1b**, KulturSt, Königin Viktoria, Fa H. Cordes, Holm, Pinneberg, Utlg.
 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 bh3 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh3 + 2.2 c + 2.3 paa
 3 Lbl: derb mgrün, ellipt, rd-ges, keilfg+10,7/1,8 + 4,3 + 40/48 % + 3/3
 4 Fr: 5 + M VIII + 48 ~ 39 ~ 40 + 81 : 83 : 103
 5 St: 26,1 ~ 9,9 ~ 18,2 + 38 : 70 : 184
 6 Frucht dick-oval, rot, etwas beduftet, sehr saftig und süß, Stein sehr kräftig, B-Naht ausladend, B-Naht kräftig, Flanken mit Mittelgrat, StEd schwach abgedreht und holperig, NaEd spitz
- 64 O, 3.7.1.1b**, KulturSt, Anna Späth, Fa H. Cordes, Holm, Pinnebg., Utlg.
 1 Spr: 1.1 bh3 s kurz + 1.2 ? + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 + 2.2 d
 3 Lbl: derb-dgrün-gldz, ellipt, ges-gekerbt, keilfg + 8,5/1,4 + 3,5 + 41/49% + 1/1
 4 Fr : 5 + E VIII + 41,5~34,9~36,4 + 84 : 88 : 104
 5 St: 25,0~9,9~16,4 + 40 : 66 : 166, Bauch stark, LAchse gerade, Stiel gerieft
 6 Dicke Pflaumenfalte
- 24 R, 3.7.1.1b**, KSt Anna Späth, 1870 Ungarn, saftige, süße, aromatische, blau-rötl. Früchte, ausladende Krone, bei Regenwetter aufplatzen der Früchte

3.7.1.2 Eierpflaume und Ae hnliche **5 Expl.**

3.7.1.2.1 Variante Gelber Bidling, var. *praecox* Werneck. Zuordnung bei ssp. *intermedia* Scholz et Scholz, Hegi 1995, **Abb** St + Lbl-44 Z: 4c/41 **4 Expl.**
 Gemäß Werneck dicht mit der Eierpflaume verwandt, die mit den Steinmerkmalen eine eigene Unterart bilden sollte. Frucht dick-oval-eiförmig in gelb, mitunter teilweise rötlich punktiert. StGrö 19,9-21,6 ~ 7,4-7,9 ~ 10,5-12,4 mm. Indizes 37 : 53-57 : 142-157.

- 44 Z, 3.7.1.2.1**, dBG, LSt, Gelber Bidling, Sorte Thüringer Hammelsäcke, Christ. Schamel, Eichendorffweg 14, 95466 Weidenberg, **Abb** St + Lbl-44 Z: 4c/41
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 4/6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
 2.4 24.04.2015 bis 10.05.
 3 Lbl: dgrün, ell, ges, keilf + 7,2/1,1 + 2,8 + 39/46 % + 4/2
 4 Fr: 4 + M VIII + 35,6 ~ 26,5 ~ 27,5 + 74 : 77 : 104
 5 St: 19,3 ~ 7,0 ~ 11,2 + 36 : 58 : 160 + St mit bis zu 3 mm geradem Stiel,
 6 kräftiger Wulst, gelbe Frucht mit teilweise etwas rotem Hauch
- 25o N, 3.7.1.2.1**, dBG, LSt, Gelber Bidling, Sorte Wildpflaume Deggingen, LSt, Reis W. Hartmann, Filderstadt, Utlg. St. Julien, I NRA II
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
 2.4 22.04.2015 bis 30.4.
 3 Lbl: mgrün, ellipt, gekerbt, noch keilfg + 6,7/1,2 + 3,5 + 52/64 % + 3/1
 4 Fr: 6 + A VIII + 39~31~32,2 + 79 : 83 : 104
 5 St: 23,0~7,2~10,8 + 31 : 47 : 150 + St mit gering gekrümmtem Stiel,
 6 Fr beidseitig ähnlich oval, gelb, rot punktiert, Pflaumenfalte, St Seitenfurchen mit Wulst.
- 25q N, 3.7.1.2.1**, LSt, Gelber Bidling, A. Lugmair, Gstocket 10, A-4072 Alkoven, von Familie Hütterer, Lenzing Oö, Utlg St. Julien I NRA II.
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0

- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 6 +
 3 LBl: hellgrün, ellipt, gekerbt, schon rdl +9,8/2,2 + 4,0 + 43/53 % + 3/3
2016 4 Fr: 7 + M VIII + 22,2 ~ 17,7 ~ 19,0 + 80 : 86 : 107
 5 St: 13,9 ~ 6,6 ~ 9,0 + 47 : 65 : 138
 6 Fr dicke Pflaumenfalte
2017 4 Fr: 7 + E VIII + 22,9 ~ 20,0 ~ 21,6 + 87 : 94 : 108
 5 St: 15,2 ~ 6,7 ~ 9,7 + 44 : 64 : 145
54g W, 3.7.1.2.1, LSt, Gelber Bidling, über A. Lugmair, s.o., von Familie Hütterer, Lenzing Utlg St. Julien I NRA II. Pflzg 10/11
 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 1 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 5 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
 2.4 18.04.2016 - 05.05.
 3 Lbl: dgrün-glzd, verk-eifg, gekerbt, keilfg +6,9/1,3 + 3,4 + 49/61% +3/2
 4 Fr: 6 + E VIII + 3,7 ~ 3,4 ~ 3,6 + 92 : 97 : 106
 5 St: 23 ~ 9 ~ 14 + 39 : 61 : 156
 6 süß fruchtig, klein rötlich punktiert, schwache Falte

3.7.1.2.2, Variante Eier-Pflaume, var. *ovidea* Martens 2 Expl.
 Frucht rundlich-eiförmig, Stielende ganz wenig verjüngt

- 62 O, 3.7.1.2.2, KSt, Diamant-Pflaume, Fa H. Cordes, Holm, Pinneberg, Utlg**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh3 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 + 2.2 d + 2.3 Paa
 2.4 25.04.2015 bis 01.05.
 3 LBl: dgrün, verk-eifg, ges, lg-keilfg + 8,3/1,3 + 3,5 + 42/50 % + 3/2
 4 Fr: 1 + A IX + 28,9 ~ 25,9 ~ 27,4 + 90 : 95 : 106
 5 St: 16,4 ~ 7,1 ~ 12,5 + 43:76:176 + St grob, breit linsig, L-Achse gerade, B-Furche mit kräftigen abgehobenen Riefen, RNt kammartig, Fl randständig feingrbg gerieft
 6 Schon am 23.08. war die Frucht dunkel-rot und leicht blau beduftet, Reife A IX, wohlschmeckende Frucht

5 R, 3.7.1.2.2, KSt, Diamantpflaume, gute Eierpflaume, gepflanzt 2012

3.7.1.3 Variante Oval-Pflaume, var. *oxycarpa* Bechstein, sensu lato, 17 Expl.
 An beiden Enden dick-oval. Fruchtfleisch weich, **saftig-süß!**

12 Expl A) Ind LBl 47,5 % (43-56%); Ind Sprei 57,5 % (49-69 %), B) Fr, 1. Grö 28 (19,3-42,5) ~ 23,6 (14,3-37,1) ~ 24,3 (14,7-39,3), 2. Ind 84 (80-87) ~ 86 (70-92) ~ 103 (100-106) C) St, 1. Grö 14,8 (11-9-19,7) ~ 6,7 (5,5-8,7) ~ 9,8 (7,7-13,8), 2. Ind 45,2 (44-48) : 66,2 (61-70) : 146 (138-159)

3.7.1.3.1 Form kleine Blaue (S-H) Oval-Pflaume 2 Expl.

Ein wenig größer als eine Wiechel und äußerlich mit deutlichen Näherungen zum blauen Spilling. Aber die Längsachse des Steines ist gerade und der Stiel des Steines ragt fast nicht bis kurz, aber gerade, über den Körper hinaus. Verbreitung unbekannt, wahrscheinlich häufiger. Herkunft : Neukirchen-Hesbüll, NF, und Kastorf., Lbg. Vielleicht sollte diese Sippe mit 3.0.2, der "kleinen blauen Rostocker" erweitert werden. Es fehlen bislang jedoch erste Früchte.

2 Expl A) Ind LBl 44% (43-44%); Ind Sprei 54% (49-56 %), B) Fr, 1. Grö 25 (21,0-28,9) ~ 20,1 (14,3-25,8) 20,4 (14,7-26,1), 2. Ind 80 (68-89) : 82 (70-90) : 102 (101-103), C) St, 1. Grö 13,8 (15,2-12,3) ~ 6,1 (5,5-6,7) ~ 8,5 (7,7-9,3), 2. Ind 44 (44-45) : 62 (61-63) : 139 (138-139). 2 nBG

a) BSt/FSt behaart

Abb St + Lbl-24 S: 4c/42

24 S, 3.7.1.3.1a, PPfl, nBG, kl. **Blaue S-H Oval-Pfl.** E.Carstensen, Neukirchen, NF

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 6 + **2.1 bh2** + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 24.04.2015 bis 02.05.

3 LBl: mgrün-gldz, derb-lanz, s-br-ges, s-lg-keilfg + 9,2/2,0 + 4,0 + 43/56 % + 2/ka

4 Fr: 10 + E VIII/A IX + 28,9 ~ 25,8 ~ 26,1 + 89 : 90 : 101

5 St: 15,2 ~ 6,7 ~ 9,3 + 44 : 61 : 139, St stumpf linsenförmig, kurz und gerade gestielt, L-Achse gerade, 1 Riefe bis zur Hälfte, sehr fein, aber schön gemuschelt

6 schöne Blüte, Fr mit schwacher Falte, deutlich eifg, ungleichmäßig reif, deutlich größer als 3.1.2a, , jüngere Triebe grün-rot

b) BSt/FSt kahl

Abb St + Lbl-21 S: 4c/43

21 S, 3.7.1.3.1b, PPfl, nBG, kl. Bl. S-H Oval-Pflaume, Geertz, Kastorf-Bhf, Lbg

1 Spr: 1.1. ka + 1.2 + 2. 3

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 5 + **2.1 ka** + 2.2 b
2.4 22.04.2015 bis 03.05.

3 LBl: mgrün, ell, ges, breit-keilfg + 7,0/0,7 + 3,1 + 44/49 % + 3/3

4 Fr: 5 + E IX + 21,0 ~ 14,3 ~ 14,7 + 68 : 70 : 103

5 St: 12,3 ~ 5,5 ~ 7,7 + 45 : 63 : 138.

6 Frucht sehr schön oval. FSt oval, BNaht ein wenig betont, Flanken glatt

3.7.1.3.2 Form Oval-Pflaume, sensu stricto**7 Expl.****7 Expl, A) Ind LBl 51%; Ind Sprei 61 %, B) Fr, 1. Grö 30,9 (19,3-42,5) ~ 27 (16,8-37,1) ~ 28,1 (16,8-39,3), 2. Ind 87 : 90 (87-92) : 104 (100-106), C) St , 1. Grö 15,8 (11,9-19,7) ~ 7,2 (5,7-8,7) ~ 11,1 (8,3-13,8), 2. Ind 46 (44-48) : 70 (70) : 154 (146-159)**

Beispiel : 3.7.1.3.2b , Edelsorte The Czar. Einfacher , anspruchsloser Massenträger mit blauen Früchten, die leider beim Backen nassen. Regelmäßiger Ertrag. Früchte oft büschelweise. Sehr robuste Sorte mit schlanker Krone und reichlichem Fruchtbehang, bestens für Marmelade und Frischgenuss.

3.7.1.3.2a Landsorte**4b XW, 3.7.1.3.2a**, nBG, Oval-Pflaume hinter 4a im Gbschmtl, R.Hack, Groß Pampau,

1 Spr: 1.1 bh2? + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 24.04.2015 bis 05.05.

3 LBl: mgrün, verk-eif, anlg-ges, keilf + 8,0/1,0 + 3,5 + 43/50 % + 1/2

4 Fr: 1 + E IX + 19,3 ~ 16,8 ~ 16,8 + 87 : 87 : 100

5 St: 11,9 ~ 5,7 ~ 8,3 + 48 : 70 : 146, L-Achse ein wenig bogenfg

3.7.1.3.2b Kultursorte**42 N, 3.7.1.3.2b**, KSt, The Czar, Fa M. Hammerschmidt, Sörup, Angeln, Utlg1 Spr: 1.1 + 1.2 bh3 + 2. 0 **Abb** Fr-42 N: 2/47; St-42 N: 4c/442 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 6 +
2.4 8.04.2015 bis 01.05.

3 Lbl: derb-dgrün, ellipt, gekerbt, rdl + 9,0/1,8 + 5,0 + 56/69 % + 1/1

4 Fr: 10 + M VIII + 42,5~37,1~39,3 + 87 : 92 : 106

- 5 St: 19,7 ~ 8,7 ~ 13,8 + 44 : 70 : 159 + St schön symmetrisch geformt,
L-Achse gerade, NbEd spitz, StEd breit, BNt breit gerieft, Fl fast glatt
- 6 solider Massenträger, fast ohne Alternanz. Früchte leider auch eng büschelig
- 43 N, 3.7.1. 3.2b, KSt, The Czar, Fa M. Hammerschmidt, Sörup, Angeln, Utlg
- 15 R bis 17 R, 3.7.1.3.2b, KSt, The Czar, Oval-Pflaume
- 12 R, 3.7.1.3.2b, KSt, Ruth Gerstetter, wasserhaltende Böden erforderlich

3.7.1.3.3 Brit. Oval-Pflaume: Sorte Black Bullace **4 Expl**

Fr nach dunkelrot schwarz, glatt, dick-oval, St gerade Achse, schwach gestielt

- 31a O, 3.7.1.3.3**, PPfl, euBG, Sorte Black Bullace, G. Staffel, Ahornblatt, Mainz
- 1 Spr: 1.1 wollig + 1.2 wollig + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 4 + 2.1 bh3 s kurz + 2..2 d + 2.3 paa
2.4 20.04.2016 - 02.05.
- 3 Lbl: dgrün-gld, ellipt, gekerbt, rdl, +7,1/1,3 + 2,8 + 39/48 % + 4/wollig
- 4 Fr: 6 + E IX + 23,2 ~ 18,9 ~ 20,2 + 81 : 87 : 107
- 5 St: 14,6 ~ 5,9 ~ 8,8 + 40 : 60 : 149
- 6 Fr dunkel blau, dick oval
- 31b O, 3.7.1.3.3**, PPfl, euBG, Sorte Black Bullace, über G. Staffel, wie 31a O
- 1 Spr: 1.1 wollig + 1.2 wollig + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 4 + 2.1 ka? + 2.2 d + 2.3 Paa
- 3 Lbl: dgrün-gld, ellipt, gekerbt, rdl + 6,1/1,1 + 2,3 + 38/46 % + 3/wollig
- 4 Fr: 7 + E IX + 21,5 ~ 19,4 ~ 21,2 + 90 : 98 : 109
- 5 St: 12,5 : 5,5 : 8,2 + 44 : 65 : 149
- 31c O, 3.7.1.3.3**, PPfl, euBG, Sorte Black Bullace, über G. Staffel, wie 31a O
- 1 Spr: 1.1 kurz-wollig + 1.2 wollig+ 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 3 + 2.1 ka? + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 20.04.2016 - 29.04.
- 3 Lbl: mgrün, ellipt, gekerbt, rdl + 6,8/1,2 + 2,4 + 35/43 % + 3/wollig
- 4 Fr: 5 + E IX + 22,2 ~ 20,2 ~ 21,5 + 91: 97 : 106
- 5 St: 14,0 ~ 5,6 ~ 7,5 + 40 : 54 : 134
- 31d O, 3.7.1.3.3**, PPfl, euBG, Sorte Black Bullace, über G. Staffel, wie 31a O
- 1 Spr: 1.1 kurz-wollig + 1.2 wollig + 2. 0
- 3 Lbl: dgrün-gld, ellipt, gekerbt, rdl + 6,8/1,1 + 2,7 + 40/47 % + 3/wollig
- 4 Fr: 8 + A X + 24,7 ~ 20,0 ~ 22,8 + 81 : 92 : 114
- 5 St: 13,3 ~ 5,9 ~ 8,0 + 44 : 60 : 136
- 6 Fr dunkelrot, noch unreif

3.7.1.3.4 Sorte, Pogauner Oval-Pflaume „Pfälzer Maschen“, blaue PPfl., T. Vogel, Landkreis Forchheim, Ober.-Pfalz **2 Epl.**

2 Expl, A) Ind LBl 54 % (52-56%); Ind Sprei 61 % (59-61 %) B) Fr, 1. Grö 30,8 (27,5-34,0) ~ 25,9 22,7-29,1) ~ 26,4 (23,7-29,0), 2. Ind 84 (83-86) : 86 (85-86) 102 (100-104), C) St, 1. Grö 17,6 (16,9-18,2) ~ 6,6 (6,5-6,6) ~ 10,8 (10,2-11,3), 2.Ind 37 (36-38) : 61 (60-62) : 164 (157-171)

37 W, 3.7.1.3.4, PPfl, dBG, Pogauner, Tobias Vogel, Hauptstr. 58, 91355 Hiltpolstst. v. Kürzdörfer Kappel, Ober-Pfalz, Abb Fr-37 W: 1/17; St + Lbl-37 W: 4c/45

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 4
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 30.04.

- 3 LBl; mgrün, eif, br-ges, abgrdt + 7,2/0,6 + 4,0 + 56/61 % + 2/3
 4 Fr: 5 + E VIII/A IX + 34,0 ~ 29,1 ~ 29,0 + 86 : 85 : 100
 5 St: 18,2 ~ 6,6 ~ 11,3 + 36 : 62 : 171 + NaEd fast spitz + **StEd etwas abgewinkelt u. gerade**, BaNt stärker ausladd als RüNt, Fl warzig
 6 Geschmack ähnlich Kreete, Früchte aber größer
- 38 W, 3.7.1.3.4**, PPfl, dBG, Pogauner, Tobias Vogel, Kürzdörfer Kappel, s.o.
 1 Spr: 1.1 ka/bh? + 1.2 + 2.. 4
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
 2.4 21.04.2015 bis 30.04.
 3 LBl: mgrün, eif, br-ges, abgrdt + 8,6/1,0 + 4,5 + 52/59 % + 2/2
- 2016**
 4 Fr: 1 + E IX + 27,5 ~ 22,7 ~ 23,7 + 83 : 86 : 104
 5 St: 16,9 ~ 6,5 ~ 10,2 + 38 : 60 : 157
 6 NaEd fast spitz, StEd etwas abgewinkelt und gerade, BaNt stärker ausladend als RüNt, Fl mit kurzen Riefen am StEd
- 2017**
 4 Fr: 4 + M VIII + 35,1 ~ 32,0 ~ 32,0 + 91 : 91 : 100
 5 St: 25,8 ~ 7,6 ~ 13,2 + 29 : 53 : 180

3.7.1.3.5a Typ gelbe Ortenberger Oval-Pflaume Abb St-21 Zc:4c/46 2 Expl.
 77799 Ortenberg, über Fa E. Kiefer große, gelbe, oval-kugelige PPfl. von Ortenberg, Gärtnerei E. Kiefer, **sehr wohl schmeckend**

- 1 Expl, A) Ind LBl 34 %, Ind Sprei 43 %, B) Fr, 1. Grö 35,3 ~ 31,0 ~ 31,4, 2. Ind 88 : 89 : 101, C) St, 1.Grö 14,7 ~ 7,0 ~ 10,4, 2. Ind 48 : 71 : 149**
 21 Zc, **3.7.1. 3.5** PPfl, dBG, große, gelbe Primitipfl, Fa E. Kiefer, Ortenberg, BD
 1 Spr: 1. ka + 2. 1
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh1 + 2.2 d/c + 2.3 eiz
 2.4 23.04.2015 bis 09.05.
 3 LBl: hgrün, ell, stu-ges, lg-keilfg + 8,9/1,9 + 3,0 + 34 /43 % + 4/2
 4 Fr: 10 + E VIII/A IX + 35,3 ~ 31,0 ~ 31,4 + 88 : 89 : 101
 5 St: 14,7 ~ 7,0 ~ 10,4 + 48 : 71 : 149 + St oval, StEd abgrdt, NbEd kurz angespitzt, L-Achse gerade, BNt starker Wulst, Fl z.T. gerieft
 6 Frucht gelb, saftig, steinlösend!

3.7.1.3.5b Sorte Loehrpflaume. Abb Fr-18 Zc: 1/13; St + Lbl-18 Zc: 4c/48

Die Zuordnung geschieht allein auf der Grundlage eines Gehölzes von der Firma E. Kiefer, Ortenberg, Baden. Kleine, ca. 3 cm große, kurz-ovale, gelb-rote, sehr saftig-süße, duftende Frucht mit kräftigem Aroma. Indiz Lbl 44 %, Indiz Spreite 56 %. Längsachse des Steines ist *winzig* abgewinkelt. Indizes 42 : 62 : 146. Fruchtreife M8. Sehr süß (10/2011 86° Oechsle!), gut für die Brennerei. Im nBG sehr selten, häufiger im Kanton Bern (CH). Die Art der Frucht und die Form des Steines sprechen für eine Einordnung bei den Halbwetschen. Die Ähnlichkeit mit der Kreete ist beträchtlich. Ihre Reifezeit ist 2-3 Wochen später.

1 Expl, A) Lbl 44 %; Ind Sprei 56 %, B) Fr, 1. Grö 28,0 ~ 24,4 ~ 26,0, 2. Ind 87 : 93 : 107, C) St, 1. Grö 18,7 ~ 7,1 ~ 11,7, 2. Ind 38 : 63 : 165

- 18 Zc, 3.71.5**, LSt, dBG, Löhrpflaume, Fa E. Kiefer, Ortenberg, Baden, Utlg 2
 1 Spr: 1.1 bh1 + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh1 + 2.2 c + 2.3 paa
 2.4 23.04.2015 bis 09.05.

- 3 LBl: mgrün-glzd, br-ell, br-ges, etwas keilfg + 8,1/1,7 + 3,6 + 44/56 % +3/2
 4 Fr: 5 + M VIII + 28,0 ~ 24,4 ~ 26,0 + 87 : 93 : 107
 5 St: 18,7 ~ 7,1 ~ 11,7 + 38 : 63: 165, St mit sehr kurz abgewinkeltem Stiel, somit Stein fast beidendig gleich oval, L-Achse ein wenig bogefg, Wulst der BNt ausladend., mit starken Riefen, Fl gemuschelt, somit wohl keine Oval-Pflaume! 6 Frucht sehr süß!

3.7.1.4 Form Kreete, 27 + 5 alle nBG ,32 Expl.

Prunus domestica ssp. *intermedia* Röder var. *tricolor* ined, Verhältnis Dicke : Breite ab 158%, Abb Fr-11 Zb: 1/11; St + Lbl-6 W: 4c/47

19-24 mm große, beidendig kurz ovale, süß-aromatisch-saftige, frühreife Frucht, die häufig auch steinhaltend und leider nur kurz haltbar ist. Einige auch fade! Der Stein ist flach und beidendig ähnlich am Körper auslaufend, in Seitenlage sehr symmetrisch. Die Steine unterscheiden sich nur in der Größe. Sie sind flach, in Seitenlage symmetrisch, Stiel- und Narbenende am Körper gerade auslaufend, Längsachse also gerade. Größe der Steine 10,7-16,1 ~ 5,0-6,5~ 8,4 - 10,3. Indizes 36-49 :62-79 : 158-175, liegen .Blätter gelblich-weiß, recht groß, schmückend. Laubblätter gelblich-grün, sehr früher Laubfall. Indiz LBl 37-60 %, Indiz Spreite 51-72 %.

Verbreitung nicht hinreichend bekannt, vielleicht klimatisch begünstigt und somit im Südosten des nBG, auch Nordniedersachsen. Identische Steine von H. Illig, Spreewald, und H. Woldring, Groningen (NL) zeigen, dass das Gebiet weit größer war oder ist

Die Kreete und die Löhrpflaume, die allerdings später reift, sind sehr ähnlich. In Lübeck gehörte die Kreete als "Hundepflaume 1766 zu den schädlichen Pflaumen, deren Verkauf verboten ist" (Publicam Lubecae, d. 20. Aug. 1766).

Vergleich a) 3.7.1.4.1 Kreete und b) 3.7.1.5 Löhrpflaume:

a B)Fr,1.Grö 25,0~22,0~23,3, **2. Ind** 88: 93: 106,**C) St, 1.Grö** 13,6~5,7~9,4, **2.Ind** 42: 69: 165

b B)Fr,1.Grö 28,0~24,4~26,0, **2. Ind** 87: 93: 107,**C) St, 1.Grö** 18,7~7,1~11,7, **2.Ind** 38:63:165

27 Expl, A) Ind LBl 49% (37-60%); **Ind Sprei 62 %** (51-72 %), **B) Fr, 1. Grö** 25,0 (20,3-30,0) ~ 22,0 (18,1-28,1) ~23,3 (19,8-28,9), **2. Ind 88** (80-95) : **93** (88-100) : **106** (100-114),**C) St, 1. Grö** 13,6 (10,7-16,1)~**5,7** (5,0-6,5)~ **9,4** (8,4-10,3) , **2. Ind 42** (36-49) : **69** (62-79) : **165** (158-175)

26 O, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, H. Björnsen, Falshöft, Angeln, Utlg

1 Spr: 1. ka + 2. 0

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 30.04.

3 LBl: gelbgrün-glzd, br-eifg, anlg-ges, keilfg +10/2,6 + 4,3 + 43/58 %+ 3/1

4 Fr: 10 + E VII + 26,6 ~ 21,4 ~ 23,4 + 80 : 88 : 109

5 St: 14,5 ~ 6,4 ~ 10,1 + 44 : 70 : 158, St wie 13 Zb

6 Vorzüglich schmeckende Kreete!

11 Zb, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, B. Sthamer, Groß Grönau, Lbg

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0. **Abb** Fr-11 Zb: 1/11

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh3 + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 23.04.2015 bis 10.05.

- 3 LBl: hgrün, br-verk-eifg, stu-ges, keilfg + 10,8/2,3 + 4,5 + 42/54 % + 3/1
 4 Fr: 10 + E7 + 27,4 ~ 24 ~ 24 + 88 : 88 : 100
 5 St: 15,0 ~ 6,1 ~ 9,7 + 41 : 65 : 159, St wie 13 Zb
 6 sehr wohlschmeckende und schöne Frucht
- 12 Zb, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, Wessel, Gr Hundorf, NW-M**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d, + 2.3 Paa, 3.7.4?
 2.4 26.04.2015 bis 07.05.
 3 LBl: hgrün, derb, br-verk-eifg, stu-ges, keilfg + 9/2,2 + 4 + 44/59 % 2/1
 4 Fr: 10 + E VII + 26,0 ~ 23,0 ~ 24,5 + 88 : 94 : 107
 5 St: 14,7 ~ 6,2 ~ 10,2 + 42 : 69 : 165, St wie 13 Zb
- 1 W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, Wessel, Gr Hundorf, NW-M**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw, 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
 2.4 20.04.2015 bis 26.04.
 3 LBl: hgrün. verk-eifg, stu-ges, keilfg + 9,7/2,4 + 3,7 + 38/51 % + 3/1
 4 Fr: 10 + E VII + 23,4 ~ 20,3 ~ 21,6 + 87 : 92 : 106
 5 St: 14,1 ~ 5,1 ~ 8,8 + 36 : 62 : 173, St wie 13 Zb
- 2 W, 3.7.1.4.1, wie 1 W**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh1, s.kurz + 2.2 c + 2.3 paa
 2.4 20.04.2015 bis 26.04.
 3 Lbl: hgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 10,9/2,9 + 5,6 + 51/70 % + 2/1
 4 Fr: 7 + A VIII + 28,6 ~ 26,3 ~ 27,2 + 92 : 95 : 103
 5 St: 16,2 ~ 6,6 ~ 11,6 + 41 : 72 : 176
- 3 W, 3.7.1.4.1, wie 1 W**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh1, s.kurz + 2.3 paa
 2.4 20.04.2015 bis 26.04.
 3 Lbl hellgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 11,5/2,9 + 5,3 + 46/62% + 2/1
 4 Fr: 6 + A VIII + 25,9 ~ 23,5 ~ 25,5 + 91 : 98 : 109
 5 St: 14,4 ~ 5,7 ~ 9,9 + 40 : 69 : 174
- 83 W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, Johs. Nath, RZ-Dermin, wie Typ**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c 2.3
 2.4 20.04.2015 bis 01.05.
 3 LBl: hgrün, ell, ges, keilfg + 10,4/2,5 + 4,0 + 38/51 % + 3/3
 2016
 4 Fr: 2 + A VIII + 23,3 ~ 20,2 ~ 21,5 + 87 : 92 : 106
 5 St: 12,7 ~ 5,4 ~ 9,3 + 43 : 73 : 172, St wie 29a Z, etwas kleiner
 2017
 4 Fr: 7 + A VIII + 27,2 ~ 23,4 ~ 25,9 + 86 : 95 : 107
 5 St: 16,5 ~ 6,1 ~ 11,0 + 37 : 67 : 180
- 57 N, 3.7.1.4.1 PPfl, nBG, Kreete, Johs. Nath, RZ-Dermin, wie Typ**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.2 paa
 2.4 24.04.2016 - 29.04,
 3 Lbl: hgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 10,0/ 2,6 + 4,9 + 49/66 % + 3/1
 4 Fr: wie 1 W
- 58 N, 3.7.1.4.1 PPfl, nBG, Kreete, Johs. Nath, RZ.Dermin, wie Typ**

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
 24.04.2016 - 29.04.
 3 LBl: hgrün, ell, br-gekerbt, s lang keilfg + 5,3/1,4 + 2,5 + 47/64% + 3/3
 4 Fr: wie 1 W
- 68 W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, Johs. Nath, RZ-Dermin**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh2? + 2.2 b + 2.3 paa
 2.4 14.04.2016 bis 25.04.
 3 LBl: mgrün, verk-eifg, gek, abgrdt + 9,2/1,8 + 5,2 + 57/70 % + 3/1
 4 Fr: 1 + M VIII + 26,1~23,3~24,7 + 89 : 95 : 106
 5 St: 13,2~5,6~9,3 + 42 : 70 : 167
 6 typische Frucht, typischer Stein
- 69a W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, Johs. Nath, RZ-Dermin**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
 3 LBl: dgrün, eifg, gek, abgrdt + 11,0/2,2 + 6,3 + 57/72 % + 3/1
 4 Fr: 5 + M VIII + 25,5~24,1~24,3 + 95 : 95 : 101
 5 St: 14,6~5,9~9,3 + 40 64 : 158
 6 typische Frucht, typischer Stein
- 32 W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, Gerhard Wulf, RZ-Insel**
 1 Spr: 1.1 ka 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
 2.4 15.04.2016 - 29.04.
 3 LBl: mgrün, br-ell, br-ges, abgrdt + 8,6/1,5 + 5,0 + 58/70 % + 3/
 2016
 4 Fr: 4 + M VIII + 29,6~28,1~29,7 + 95 : 100,3 : 106
 5 St: 14,9~6,1~10,3 + 41 : 69 : 169
 6 Fr kugelig, dunkelrot, glatt, St typische Form
 2017
 4 Fr: 3 + M VIII + 23,7 ~ 20,9 ~ 22,8 + 88 . 96 : 109
 5 St: 13,5 ~ 5,7 ~ 9,5 + 42 : 70 : 167
- 13 Zb, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, E. Kosin, RZ-Vorstadt**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 Paa
 2.4 23.04.2015 bis 08.05.
 3 LBl: hgrün, br-ell, anlg-ges, keilfg-abgrdt + 8,9/2,0 + 3,8 + 37/55% + 3/1
 4 Fr: 10 + E VII + 23,0 ~ 19,3 ~ 20,5 + 84 : 89 : 106
 5 St: 13,2 ~ 5,0 ~ 8,5 + 38 : 64 : 170 + St flach, stumpf linsenfg, sym-
 metrisch, L-Achse gerade, StEd fast gleich mit NbEd, BNt schwach,
 mit 2 Riefen, Fl randständig etwas gemuschelt
- 5 W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, E. Kosin, RZ-Vorstadt**
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh2 + 2.2 c + 2.3 paa
 2.4 20.04.2015 bis 30.04.
 3 LBl: hgrün, verk-eifg, stu-ges, keilfg + 9,8/2,8 + 3,6 + 37/51% + 3/1
 4 Fr: 10 + E VII + 22,4 ~ 19,1 ~ 19,8 + 85 : 88 : 104
 5 St: 13,0 ~ 5,3 ~ 8,4 + 41 : 65 : 158, St wie 13 Zb
- 6 W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, Kosin, RZ-Vorstadt Abb St + Lbl-6 W: 4c/47**
 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2. 0

- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh1 + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 26.04.
- 3 LBl: mgrün-glzd, verk-eifg, gekerbt, keilfg +12,0/3+ 4,9 + 41/54 % + 1/2
- 4 Fr: 10 + E VII + 24,8 ~ 22,0 ~ 22,7 + 89 : 92 : 103
- 5 St: 14,2 ~ 5,8 ~ 9,3 + 41 : 66 : 160, St wie 13 Zb
- 12 W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, E. Kosin, RZ-Vorstadt,**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh2 + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 30.04.
- 3 LBl: mgrün, breit ellipt, gekerbt, keilfg +12,3/2,9 + 6,0 + 49/64 % + 3/1
- 4 Fr: 10 + E VII + 25,0 ~ 22,6 ~ 23,4 + 90 : 94 : 104
- 5 St: 13,5 ~ 6,1 ~ 9,7 + 45 : 72 : 159, St wie 13 Zb
- 6 Frucht steinlösend
- 34 O, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, E. Kosin, RZ-Vorstadt, wie Typ**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh2 + 2.2 d + 2.3 paa
- 3 LBl: hgrün, br-eifg, br-ges, abgrdt + 8,7/1,2 + 5,2 + 60/69 % + 3/1
- 2016 4 Fr: 1 + A VIII + 25,3 ~ 21,7 ~ 23,2 + 86 : 92 : 107
- 5 St: 3,0 ~ 5,6 ~ 9,8 + 43 : 75 : 175, St wie 29a Z
- 6 Frucht steinlösend
- 2017 4 Fr: 4 + M VIII + 24,6 ~ 21,5 ~ 21,8 + 87 : 89 : 101
- 5 St: 15,4 ~ 5,5 ~ 10,2 + 36 : 66 : 185
- 27 N, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, E. Kosin, RZ-Vorstadt, wie Typ**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 bh1 + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 21.04.2015 bis 30.04.
- 3 LBl: derb dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg +8,8/2,2 + 4,5 + 51/68 % + 3/3
- 4 Fr: 1 + A VIII + 20,3 ~ 18,1 ~ 20,1 + 89 : 99 : 111
- 5 St: 10,7 ~ 5,2 ~ 8,5 + 49 : 79 : 163, St wie 13 Z
- 38 N, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, E. Kosin, RZ-Vorstadt, wie Typ**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
- 3 LBl: gelbgrün, ell, br-ges, keilfg + 7,4/1,4 + 3,5 + 47/58 % + 3/2
- 4 Fr: 5 + A VIII + 23,2 ~ 20,1 ~ 20,7 + 87 : 89 : 103
- 5 St: 12,1 ~ 5,4 ~ 8,9 + 45 : 74 : 165, St wie 13 Z, etwas kleiner
- 6 Frucht steinlösend
- 39 N, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, E. Kosin, RZ-Vorstadt, wie Typ**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 22.04.2015 bis 30.04.
- 3 LBl: hellgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 10,6/2,5 + 5,3 + 50/65 % + 2/1
- 4 Fr: 2 + A VIII + 24,9 ~ 21,3 ~ 22,9 + 86 : 92 : 108
- 5 St: 12,7 ~ 5,8 ~ 9,3 + 46 : 73 : 160, St wie 13 Z
- 29a Z, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, Johs. Waal, RZ-Vorstadt**
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 bh2 + 2.2 d + Paa
2.4 24.04.2015 bis 30.04.
- 3 LBl: dgrün, br-verk-eifg, stu-anlg-ges, keilfg +11,0/2,3 + 5,7 + 52/66 %, 3/2
- 4 Fr: 10 + E VII/A VIII + 25,5 ~ 22,1 ~ 23,0 + 87 : 90 : 104
- 5 St: 14,8 ~ 6,4 ~ 10,1 + 43 : 68 : 158, St wie 13 Z, nur deutlich dicker

- 41 W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, Lucht, Rehna, NW-M
- 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh2 + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 22.04.2015 bis 01.05.
 - 3 LBl: gelbgrün, eifg, gekbt, schm-keilfg + 9,2/1,8 + 5,0 + 54/68 % + 3/3
 - 4 Fr: 10 + E VII + 25,2 ~ 21,8 ~ 23,6 + 87 : 94 : 108
 - 5 St: 12,8 ~ 5,5 ~ 9,2 + 43 : 72 : 167
 - 6 Stein linsig oval, gerade L-Achse, Flanken fast glatt
- 42 W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, Lucht, Rehna, NW-M
- 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh2 + 2.2 b + 2.3 paa
 - 3 LBl: gelbgrün, eifg, gek, abgrdt + 9,2/1,8 + 4,6 + 50/62% + 3/2
 - 4 Fr: 4 + A VIII + 23,4 ~ 20,9 ~ 22,3 + 89 : 95 : 107
 - 5 St: 12,0 ~ 5,3 ~ 9,0 + 44 : 75 : 170
- 8 W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, A. Mißfeldt, Rondeshagen, Lbg
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh2 + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 23.04.2015 bis 30.04.
 - 3 LBl: mgrün-gld, ellipt, gekerbt, keilfg + 14,9/3,2 + 6,5 + 44/58 % + 2/1
 - 4 Fr: 10 + E VII + 20,8 ~ 18,8 ~ 19,8 + 90 : 95 : 105
 - 5 St: 12,2 ~ 5,3 ~ 8,4 + 43 : 69 : 158, St wie 13 Zb
 - 6 Frucht steinlösend
- 39 W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, Willberg, Schlagsülsdorf, NW-M
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 . + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3-4 + 1.3 6 + 2.1 bh1,s.kurz + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 18.04.2016 -
 - 3 LBl: gelbgrün, eifg, gek, abgrdt + 10/2 + 5,4 + 54/68 % + 3/3
 - 4 Fr: 9 + A VIII + 27,0~24,6~26,7 + 91 : 99 : 109
 - 5 St: 16,1~6,0~10,0 + 37 : 62 : 167
 - 6 Frucht kugelig, blaurot, beidseitig gleich oval, Haut glatt, Stein sehr schlank, gerade Achse, symmetrisch
- 5 O, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, Pieper, Schmilau, Lbg
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2 0
 - 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
 - 3 LBl: gelbgrün, ell, br-ges, keilfg + 11,0/2,7 + 5,5 + 50/66 % + 3/ka
 - 4 Fr: 10 + A VIII + noch nicht reif + 24,3 ~ 20,0 ~ 22,7 + 82 : 93 : 114
 - 5 St: 13,7 ~ 5,4 ~ 9,1 + 39 : 66 : 169, St wie 13 Zb, mit ausld Bauchlinie
- 47a W, 3.7.1.4.1, PPfl, nBG, Kreete, G. Penschow, Testorf/Zarrentin, W-M
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh0 + 2.2 d 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 30.04.
 - 3 LBl: gelbgrün, eifg, gek, keilfg + 12,0/2,2 + 6,3 + 53/64 % + 3/2
 - 4 Fr: 10 + A VIII + 30,0 ~ 27,1 ~ 28,9 + 90 : 96 : 107
 - 5 St: 14,3 ~ 6,5 ~ 10,3 + 45 : 72 : 158
 - 6 Stein oval. Vorzügliches Expl. der Sippe !

3.7.1.4.3 Noch nicht voll klärbare "Kreeten" , Verhältnis Dicke : Breite 128 bis 157 %

ä31a Z, 3.7.1.4.3, PPfl, nBG, Kreete, H. Haack/G. Sötje, Brokdorf, Steinbg

- 1 Spr: 1.1 ka 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3-4 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
 3 Lbl: hgrün, derb, eif, anlg-ges, abgrdt + 6,2/0,7 + 3,4 + 55/62 % + 3/1
 4 Fr: 3 + A VIII + 22,2 ~ 18,6 ~ 19,6 + 83 : 88 : 105
 5 St: 14,5 ~ 6,9 ~ 9,4 + 48 : 65 : 136 + St linsig, L-Achse gerade, BNt etwas ausladend, Fl gering marmoriert
 6 Dunkel braunrote jg. Trb, Frucht eifg, rot-blau mit Hauch
- 56 N, **3.7.1.4.3**, PPfl, nBG, Kreete, Johs. Nath, RZ-Dermin, wie Typ
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh2 + 2.2 d + 2.3 paa
 2.4 22.04.2016 - 03.05.
 3 Lbl: matt mgrün, breit ellipt, gekerbt, keilfg + 11,6/2,8 + 5,3 + 46/60% + 3/1
 4 Fr: 1 + A VIII + 20,7 ~ 17,6 ~ 19,1 + 85 : 92 : 109
 5 St: 10,9 ~ 5,6 ~ 8,5 + 51 : 78 : 151, St wie 29a Z
- 55 W, **3.7.1.4.3** PPfl, nBG, Kreete, Platz N, Garten E. Kosin, RZ-Vorstadt
 1 Spr: 1.1. ka + 1.2 + 2.
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3-4 + 1.3 6 + 2.1 bh2 + 2.2 + d + 2.3 eiz
 2.4 20.04.2015 bis 01.05.
 3 Lbl: gelbgrün, ell, grb-ges, keilfg + 8,8/2,0 + 4,2 + 48/62 % + 3/3
2016
 4 Fr: 2 + A VIII + 23,1 ~ 19,7 ~ 20,8 + 85 : 90 : 106
 5 St: 12,4 ~ 7,8 ~ 10,0 + 62 : 81 : 128 + Stein kugelig, Flanken runzelig
2017
 5 St: 1 + M VIII + 13,0 ~ 5,0 ~ 9,0 + 38 : 69 : 180
- 40 W, **3.7.1.4.3**, PPfl, nBG, Kreete, Willberg, Schlagsülsdorf, NW-M
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3-4 + 1.3 6 + 2.1 bh1,s.kurz + 2.2c + 2.3 paa
 2.4 18.04.2016 - 27.04.
 3 Lbl: mgrün, eifg, gek, abgrdt + 9,5/1,5 + 5,4 + 57/68 % + 3/3
 4 Fr: 10 + A VIII + 28,5~25,4~26,4 + 96 : 98 : 103
 5 St: 15,7~6,8~10,0 + 43 : 64 : 147
 6 wie 39 W
- 53 02 O, **3.7.1.4.3**, PPfl, Kreete, Herkunft unbekannt
 1 Spr: 1.1 ka + 1,2 ka + 2. 0
 3 Lbl: hellgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 8,5/1,6 + 3,8+ 45/55 % + 3/1

3.7.2 Typ 2 : Frucht am Stielende deutlich schmaler 8 Expl

3.7.2.1 Sorte Holsteinische Halb-Zwetsche, Abb Fr-15 Zb: 2/48; St + Lbl-15Zb: 4c/49

- 15 Zb, **3.7.2.1**, LSt, nBG, Typ Holst. Halb-Zwetsche, Cordes, Holm, Pinnebg
 1 Spr: 1.1 bh3 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 5 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
 2.4 20.04.2015 bis 08.05.
 3 Lbl: hgrün-glzd, verk-eifg, anlg-ges, keilfg + 8,9/1,8 + 2,2 + 25/31 % + 2/1
 4 Fr: 10 + M VIII + 32,1 ~ 21,8 ~ 24,2 + 68 : 75 : 110
 5 St: 19,9 ~ 6,0 ~ 10,1 + 30 : 51 : 168 + Stein lang gestreckt, St gerade auslaufend, also L-Achse gerade, NbEd abgerundet, BNt mäßig stark, ganz gering stärker ausladend, Fl mit schwachem Mittelgrat
 6 sehr zögerliche Reife der Früchte, darum für Hausgärten besonders

geeignet, vorzüglich für Marmelade, besonderer Geschmack!

Ergänzung: 29 b1 Z als 3.7.2.1 Geliefert, esist aber eine Quitte

3.7.2.2 Sorte Shropshire Prune Damson, Typ 1 Abb St + Lbl-74 W: 4c/50. 2 Expl.

Ob hierzu auch 3.0.11 der Typ 2 und 3.0.12 der Farleigh Damson gehören, sollten die ersten Früchte zeigen

73 W, 3.7.2.2, euBG, Shropshire Prune Damson, Typ 1, Endsleigh, Cornwall, UK,

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh1 + 2.2 d! + 2.3 Pa
2.4 24.04.2015 bis 03.05.

3 LBl: hgrün, ell, br-ges abgrdt + 12,6/2,7 + 6,2 + 49/63 % + 3/3

4 Fr: 5 + A VIII + 55,7 ~ 39,8 ~ 44,2 + 71 : 79 : 111

5 St: 26,5 ~ 9,7 ~ 16,5 + 37 : 62 : 170 + grober Stein mit gerader L-Achse, dabei ein großer, gerade gestielter, symmetrischer Stein, Fl blattartig, Frucht aromatisch!

6 Früher als 74 W, viol-rt mit blauem Hauch, dick-oval mit starker Rückenfalte

74 W, 3.7.2.2, euBG, Shropshire Prune Damson, Typ 1, Endsleigh, Cornwall, UK

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0. **Abb St + Lbl-74 W: 4c/50.**

2 Blü: 1.1 sw + 1.2. 3 + 1.3 6 + 2.1 bh1 + 2.2 d + 2.3 Paa
2.4 24.04.2015 bis 30.04.

2 LBl: derb dgrün-glzd, oval, breit ges, rdl + 7,8/2,0 + 3,8 + 49/66 % + 2/1

4 Fr: 5 + A VIII + 46,4 ~ 30,8 ~ 38,3 + 66 : 83 : 124

5 St: 25,4 ~ 9,9 ~ 16,2 + 39 : 64 : 164, St wie 73 W

6 Etwas später als 73 W, sonst gleich.

3.7.2.3 Sorte Gelbe Holsteiner Halb-Zwetsche, Abb St + Lbl-29a1 O: 4c/512 Expl

Frucht gelb, rötlich punktiert, saftig, am Stielende stark verjüngt, größte Dicke nach 3/5 der Länge. Dicke Falte. Viel Wurzelbrut erleichterte im 19. Jahrhd die Verbreitung, heute sehr selten wohl wegen der starken Wurzelbrut, die mit viel Gartenarbeit verbunden ist. Natürlich lässt sich das mit einer Unterlage beheben.

***A) Ind LBl 34,4 %; Ind Sprei 41,9 %, B) Fr, 1. Grö 46,1 (45,2-47,0)~30,6 (29,4- 31,8) ~ 34,9 (34,1-35,7), 2. Ind 66 : 76 : 114, C) St, 1. Grö 22,6 22,2-23)~7,2 (6,5- 7,9)~ 12,0 (11,1-12,9), 2. Ind 32 : 53 : 166**

29a1 O, 3.7.2.3, LSt, nBG, Sorte Gelbe Holsteiner, über H. Kautzky aus Alte Obstwiese Neumünster

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0. **Abb St + Lbl-29a1 O: 4c/51**

2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 bh3 + 2.2 d + 2.3 eiz

3 LBl: mgrün-glzd, ell, ges mit Übergang gekerbt, lg-keilfg +7,2/1,2+2,6+36/43 % + 3/2

4 Fr: 5 + E VIII + 45,2~31,8~35,7 + 70 : 79 : 112

5 St: 22,2~7,9~12,9 + 36 : 58 : 163 + grober St, L-Achse gerade, StEd fast gerade und breit endend, NaEd etwas zugespitzt, starke B-Furche

6 Frucht sehr saftig. Bauchfalte vom St sehr dick. Wohl nur geringe Restbestände aus der 1. Hälfte (?) des 19. Jahrhdts, vielleicht auch nur übersehen, FSt-ka

53a5 O, 3.7.2.3, LSt, nBG, Gelbe Holsteiner, Obstwiese Neumünster, H. Kautzky

1 Spr: 1.1 + 1.2 ka +2.

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 3/4 + 2.1 bh 2/3 + 2.2 d,kräftig + 2.3 paa
2.4 23.04.2016 - 02.05.

3 Lbl: mgrün-glzd, ellipt, ges, keilfg + 10,8/2,0 + 3,6 + 33/41 % + 1/1

4 Fr: 4 + M VIII + 47,0~29,4~34,1 + 63 : 73 : 116

- 5 St: 23~6,5~11,1 + 28 : 48 : 171
 6 Fr gelblich, rotfleckig. stark verjüngt zum Stiel, mit Falte. St sehr spitz, Stielende rechtwinklich quer, BNaht kräftig

3.7.2.4 Sorte Dattel-Pflaume, var. *mamillaris*, (Schübler et Martens) Werneck
 Frucht groß, flaschen- bis birnenförmig, weich, saftig

26b Z, 3.7.2.4, Dattelpflaume, F. Kötz, Goldener Spiegel 11, 57074 Siegen

- 1 Spr : 1.1 + 1.2 bh3 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 bh3 + 2.2 d + 2.3 Paa
 2.4 25.04.2016 - 01.05.
 3 Lbl: dgrün glzd, ellipt, fast ganzrandg, keilf + 8,7/1,7 +3,6 +41/51 % +2/1

45 Z, 3.7.2.4, Dattelpflaume, F. Kötz, Siegen , s.o.

- 1 Spr : 1.1 ka + 1.2 ka? + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 6 + 1.4 oval + 2.1 bh 3 + 2.2 d + 2.3 paa
 3 Lbl: dgrün, ellipt, fast ganzrandg, keilfg +8,0/1,3 + 4,5 + 56/67% + 2/1

3.7.2.5 Sorte Rotzwetschke

29d O, 3.7.2.5, LSt, Rotzwetschke, Reis A. Lugmair, Gstocket 10, A-4072

Alkoven, von Familie Peterbauer, Weyregg , Attersee, Oö.

- 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 bh1 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 bh2 + 2.2 c + + 2.3 Paa
 2.4 17.04.2016 - 29.04.
 3 Lbl: mgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdl + 8,3/1,5 + 4,0 + 48/59 % + 3/3
 2016 4 Fr: 3 + A IX + 38,4~29,7~31,4 + 77 : 82 : 106
 5 St: 20,6~6,0~10,8 + 33 : 52 : 157
 6 Fr rot, zum Stielende schlanker, mit Falte, St schlank
 2017 4 Fr: 7 + M VIII + 40,1 ~ 29,5 ~ 31,0 + 74 : 77 : 105
 5 St: 21,8 ~ 7,1 ~ 12,4 + 33 : 57 : 175
 6 Fr rot, leicht marmoriert , tropfenförmig

3.8 Unterart Echte Zwetsche, Pr. Do, ssp. domestica L. 24 Expl.

4-8 cm lg Pflaume mit schmalen beidseitigen Enden., Fruchtfleisch fest und mäßig saftig, also besonders backgeeignet, meist steinlösend. Stein in der Länge abgeflacht, Indizes 36 : 63 : 175. Die Abgrenzung der Unterart 3.8 von 3.7. ist insbesondere bei den Edelsorten ist kaum möglich.

3.8.1 Landsorten

16 Expl.

3.8.1.a Hauszwetschen: Deutschland.

14 Expl.

Abb Fr-45N: 2/31; St + Lbl-45 N: 4c/52 u 53

6 Expl, A) Ind LBl 50 % (42-56%); Ind Sprei 58 % (49-65 %) B) Fr, 1. Grö 39,7 (33,6-43) ~28,6 (25,3-31,3) ~30,6 (27,3-32,1, 2. Ind 72 (67-76) : 77 (72-84) : 107 (101-111), C) St, 1. Grö 22,8 (18,8-25,7) ~ 7,0 (6,5-7,5) : 12,5 (11,1-13,3), 2. Ind 31 (28-35) : 55 (51-59) : 179(168-183)

57 O, 3.8.1a, LSt, Hauszwetsche, Typ Büchen, Goedeke, Büchen, Lbg

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 2
 2 Blü: 1.1 w
 2.4 29.04.2051 bis 04.05.
 3 LBl: gelbgrün, eif, ges, abger + 7,7/0,6 + 4,3 + 56/61 % + 2/3

- 6 sehr Wasser bedürftig, sonst gelbblauig
- 58 O, 3.8.1a, LSt, Hauszwetsche, Typ Büchen, Goedeke, Büchen, Lbg, wie 57
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
 - 2 Blü:
 - 3 Lbl: gelb-grün, ellipt, ges, rdl + 8,3/1,0 + 3,6 + 43/49 % + 3/2
- 49 O, 3.8.1a, LSt, Hauszwetsche, Typ Fa H. Cordes, Holm, Pinneberg, Utlg. 2
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0 leuchtend rote Jungtriebe
 - 2 Blü: 1.1 gw + 1.2 4 + 1.3 4 + 2.1 bh3 + 2.2 d + 2.3 paa
 - 3 LBl: mgrün, lanz, br-ges, abgrdt + 8,6/1,8 + 4,2 + 49/62 % + 4/4
 - 4 Fr: 10 + ME IX + 43,0 ~ 29,0 ~ 32,0 + 67 : 74 : 110
 - 5 St: 25,7~ 7,1~ 13,0 + 28 : 51 : 183
 - 6 Fr starke Falte, beidendig verjüngt, steinhaltend, fruchtig-pflaumig, St flach, lang gestielt, NbEd abgerundet, BNt ausladend, Stiel ragt hervor und folgt der Krümmung, L-Achse bogenfg, Fl mit Mittelgrat. Trägt erst nach Jahren.
- 50 O, 3.8.1a, LSt, Hauszwetsche., Typ Fa H. Cordes, Holm, Pinneberg, Utlg. 2
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 1.2
 - 2 Blü: 1.1 gw + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 bh3 + 2.2 d + 2.3 paa
 - 3 Lbl: dgrün-gldz, oval, breit ges, rdl + 10,7/1,8 + 5,4 + 50/61 % + 3/3
 - 4 Fr: 5 + A IX + 41,7~28,3~30,0 + 68 : 72 : 106
 - 5 St: 24,7~7,5~13,3 + 30 : 54 : 177+ gut gestielt, dort mit Riefen
 - 6 Typische Zwetschenform, mit Pflaumenfalte
- 17m S, 3.8.1a, LSt, Hauszwetsche, Typ C. Nickels, Domhof 24, RZ-Insel
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 - 3 Lbl: mgrün, oval, ges, keilfg + 5,5/0,5 + 3,0 + 55/60 % + 2/2
- 10 O, 3.8.1a, LSt, Zwetsche, Typ Riebensahm, RZ-Stüvkamp
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 - 2 Blü: 1.1 gw + 1.2 3 + 1.3 4-6 + 2.1 bh1 + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 24.04.2015 bis 08.05.
 - 3 LBl: gelbgrün, verk-eifg, br-ges, keilfg + 6,7/0,8 + 3,2 + 48/54 % + 3/3
 - 4 Fr: 5 + A IX + 42,1~31,3~31,8 + 74 : 75 : 101
 - 5 St:
 - 6 Früchte beidendig stark verjüngt, typische Zwetschenform
- 45 N, 3.8.1a, LSt, Hauszwetsche, Typ Angeln, Fa M. Hammerschmidt, Sörup
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0 **Abb** Fr-45N: 2/31; St 4c/52
 - 2 Blü: 1.1 gw + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 bh2 + 2.2 d + 2.3 Paa
2.4 21.04.2015 bis 08.05.
 - 3 LBl: hgrün, verk-eifg, ges, keilfg + 10,6/1,6 + 4,5 + 42/50 % + 3/3
 - 4 Fr: 10 + M IX + 33,6~25,3~27,3 + 75 : 81 : 108
 - 5 St: 18,8~6,5~11,1 + 35 : 59 : 168 + NbEd etwas spitz, StEd breit, BNt breit und mäßig dick, bogenfg und "drückt" den Stiel etwas zur Seite, also L-Achse etwas bogenfg, Fl zur Hälfte mit Mittelgrat
 - 6 Trägt erst nach 10 Jahren reichlich
- 46 N, 3.8.1a, LSt, Hauszwetsche, Typ Angeln, wie 45 N
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2. 0.
 - 2 Blü: w + 3 + 3/4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
 - 3 Lbl: derb-dgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 11,2/1,6 + 4,6 + 41/48 % + 3/3
- 47 N, 3.8.1a, LSt, Hauszwetsche, Typ Angeln, wie 45 N
- 45 W, 3.8.1a, LSt, Hauszwetsche, Typ 2, G. Penschow, Testorf, W-M
- 1 Spr: 1.1 wollig + 1.2 + 2. 0

- 2 Blü: 1.1 w + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2
2.4 21.04.2015 bis 30.04.
- 3 LBl: mgrün, eifg, gek, abgrd t + 9,7/1,5 + 5,3 + 55/65 % + 3/4
- 46 W, 3.8.1a**, LSt, Hauszwetsche, Typ 1, G. Penschow, Testorf, W-M
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 0 **Abb** Fr-45N: 2/31; St 4c/53
- 2 Blü: 1.1 b-gw + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
2.4 22.04.2015 bis 03.05.
- 3 LBl: mgrün, ell, ges, keilfg + 5,8/0.5 + 3,1 + 53/58 % + 3/3
- 4 Fr: 10 + MIX + 38,0~28,9~32,1 + 76 : 84 : 111
- 5 St: 22,1~6,9~12,4 + 31 : 56 : 180
- 6 typ Zwetschenform, starke Falte, St mit starker Bauchseite, Stiel etwas abgedreht, Stiel 3 mm lang
- 25 R bis 27 R, 3.8.1a**, Hauszwetsche, H. Cordes, Holm, Pinneberg

3.8.1b Hauszwetschen aus Österreich

2 Expl.

- 14 O, **3.8.1b**, LSt, Hauszwetsche Peterbauer, Reis A. Lugmair, Gstocket 10, A 4072 Alkoven, Familie Peterbauer, Weyregg am Attersee. Utlg.St. Julien, I NRA II
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 bh3? + 2.2 d+ + 2.3 Paa
- 3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, noch keilfg + 8,5/1,7 + 3,8 + 45/56 % + 3/wollig
- 15 O, **3.8.1b**, LSt, Hauszwetsche Peterbauer, Reis A. Lugmair, Oö, s.o.
- 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 bh 3 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 bh3 + 2.2 d++ + 2.3 Paa
2.4 22.04.2016 - 03.05.
2.5

3.8.2 Echte Zwetschen (Altsorten) von Fa Cordes, Holm, Pinneberg, 8 Expl.

- 13 R, 14 R, 3.8.2**, Stanley (Santa Clara), Echte Zwetsche, 1912 USA, reichtragend, nährstoffreiche, warme Böden, in guten Jahren wunderbare große Früchte!
- 18 R, 19 R, 3.8.2**, Bühler Frühzwetsche, sehr bekannte, mittelfrühe Sorte, mittelgroße Früchte, hoher Säuregehalt, steinlöstend
- 28 R, 29 R, 3.8.2**, Ortenauer, ursprünglich Borsumer (Emden), reichtragend, mittelgroße, längliche Frucht ist fest und saftig, steinlöstend
- 33 R, 34 R, 3.8.2**, Zimmers Frühzwetsche, kugelige Krone, anspruchslos

3.9.1 Weitere Pflaumen, Bearbeitung ist erforderlich , 7 Expl.

- 52b W, **3.9.1**, Wurzelbrut, Herkunft ?
- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 bh3 s kurz + 2. 0
- 3 LBl: dgrün, ellipt, ges, keilf + 7,2/1,2 + 2,8 + 39/47 % + 2/1
- 12 S, **3.9.1**, LSt, runde Pflaume, 3.6.2 ? Rondeshagen-Süd, Lbg
1. Spr: 1.1 bh2 + 1.2 bh2 + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 . w + 1.2 4 + 1.3 6+ 2.1 bh1 + 2.2 d, + 2.3 paa
2.4 19.04,2015 bis 30.04.
- 3 LBl: dgrün-glzd, ell, br-ges, br-keilfg + 8,9/2,3 + 4,0 + 45/61 % + 2/3
- 4 Fr: 1 + A VIII + 32,4~28,7~32,0 + 89 : 99 : 111
- 5 St: 20,8~9,7~15,3 + 47 : 74 : 158
- 6 Fr dicke Pfl-Falte, stumpf braun-blau
- 50 W, 3.9.1**, PPfl, Pflaume, H. Bieger, Schwartbuck, Plön
- 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 + 2. 0

- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 4 + 1.3 6+ + 2.1 bh3 + 2.2 d + 2.3 Paa
 3 LBl: hgrün, ell, br-ges, keilfg + 6,8/1,2 + 3,6 + 53/64 % + 3/3
 4 Fr: 3 + M VIII + 40,5 ~ 31,6 ~ 31,6 + 78 : 78 : 100
 5 St: 23,3 ~ 9,2 ~ 14,6 + 39 : 63 : 159
 6 2 Ringe Kronblätter! Ähnlich 15 N, 3.6.1 Kirke! Fr gelb
 36 Z, **3.9.1**, LSt, Pflaume, Günter Heidrich, Wittenberge, Bbg
 1 Spr: 1.1 bh 3 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
 3 LBl: mgrün, s-schön-ell, gekerbt, abgerdt + 4,3/0,5 + 3,2 + 74/84 % + ka/1
 54f W, **3.9.1**, LSt, Pflaume, Günter Heidrich, Wittenberge, Bdbg
 1 Spr: 1.1 s. kurz bh3 + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 bh2 + 2.2 b + 2.3 eiz
 2.4 19.04.2016 - 27.04.
 3 LBl: gelbgrün, eif, gekerbt, abgerdt + 6,5/1,3 + 4,2 + 65/81 % + 3/3

3.9.2 Die Zuordnung erfolgt später

2 Expl.

- 6 S, Utlg ? St Julien GF 655/2, Ortenberg, Baden
 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 4 + 1.3 4 + 2.1 bh1 + 2.2 d + 2.3 paa
 3 LBl: graugrün, lanz, s- br-ges, br-keilfg +7,9/1,4 + 4,0 + 51/62 % + 4/3
 4 Fr: 6 + M VIII + 25,3 ~ 27,2 ~ 27,3 + 108 : 108 : 100
 5 St: 15,5 ~ 7,9 ~ 11,6 + 51 : 75 : 147
 6 St s. kurz gestielt, etwas abgedreht
 33 S, **3.9.2**, PPfl, Primitivpflaume, H. Arnold, Gudendorf, Dthm
 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 + 2. 3
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2,2 d + 2.3 eiz
 3 LBl: gelbgrün, eif, s-br-ges, abgrdt-keilfg +5,5/1,0 +3,0 +55/67 % + ka/1
 4 Fr: 2 + E VIII + 1,9 ~ 1,6 ~ 1,7 + 84 : 89 : 106
 5 St: 11,5 ~ 5,1 ~ 7,4 + 44 : 64 : 145
 6 Fr 10.8. bläulich-rot, etwas Hauch, etwas weich

3.9.3 Kultursorte, engere Sippe morphologisch kaum bestimmbar 26 Expl.

- 61 W, **3.9.3**, KSt, Elena R, Stuttgart-Hohenheim, Utlg
 2.4 28.04.2015 bis 03.05.
 62 W, **3.9.3**, KSt, Elena, R Stuttgart-Hohenheim, Utlg
 2.4 21.04.2015 bis 10.05.
 20 R, 21 R, **3.9.3**, Elena R, sehr spätreifende, mittelgroße, aromatische Frucht, steinlösend, Züchtung aus Stuttgart-Hohenheim, Scharka-tolerant
 43 O, **3.9.3**, KSt Zwetsche Geisenheimer Top, späte, stabile Blüte, spätreif, hangfest, robust gegen Trockenheit, Utlg 2
 2.4 29.04.2015 bis 04.05.
 44 O, **3.9.3**, KSt, Zwetsche Geisenheimer Top S, H. Cordes, Holm, Utlg 2
 2.4 29.04.2015 bis 04.05.
 41 O, **3.9.3**, KSt, Zwetsche Haganta-S, Stuttgart-Hohenheim, Utlg 2
 2.4 28.04.2015 bis 03.05.
 42 O, **3.9.3**, KSt Zwetsche Haganta-S, Stuttgart-Hohenheim, Utlg
 2.4 30.04.2015 bis 04.05.
 28 W, **3.9.3**, KSt, Hanita R, Stuttgart-Hohenheim, Utlg St Julien A
 2.4 20.04.2015 bis 05.05.
 29 W, **3.9.3**, KSt, Hanita R, Stuttgart-Hohenheim, Utlg, St Julien A

- 2.4 20.04.2015 bis 05.05.
- 51 O, 3.9.3**, KSt, Hanita R, Stuttgart-Hohenheim, Utlg 2
2.4 28.04.2015 bis 03.05.
- 52 O, 3.9.3**, KSt, Hanita R, Stuttgart-Hohenheim, Utlg
2.4 28.04.2015 bis 03.05.
- 22 R bis 24 R, 3.9.3**, Hanita R, kräftig blaue, große Frucht mit gutem Geschmack, steinlösend, pflückreif E 8 bis Mitte 9, Züchtung StuttgartHohenheim
- 63 W, 3.9.3**, KSt, Haroma R, Stuttgart-Hohenheim, fest, goldgelb, süß-saftig, Utlg Pr 655/2, geringe Wuchsstärke
2.4 30.04.2015 bis 10.05.
- 65 W, 3.9.3**, KSt, Haroma R, Stuttgart-Hohenheim, Utlg Pr 655/2
2.4 30.04.2015 bis 09.05.
- 67 W, 3.9.3**, KSt, Haroma R, Stuttgart-Hohenheim, Utlg Pr 655/2
2.4 30.04.2015 bis 10.05.
- 39a O, 3.9.3**, KSt, Zwetsche Jojo R, Stuttgart-Hohenheim, spt reif, lge am Baum haltbar, Scharka-resistent Utlg 2
2.4 28.04.2015 bis 03.05.
- 40 O, 3.9.3**, KSt, Zwetsche Jojo R, Stuttgart-Hohenheim, Utlg 2
2.4 28.04.2015 bis 03.05.
- 5 S, 3.9.3** KSt, Zwetsche Katinka R, Stuttgart-Hohenheim, sehr früh reif, nüst beim Backen, nicht, steinlösend, Utlg Pr 655/2,4
2.4
- 47 O, 3.9.3**, KSt, Zwetsche Katinka R, Stuttgart-Hohenheim, Utlg 2
2.4 29.04.2015 bis 03.05.
- 48 O, 3.9.3**, KSt, Zwetsche Katinka R, Stuttgart-Hohenheim Utlg.2
2.4 29.04.2015 bis 03.05.
- 4 S, 3.9.3**, KSt, Presenta R, Stuttgart-Hohenheim, reift 3 Wochen nach Hauszwetsche, fest, süß, steinlösend, Utlg Jaspi-Fl.2,4.
2.4 25.04.2015 bis 04.05.
- 45 O, 3.9.3**, KSt, Presenta R, Stuttgart-Hohenheim, Utlg 2
2.4 29.04.2015 bis 03.05.
- 46 O, 3.9.3**, KSt, Presenta R, Stuttgart-Hohenheim, Utlg 2
2.4 29.04.2015 bis 04.05.
2.5

4) Mutmaßliche Bastarde 12 + 1 13 Expl.

4.1 1 x 3.1 Typ 1, Knick Su □ berg, Gr. Sarau, Lbg. Abb St-24 O: 4c/54 2 Expl.

Habitus ähnlich einer Kricke. Jahrelang sehr wenig Früchte. Viele Tannine.

24 O, 4. 1 ?, Bastard, Knick, Sußberg, Gr. Sarau, Lbg Abb St-24 O: 4c/54

1 Spr: 1. ka + 2. 5

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
2.4 20.04.2015 bis 05.05.

3 LBl: graugrün, lanz, anlgd-ges, abgrdt + 5,2/0,7 + 2,0 + 38/44 % + 2/1

4 Fr: 10 + A X+ 24,2~22,9~25,0 + 95 : 103 : 109

5 St: 12,0~6,2~9,4 + 52 : 78 : 152 + StEd abgrdt, ein wenig abgewinkelt, aber L-Achse noch fast gerade, NbEd abgrdt spitz, BNt etwas ausladend, mäßig breit

25k N 4.1, 5544 *P. do. x P. spinosa*, Reis W. Hartmann, Hohenheim B-W

1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 bh2 s. kurz

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 eiz
2.4 22.04.2016 - 30.04.

3 Lbl: mgrün, br-ellipt, gekerbt, rdl + 7,4/1,0 + 3,8 + 51/59 % 2/1

4 Fr: 5 + A IX + 20,6~18,1~18,5 + 88 : 90 : 102

5 St: 12,5~5,6~8,9 + 45 : 71 : 159

6 Fr und St klein, Fr blau, schwache Falte, eifg, St schlank, gerade Achse, beidseitig gleich spitz

4.2 1 x 3.1 Typ 2, Knick Falshöft, Angeln Abb St-12 O: 4c/55 4 Expl.

Habitus ähnlich einer Großfruchtigen Schlehe

14 W, 4.2 ?, Knick, Falshöft, Angeln

1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 + 2. 1

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 5 + 2.1 bh3 + 2.2 d + 2.3 einz
2.4 24.04.2015 bis 10.05.

3 LBL: mgrün, verk-eif, stu-ges, keilf /spätere abger + 7,4/1,1 + 3,0 + 41/48%
+ 1/3

4 Fr: 4 + A X + 18,4 ~ 17,7 ~ 18,5 + 96 : 101 : 105

5 St: 11,5~6,7~8,8 + 58 : 77 : 131 + St dick-linsig, StEd z.T. ganz wenig abgewinkelt, aber L-Achse insgesamt noch gerade, Fl grob und stark gerieft

6 auffallend schöne große Blüten, Frucht säuerlich, kaum Adstringenz

15 W, 4.2 ?, Knick, Falshöft, Angeln, wie 14 W

1 Spr:

2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 bh1 + 2.2 d + 2.3 eiz

11 O, 4.2 ?, Knick, Falshöft, Angeln

1 Spr: 1.1 wollig + 1.2 + 2. 2

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 bh1 + 2.2 c + 2.3 einz
2.4 24.04.2015 bis 05.05.

3 LBL: dgrün, verk-eif, br-anlg-ges, keilf + 8,0/1,5 + 3,2 + 40/49 % + 3/3

2014 4 Fr: 4 + A X + 17,4 ~ 16,7 ~ 17,5 + 96 : 101 : 105

5 St: 11,7~6,7~8,3 + 57 : 71 : 124 + St stumpf linsig, Stiel etwas hervorragend, Fl vom Stiel aus gerieft, flach grubiger. als 14/15 W, Frucht reifer in 3 Jahren volle Blüte, aber stets kaum Früchte, Frucht säuerlich, kaum Adstringenz

2017 4 Fr: 5 + A IX + 18,4 ~ 16,7 ~ 17,2 + 91 : 93 : 103

5 St: 13,3 ~ 6,5 ~ 8,4 + 49 . 63 : 103

12 O, 4.2 ?, Knick, Falshöft, Angeln

Abb St-12 O: 4c/55

1 Spr: 1.1 wollig + 1.2 + 2. 2

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 FSt-bh2 + c + eiz
2.4 24.04.2015 bis 08.05.

3 LBL: mgrün, ell, ges, klf + 7.2/1,3 + 3,8 + 53/64 % + 2/4

4 Fr: 5 + E IX + 17,9 ~ 17,4 ~ 18,6 + 97 : 104 : 107

5 St: 12,1~6,4~8,9 + 53 : 74 : 139 + St stumpf linsig, L-Achse gerade, StEd etwas abgewinkelt, Fl zerfurcht gerieft, BNt recht stark

6 Adstringenz deutlich vorhanden, LBL Unterseite grobadrig

4.3 1 x 3.7.1. 3.2?, Obstwiese Neumuenster

3 Expl.

Werte durch gelieferte Zweige, Ähnlichkeit mit 3.4.2 vorhanden.

1 Spr: 1. ka

2 Blü: 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz

3 LBL: dgrün, ell, stumpf ges, keilf + 8,1/1,8 + 3,6 + 44/57 % + 1/ka!

- 4 Fr: 5 + MIX + 25,3 ~ 22,6 ~ 24,1 + 89 : 95 : 107
- 5 St: 15,1 ~ 7,2 ~ 10,9 + 48 : 72 : 151 + Stein breit linsig, am Stielende abgewinkelt gestielt, L-Achse gering bogenfg (siehe oben), B-Furche breit gerieft
- 6 Wurzelbrut durch Schafe kurz gehalten. Reisvermehrung 2012
- 171 S, 4. 3. PPfl, Bastard, H. Kautzky aus Alte Obstwiese, Neumünster, Utlg
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 6 + 1,4 oval + 2.1 ka + 2.2 c 2.3 paa
- 3 Lbl: dgrün-glzd, eifg, gekerbt, keilfg + 6,3/0,5 + 2,7 + 43/47 % 2/1
- 29a2 O, 4. 3, PPfl, Bastard, H. Kautzky aus Alte Obstwiese Neumünster
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka 2. 0.
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 6 + 1.4 oval + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 eiz
- 3 Lbl: mgrün, ellipt, gekerbt, rdl + 6,2/1,2 + 3,2 + 52/64 % + 2/1
- 4 Fr: 3 + A IX + 2,3 ~ 2,1 ~ 2,3 + 91 : 100 : 110
- 5 St: 13,8 ~ 6,9 ~ 10,4 + 50 : 75 : 151
- 29a3 O, 4. 3, PPfl, Bastard, wie 29a2 O
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 1.3 6 + 1.4 oval + 2.1 ka 2.2 c + 2.3 eiz
- 3 Lbl: dgrün, ellipt, gekerbt, rdl + 6,3/0,9 + 3,5 + 56/65 % + 2/1
- 4.4 3 x 2 Hohenheim B-W** **1 Expl.**
- 251 N, 4.4. 8396, Pflaume x Kirschpflaume, Reis W. Hartmann, Hohenheim, B-W
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka
- 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + paa
- 2.4 21.04.2015 bis 01.05.
- 3 Lbl: mattgrün, ellipt, br-ges-gekerbt, rdl + 7,6/0,9 + 4,6 + 61/69 % + 3/1
- 4.5 3.4 x 2 Spillingskirschpflaume, Baumschule Ritthaler** **2 Expl.**
- 69d W, 4.5, Spillingskirschpflaume, Reis Baumschule Ritthaler, Hütschenhausen, R-P.
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 gw + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 eiz
- 3 Lbl: dgrün-glzd, ellipt, ges, rdl + 7,8/0,7 + 3,5 + 45/49% + 3/3
- 69e W, 4.5, Spillingskirschpflaume, wie 69 d W
- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
- 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 3 + 2.1 bh3 + 2.2 c + 2.3 eiz
- 3 Lbl: mgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdl + 8,4/1,3 + 3,6 + 43/51% + 2/1
- X 1 Expl. Japanische Nektارينenpflaume**, von Peter Klock, Südflora, HH **1 Expl**
- 1 Spr: 1.1 + 1.2 ka + 2.
- 3 Lbl: hellgrün, ellipt, gekerbt, rdl + 4,0/0,4 + 2,6 + 65/72 % + 1/2
- 5 Anhang: Vergleich der Sippen mit kleinen blauen Früchten**
- a) Hofschlehe (1.8.1), b) Kricke, c) Wiechel, d) Blauer Spilling, e) bl. S-H Oval-Pflaume**
- | Sippe | Fr-Form | Gr□e, L~B~D | Indizes | Fruchtstiel |
|----------------------------|---------------|----------------|---|----------------|
| a) Hofschlehe | kugelig | 20,5~19,7~20,7 | 96 : 101 : 105 | kahl |
| b) Kricke s.s., | kugelg-kürbfg | 21,3~21,2~22,1 | 99 : 104 : 104 | kahl |
| c) Wiechel | kugelig-eifg | 24,8~22,8~24,1 | 92 : 97 : 106 | behaart |
| d) Blauer Spilling | oval-trapezfg | 24,4~20,4~21,6 | 80 : 85 : 106 | kahl/behaart |
| e) S-H Oval-Pfl | oval | 25,0~20,1~20,4 | 80 : 82 : 102 | kahl/behaart |
| Geschmack | St-Gr□e | Indizes | Form des Steines | |
| a) kräftig, adstrgd | 11,1~6,3~8,5 | 57 : 77 : 135 | gerade Lgsachse, fast ungestielt | |
| b) herb-fruchtig | 12,0~7,1~9,4 | 59 : 78 : 132 | gerade Längsachse, ungestielt | |
| c) mild-fruchtig | 13,6~7,1~9,7 | 52 : 71 : 137 | gerade Längsachse, ungestielt | |
| d) fruchtig | 14,9~6,1~8,6 | 41 : 58 : 141 | Stein abgewinkelt gestielt | |
| e) süßl-fruchtig. | 13,8~6,1~8,5 | 44 : 62 : 139 | Stein kurz-gerade gestielt | |

X Ergänzungen infolge falscher Lieferungen

29 b1 Z, LSt, nBG, Quitte als Aroma Zwetsche, über Peter Klock, Witzeeze

1 Spr:

2 Blü: 1.1 w + 1.2 4/5 + 1.3 6 + 2.1 bh3 + 2.2 b + 2.3 eiz

3 LBl: grün, br-oval, fast ganzrandig, rdl + 6,2/0,9 + 3,4 + 55/64 % +
bh kurz-wollig/wollig

30b S, dBG, Apfel als Thüringer Hammelsäcke über W. Hartmann.

1 Spr: 1. ka + 2. 0

2 Blü: 1.1 w-rötl + 1.2 4 + 1.3 6 + 2.1 bh3 + 2.2 d + quirlg

3 LBl: dgrün, ell, grob-ges, keilfg + 8,1/2,7 + 4,0 + 49,/74% + 2/1

6 Laubausbruch sehr spät,

6) Projekt III, Gehölze der Reihe 3 des Redders

Der Redder enthält fünf Reihen mit Obstgehölzen. Das sind im Westen in der Reihe eins 33 Pflaumen und Kirschkirschen. In der nächsten Reihe folgen Apfelbäume. Die Reihe drei enthält zwei Schwarze Holunder, 85 *Pruni* und zwei Apfelbäume. Zum Programm 2 gehören also 118 Gehölze. Die Herkunft der *Pruni* ist nicht bekannt.

Bestimmung der Gehölze Reihe drei bis Okt.2015 85 Expl

0	2 Expl.	Sektion <i>Prunus</i>
1	4 „	Schlehe
1.1a	3 „	Eiförmige Gewöhnliche Schlehe
1.1b	1 „	Gewöhnliche Schlehe mit rundlichem Stein
1.1c	2 „	Gewöhnliche Schlehe mit eiförmigem Stein
1.2.1	14 „	typische Großfruchtige Schlehe
1.2.2	4 „	typische Großfruchtige Schlehe mit rundlichem Stein
1.3.1	1 „	Kleine Filzige Schlehe
1.3.2	1 „	Große Filzige Schlehe
3	2 „	Pflaume
3.1	12 „	Kricke, sensu lato
3.1.1a	4 „	Kricke, sensu stricto, Hauptform
3.1.1a1	20 „	Kricke, sensu stricto, Fruchstein beidendig +/- gleich
3.1.1a2	2 „	Kricke, sensu stricto, Fruchstein beidendig verschieden
3.1.1a3	1 „	Kricke, sensu stricto, Fruchstein rundlich
3.3	1 „	Kreeke
3.7.1.4	11 „	Kreete

Nachrichtlich: Projekt II, Reihe 1 des Redders

Diese Gehölze wurden im Herbst 2012 gepflanzt. Nach der Nr. des Platzes folgt zunächst in Klammern unser taxonomischer Code und danach der Name der Sorte. Weitere Ergänzungen dürften für kommende Paten wichtig sein, Der Betrag dafür lautet 50 €.

1 **R (2.1)**, Anatolia, eine vorzügliche Kirschkirschenart! Reife VIII bis IX.

2 **R (2.1)**, Anatolia, wie 1 R

3 **R (2.1)**, Anatolia, wie 1 R

4 **R (3.7.1.1b)**, Anna Späth, eine saftig süße Küchenzwetsche

5 **R (3.7.1.2.2)**, Diamantpflaume, prächtige Eierpflaume, saftig, aromatisch

- 6 R (3.7.1.1b), Wangenheims Frühzwetsche, voller Ertrag würziger Halbwetschen
 7 R (3.7.1.1b), v. Wangenheims Frühzwetsche, wie 6 R
 8 R (3.7.1.1b), v. Wangenheims Frühzwetsche, wie 6 R
 9 R (3.6.1), Kirkes Pflaume, vollsaftige Edel Rund-Pflaume
 10 R (3.6.1), Ontario, grün-gelbe, reichtragende Edel Rund-Pflaume
 11 R (3.6.1), Ontario, wie 10 R
 12 R (3.7.1.3.2b), Ruth Gerstetter, s früh reife Frucht, kleinkronige Oval-Pflaume
 13 R (3.8.2), Stanley, (Santa Clara), Echte Zwetsche, reichtragend, warme Böden
 14 R (3.8.2), Stanley, wie 13 R
 15 R (3.7.1.3.2b), The Czar, ertragreiche und fruchtige Oval-Pfl,nässt beim Backen
 16 R (3.7.1.3.2b),The Czar, wie 15 R
 17 R (3.7.1.3.2b), The Czar, wie 15 R
 18 R (3.8.2), Bühler Frühzwetsche, bekannte fruchtige Echte Zwetsche
 19 R (3.8.2), Bühler Frühzwetsche, wie 18 R
 20 R (3.9.3), Elena, im X reife, aromatische Zwetsche, Züchtung Hohenheim
 21 R (3.9.3), Elena, wie 20 R
 22 R (3.9.3), Hanita, gute, große Zwetsche, vielfach verwendbar, Hohenheim
 23 R (3.9.3), Hanita, wie 22 R
 24 R (3.9.3), Hanita, wie 22 R
 25 R (3.8.1a), Hauszwetsche, bekannte Echte Zwetsche, die erst nach Jahren trägt
 26 R (3.8.1a), Hauszwetsche, wie 25 R
 27 R (3.8.1a), Hauszwetsche, wie 25 R
 28 R (3.8.2), Ortenauer, (Borsumer), feste, saftige, steinlösende Echte Zwetsche
 29 R (3.8.2), Ortenauer, wie 28 R
 30 R (3.7.1.1b), v. Wangenheims Frühzwetsche, wie 6 R
 31 R (3.7.1.1b), v. Wangenheims Frühzwetsche, wie 6 R
 32 R (3.7.1.1b), v. Wangenheims Frühzwetsche, wie 6 R
 33 R (3.8.2), anspruchslose Echte Zwetsche

Forschungsprojekt III: Pruni Reihe 3, Redder, 85 Expl

Die Reihe 3 enthält 2 Holunder, 2 Apfelbäume und 85 Pruni

Die Reihenfolge entstand durch junge, noch nicht näher bestimmbare Gehölze.

1 R 3.1.1a1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0

2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 einz

3 LBl: dgrün-gld, ellipt, gekerbt, keilfg + 6,6/1,2 + 3,4 + 52/63 % + 1/2

4 Fr: 3 + 9 + 24,1~22,7~24,3 + 94 : 101 : 107

5 St: 14,7~7,6~10,8 + 52 : 73 : 142 + St linsig

6 Wulst schmal ausladend, LAchse gerade

2 R 3.1.1a1 Kricke

1 Spr: .1 ka + 1.2 bh1 + 2. 0

2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 c + 2.3, wie 1 R

3 LBl dgrün-gld, ellipt, ges, keilf + 7,2/1,6 + 3,4 + 47/61 % + 2/2

4 Fr: 3 + A IX + 21,8~21,4~22,6 + 98 : 104 : 106

5 St: 12,8~6,9~9,2 + 54 : 72 : 133 + St linsig

6 Schmale BNaht hervor gehoben, StEnden fast gleich

3 R 3.1.1a1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 2

2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 c + 2.3, wie 1 R

3 LBl: dgrün-gld, ges, keilfg + 8,2/1,6 + 3,7 + 45/56% + 1/2

4 Fr: 3 + A IX + 23,0~23,0~24,0 + 100 : 104 : 104

5 St: 13,0~7,7~10,6 + 59 : 82 : 138

6 BNaht stark, Wulst

4 R 3.1.1a1 Kricke

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 2
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 b + 2.3
3 LBl: derb mgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdl 8,0/1,7 + 3,5 + 44/56% + 2/3
4 Fr: 3 + A IX + 23,2~21,9~23,0 + 94 : 99 : 105
5 St: 14,0~7,6~9,8 + 54 : 70 : 129 + St beidendig fast gleich
6 L Achse am StEnde ein wenig abgewinkelt

5 R 1.2.1 typische Großfruchtige Schlehe

- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 bh3 + 2. 3
2 Blü: 1.1 bw + 1.2 1 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
3 LBl: dgrün-glzd, oval, gekerbt, rdl + 3,6/0,5 + 2,0 + 56/65 % + 3/2
4 Fr: 5 + E IX + 16,2~15,5~16,0 + 96 : 99 : 103
5 St: 11,2~6,1~8,3 + 54 : 74 : 136 + linsig symmetrischer Stein

6 R 3.1.1a3 Kricke mit rdl Stein

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 2
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: dgrün, oval, , rdl + 5,6/0,8 + 2,8 + 50/58 % + 2/1
4 Fr: 8 + A IX + 19,6~19,1~20,6 + 97 : 105 : 108
5 St: 10,3~6,2~9,3 + 60 : 79 : 131 + St rundlich
6 A IX reif, Flanken mit starken Riefen, z. T. ein wenig abgedreht, FrSaft rötlich

7 R 1.2.1 typische Großfruchtige Schlehe

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh2 + 2. 5
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: dgrün-gkzd, ellipt, ges, keilfg + 4,6/0,9 + 1,6 + 35/43 % + 1/1:
4 Fr: 5 + X + 16,7~16,8~18,1 ~ 101 : 108 : 107,7
5 St: 11,2~7,1~9,2 + 63 : 82 : 130 + Stein beidendig gleich oval

8 R 1.2.2 typische Großfruchtige Schlehe mit rdl Stein

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh2 + 2. 4
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: derb dgrün-glzd, ellipt, ges-gekerbt, rdl + 6,5/1,0 + 2,6 + 40/47 % + 4/3
4 Fr: 4 + A X + 14,0~14,6~14,9 + 104 : 106 : 102
5 St: 9,3~6,2~7,7 + 67 : 83 : 124 + St klein und rundlich

9 R 1.2.2 typische Großfruchtige Schlehe mit oval-rdl Stein

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: derb dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 4,6/0,7 + 2,2 + 48/56 % + 2/1
4 Fr: 5 + A IX + 16,8~16,8~18,4 + 100 : 110 : 110
5 St: 10,1~6,2~8,4 + 61 : 83 : 135 + oval-rdl Stein
6 starke Riefen am StEnde

10 R 3.7.1.4 Kreete

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
3 LBl: hellgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 9,4/2,3 + 3,6 + 38/50 % + 2/1

11 R 3.7.1.4 Kreete?

- 1 Spr: 1.1 ka + ka 1.2 + 2. 0
2 Blü: 1.1 w + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 paa
3 LBl: mgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 6,5/2,2 + 2,9 + 45/67 % + 3/ka

12 R 3.7.1.4 Kreete

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 0 14 + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 LBl: hellgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 8,4/2,5 + 3,5 + 42/59 %

13 R 3.1 Kricke

- 1 Spr: 1.1 ka + ka 1.2 + 2. 0

2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 LBl: hellgrün, ellipt, gekerbt, keilf-rdl + 6,2/1,0 + 3,5 + 56/67 % + 2/1

14 R 3.1.1a1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2.
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, ges, keilf + 8,7/1,9 + 3,5 + 40/51% + 1/1
4 Fr: 3 + 9 + 22,9~22,4~23,0 + 98 : 101 : 103
5 St: 13,7~7,4~9,8 + 54 : 72 : 132 + Stein beidendig ova
6 Fl fast glatt

15 R 3.1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdl + 6,4/1,0 + 3,1 + 48/57 % + ka/1

16 R 1 Schlehe

1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 bh2 s kurz + 2. 1
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: mgruen, oval, gekerbt, rdl + 4,5/0,5 + 2,3 + 51 % 58 % + 4/3

17 R 3.1?

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2.
2 Blü: + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 LBl: derb dgrün-glzd, oval, gekerbt, rdl + 5,8/0,5 + 3,2 + 55 %/60 % + ka/ka

18 R 3.3 Kreeke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 ka + 2.2 d + 2.3 einz
3 LBl: derb dgün-glzd, oval, gekerbt, keilfg-rdl + 8,8/2,2 + 3,6 + 41/55 % + ka/1
4 Fr: 1 + A IX + 22,6~19,0~19,5 + 84 85 : 103
5 ST: 14,0~5,8~7,6 + 41 : 54 : 76 + St mit gering geschwungener Achse
6 typ. St.mit breitem Wulst, Fr fruchtig-saftig

19 R 3.1.1a1 Kricke

1 Spr: 1.1 + 1.2 bh1 + 2. 2
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 einz
3 LBl: derb dgrün-glzd, oval, grob ges, rdl + 7,4/1,0 + 3,8 + 51/59 % + fast ½
4 Fr: 3 + A IX + 21,6~20,7~21,8 + 96 : 101 : 105
5 St: 13,2~7,0~9,5 + 53 : 72 : 136 + Stein linsig
6 Fr mit Pflaumenfalte, Bnaht kleiner Wulst

20 R 3.1.1a.1 Kricke

1 Spr: 1.1 + 1.2 bh 1 + 2. 3
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, ges, keilfg + 7,8/1,4 + 3,5 + 45/58 % + fast ½
4 Fr: 3 + A IX + 23,1~22,0~23,4 + 95 : 101 : 106
5 St: 13,9~8,0~9,5 + 58 : 68 : 119 + St linsig
6 roter Fruchtsaft, BNht mit starkem Wulst

21 R 3.1.1a1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 2
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
3 LBl: dgrün-glzd, oval, ges, rdl + 7,5/1,5 + 3,5 + 47/58 % + ka/ka
4 Fr: 3 + A IX + 22,1~21,0~22,6 + 95 : 102 : 108
5 St: 12,9~7,1~9,5 + 55 : 74 : 134 + St linsig
6 betonte BNht

22 R 3.1.1a1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 3
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
3 LBl: mgrün, oval-ellipt, gekerbt, rdl-keilf + 6,9/1,6 + 2,9 + 42/55 % + ka/ka
4 Fr: 3 + E IX + 21,9~21,5~22,0 + 98 : 101 : 102
5 St: 12,7~7,6~10,0 + 60 : 79 : 132 + St linsig

6 Stielende etwas stärker

23 R 3.1.1a1 Kricke

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 1
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
3 LBl: dgrün-gldz, oval-ellipt, grob ges, rdl-keilfg + 8,1/1,7 + 3,5 + 43/55 % + ka/2
4 Fr: 3 + E IX + 23,0~23,0~23,2 + 100 : 101 : 101
5 St: 13,7~7,4~10,0 + 54 : 73 : 135 + Stein oval
6 BNht etwas betont

24 R 1.1c Schlehe

- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 bh3 + 2. 2
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
3 LBl: hell grün, ellipt, ges-gekerbt, keilfg + 5,5/0,9 + 1,9 + 35/41 % + 3/3
4 Fr: 4 + X + 14,4~14,3~15,4 + 99 : 107 : 108
5 St: 9,2~6,1~7,8 + 66 : 85 : 128 + St rundlich-eiförmig
6 Fl gemuschelt, St-Ansatz gerundet, deutliche Spitze

25 R 1.1a eifg. Gewöhnliche Schlehe

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 2
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
3 LBl: mittel-grün, ellipt, breit-ges, keilfg + 4,6/1,2 + 1,3 + 28/38 % + ka/ka
4 Fr: 3 + E IX + 16,4~13,5~13,7 + 82 : 84 : 101
5 St: 13,1~5,5~8,9 + 42 : 68 : 162 + St eiförmig
6 St-Spitze ausgezogen, Fl gemuschelt

26 R 1.2.2 typische Großfruchtige Schlehe mit rdl Stein

- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 ka + 2. 2
2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: dgrün-gldz, ellipt, ges, rdl + 4,8/1,0 + 2,3 + 48/61 % + 2/2
4 Fr: 5 + X + 15,2~14,9~15,1 + 98 : 99 : 101
5 St: 9,7~6,7~9,0 + 69 : 93 : 134 St rundlich
6 starke Bauchfurche

27 R 1.1a eiförmige Gewöhnliche Schlehe

- 1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 gezä + 2. 3
2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: dgrün-gldz, ellipt, gekerbt, rdl-keilfg 5,3/0,6 + 2,5 + 47/53 % + 1/1
4 Fr: 8 + E IX + 17,3~14,1~14,6 + 82 : 84 : 104
5 St: 13,2~5,7~8,0 + 43 : 60 : 140 + St eiförmig mit langer Spitze
6 Fr mi rotem Saft, LBl streifenförmig

28 R 1.2.1 typische Großfruchtige Schlehe

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh3 + 2. 3
2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: dgrün-gldz. ellipt, gekerbt, rdl-keilfg + 6,0/0,7 + 2,4 + 40/45 % + ka/1
4 Fr: 2 + A IX + 14,2~13,4~13,6 + 94 : 96 : 101
5 St: 10,6~6,7~8,8 + 63 : 83 : 131 + St beidendig oval

29 R 3.7.1.4 Kreete

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 einz
3 LBl: mittel-grün, oval, ges-gekerbt, keilfg + 10,0/2,2 + 5,2 + 52/67% + 2/1

30 R 3.1.1.a Kricke

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 einz
3 LBl: dgrün-gldz, oval, ges-gekerbt, keilfg + 6,2/0,9 + 3,3 + 53/62 % + ka/1
4 Fr: 5 + E IX + 21,2~20,4~21,0 + 96 : 99 : 103
5 St: 12,4~6,9~9,5 + 56 : 77 : 138 + St linsig
6 Fr gering adstringierend + St dicker Wulst, beidendig fast gleich

31 R 3.1.1a 1 Kricke

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 einz
 3 LBl: derb dgrün-glzd, ellipt, grob ges, keilfg + 8,8/1,3 + 3,6 + 41/48 % + 4/3
 4 Fr: 1 + E IX + 24,2~22,5~24,3 + 93 : 100,4 : 108
 5 St: 13,9~7,1~10,1 + 51 : 73 : 142 + Stein linsig-oval
 6

32 R 3.1.1a Kricke

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5
 2 Blü: 1.1 1.2 + 1.3 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
 3 LBl: dgrün-glzd, eifg, gekerbt, rdl + 5,9/1,0 + 3,3 + 56/67 % + ka/1
 4 Fr: 5 + E IX + 21,4~20,3~21,0 + 95 : 98 : 103
 5 St: 12,5~7,2~0,2 + 58 : 74 : 128 + St linsig, etwas breiterer Stielansatz
 6 Fr gering adstringierend, Mittelriebe vom Wulst hervorspringend, Fl glatt

33 R 3.7.1.4 Kreete

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
 3 LBl: derb mgrün-glzd, oval, gekerbt, rdl + 8,0/1,9 + 4,3 + 54/70 % + 1/1

34 R 1.3.2 Große Filzige Schlehe

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh 2 + 2. 5
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
 3 LBl: derb mgrün-glzd, oval, gekerbt, keilfg + 5,8/0,9 + 2,8 + 48/57 % + 3/1
 4 Fr: 6 + E IX + 16,1~15,9~16,1 + 98 : 100 : 101
 5 St: 10,4~6,2~9,2 + 60 : 88 : 148 + St eiförmig
 6 Kräftiger Wulst, Fl mit Riefen

35 R 3.1.1a2 Kricke

- 1 Spr: 1.1 bh2 + 1.2 bh2, s kurz + 2. 4
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
 3 LBl: derb dgrün-glzd, lanzettlich, ges, rdl + 4,5/0,7 + 1,6 + 36/42 % + 1/1
 4 Fr: 6 + IX + 19,5~18,2~19,5 + 93 : 100 : 107
 5 St: 11,1~6,2~8,8 + 56 : 79 : 142 + St eiförmig
 6 Fr gering adstringierend, St kräftiger Wulst, breiter Stielansatz

36 R 1.2.1 typische großfruchtige Schlehe

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh2, s kurz + 2. 5
 2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3, wie 34
 3 LBl: derb dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdl + 6,1/0,7 + 2,2 + 36/41 % + 3/3
 4 Fr: 1 + X + 14,1~14,4~14,4 + 102 : 102 : 100
 5 St: 10,6~6,0~8,2 + 57 : 77 : 137 + St eiförmig
 6

37 R 1.2.2 typische Großfruchtige Schlehe mit rdl Stein

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh2 + 2. 5
 2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3, wie 34
 3 Lbl: derb dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdl + 5,4/0,9 + 2,0 + 37/44 % + 3/3
 4 Fr: 1 M IX
 5 St: 10,0~6,7~8,5 + 67 : 85 : 127 + St rundlich

38 R 1.2.1 typische Großfruchtige Schlehe

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5
 2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3, wie 34
 3 LBl: derb dgrün-glzd, oval, gekerbt, rdl + 4,4/0,5 + 2,2 + 50/56 % + 1/1
 4 Fr: 5 + A IX + 17,0~17,0~18,0 + 100 : 106 : 106
 5 St: 9,1~5,9~7,9 + 65 : 87 : 134 + St eiförmig
 6 St klein

39 R 3.1.1a1 Kricke

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh2, s kurz + 2. 4
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
 3 LBl: mgrün-glzd, rdl, ges, rdl + 6,5/0,8 + 3,8 + 58/67 % + ka/1

4 Fr: 4 + E IX + 20,3~19,7~20,6 + 97 : 101 : 105

5 St: 12,8~6,6~9,3 + 52 : 73 : 141 + Stein oval-linsig

40 R 3.7.1.4 Kreete

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 2

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz

3 LBl: hellgrün, breit-ellipt, gekerbt, rdl + 8,2/1,5 + 4,8 + 59/72 % + 2/2

41 R 3.1.1a1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh2 s kurz + 2. 5

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz

3 LBl: mgrün-glzd, verkehrt-eifg, gekerbt, rdl-keilfg + 6,3/1,2 + 4,2 + 67 %/82 % + ka/2

4 Fr: 3 + E VIII + 22,8~22,6~23,4 + 99 : 103 : 104

5 St: 13,3~7,1~9,7 + 53 : 73 : 137 + St oval

6 Stein winzig abgewinkelt. Sehr früh reif!

42 R 3.7.1.4 Kreete

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0

2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3

3 LBl: mgrün, eifg, gekerbt, rdl-keilfg + 9,3/2,2 + 4,4 + 47 %/62 % + 2/1

43 R 3.1.1a1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 1

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz

3 Lbl: derb-dgrün-glzd, ellipt, breit ges, keilfg + 6,1/1,1 + 4,0 + 66/80 % + ka/1

4 Fr: 5 + E IX + 22,0~21,4~22,6 + 97 : 103 : 107

5 St: 13,2~7,6~9,9 + 58 : 75 : 130 + St linsig

6 Früchte z.T. paarig, Stielansatz des St gering gedreht

44 R

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0

2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3

3 LBl: derb-dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdl + 4,7/0,7 + 2,3 + 49/58 % + ka/1

45 R 3.1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5

2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3

3 LBl: derb dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 6,5/1,1 + 2,9 + 45/54 % + ka/1

46 R 3.1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5

2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3

3 LBl: derb-dgrün-glzd, ellipt, gekerbt + 7,3/2,2 + 2,9 + 40/57 % + ka/1

47 R 3.1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5

2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3

3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, rdl 8,5/2,0 + 3,2 + 38/49 % + ka/1

48 R 3.1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5

2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3

3 LBl: derb-dgrün-glzd, ellipt, gekerbt + 5,0/0,7 + 2,5 + 50/58 % + ka/1

50 R 3.1.1a1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz

3 LBl: derb dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 6,2/1,2 + 3,0 + 48/60 % + ka/2

4 Fr: 3 + E VIII + 20,9~21,4~23,5 + 102 : 112 : 110

5 St: 12,5~7,8~9,8 + 62 : 78 : 126 + Stein linsig-oval.

6 Sehr früh reif!

51 R 3.7.1.4 Kreete

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0

2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 + 2.2 + 2.3

3 LBl: hgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 8,5/1,9 + 4,3 + 51 %/65 % + 2/1

52 R 3.1 Kricke

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 einz
 3 Lbl: dgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 5,6/0,7 + 3,5 + 63/71 % + ka/1

53 R 3.1.1a1 Kricke

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
 3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 6,3/1,2 + 2,8 + 44/55 % + 1/1
 4 Fr: 3 + E IX + 23,4~21,9~22,5 + 94 : 97 : 103
 5 St: 13,8~7,3~9,9 + 53 : 72 : 136 + Stein linsig

55 R 3.1.1a1 Kricke

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 s kurz + 2. 5
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
 3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 6,3/1,2 + 3,0 + 48/59 % + ka/1
 4 Fr: 3 + IX + 18,6~18,1~19,2 + 97 : 103 : 106
 5 St: 12,1~6,6~9,2 + 55 : 76 : 139 + Stein linsig-oval

6

56 R 3.1.1a1 Kricke

- 1 Spr: 1.1 + 1.2 bh2 + 2. 2
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
 3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, breit ges, keilfg + 8,2/1,7 + 4,0 + 49/62 % + 1/1
 4 Fr: 3 + E IX + 19,9~18,8~19,5 + 94 : 98 : 103
 5 St: 14,9~7,7~10,5 + 52 : 70 : 136 + Stein linsig-oval

57 R 1.1. b Gew. Schlehe mit rdl Stein

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 4
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
 3 LBl: dünn dgrün, lanzettlich, ges, keilfg + 5,0/0,8 + 1,5 + 30/36 % + ka/1
 4 Fr: 5 + E IX + 17,4~16,1~17,7 + 93 : 192 : 17,7
 5 St: 9,9~6,6~8,5 + 64 : 86 : 135 + St rundlich
 6 Fr sehr adstringierend, Fl des St stark gerieft

58 R 1.2.1 typische Großfruchtige Schlehe

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh1 + 2. 2
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a 2.3 einz
 3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, schön rdl + 4,3/0,6 + 1,9 + 44/51 % + ka/ka
 4 Fr: 5 + MX + 18,8~16,8~17,8 + 89 : 95 : 106
 5 St: 12,7~7,1~10,1 + 56 : 80 : 142 + St eiförmig
 6 kräftiger Stein mit deutlicher Spitze, Fl riefig, Fr adstringierend

59 R 3.1.1a1 Kricke

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 4-6 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
 3 LBl: dgrün-glzd, oval, gekerbt, rdl + 6,8/1,5 + 3,5 + 51/66 % + ka/1
 4 Fr: 3 + E IX + 20,7~20,1~20,9 + 97 : 101 : 104
 5 St: 12,7~6,6~8,9 + 52 : 70 : 135 + St oval-linsig
 6 BNt etwas betont

60 R 1.3.2 Große Filzige Schlehe

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh2 + 2. 5
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 2 + 1.3 3 + 2.1 bh kurz + 2.2 d + 2.3 einz
 3 LBl: matt mgrün, ellipt, ges, rdl + 4,3/0,5 + 2,3 + 53/61 % + 3/3
 4 Fr: 6 + X + 15,4~15,7~16,3 + 102 : 106 : 104
 5 St: 10,6~6,5~9,0 + 61 : 85 : 138 + St eiförmig
 6 St mit schmalem Stielansatz, durchgehend gerieft, Fruchtsaft rötlich, beh s.kurz

61 R 1.2.1 typ. Großfruchtige Schlehe

- 1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
 3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, ges, rdl + 4,5/0,8 + 3,3 + 73/89 % + ka/1

4 Fr: 3 + E IX + 16,8~16,1~16,9 + 96 : 101 : 105
5 St: 11,5~6,5~9,1 + 57 : 79 : 140 + St eiförmig
6 Fr roter Saft, Fr adstringierend, kräftiger Wulst

62 R 1 Schlehe

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: mgrün, ellipt, ges, keilfg + 4,3/0,8, + 1,8 + 42/51 % + ka/ka

63 R

1 Spr: 1.1 + 1.2 bh3 + 2. 4
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 LBl: hellgrün, verkehrt-eifg, gekerbt, keilfg + 6,3/1,5 + 2,8 + 44/58 % + 3/3

64 R 1.2.1 typische Großfruchtige Schlehe

1 Spr: 1.1 + 1.2 bh2 + 2. 5
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
3 Lbl: dgrün-gld, ellipt, ges, rdl + 3,8/0,5 + 2,0 + 53/61 % + 3/3
4 Fr: 4 + X + 16,7~15,4~15,4 + 92 : 92 : 100
5 St: 10,4~6,1~8,1 + 59 : 78 : 133 + St eiförmig

65 R 3.7.1.4 Kreete

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 6 + 2.1 bh1 + 2.2 c + 2.3 paa
3 LBl: hellgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 9,9/2,0 + 4,6 + 46/58 % + 3/2

66 R 3.7.1.4 Kreete

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 Lbl: hellgrün, eifg, gekerbt, rdl-keilfg + 8,8/2,0 + 4 + 45 % / 59 % + 4/3

67 R 3.7.1.4 Kreete

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 1
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 Lbl: hellgrün, ellipt, gekerbt, rdl-keilfg + 8,1/2,3 + 3,4 + 42/59 % + 3/2

68 R 3.1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 LBl: matt mgrün, ellipt, ges, keilfg + 10,4/1,7 + 4,7 + 45/54 % + 3/1

69 R 3.1.1a Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 2
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: mgrün-gld, ellipt, ges, keilfg, + 7,2/1,3 + 3,0 + 42/51 % + ka/1
4 Fr: 5 + IX + 21,8~21,4~21,6 + 98 : 99 : 101
5 St: 12,2~6,8~9,7 + 56 : 80 : 143 + St oval-linsig
6 St mit schmalem Stielansatz, Fl glatt

70 R 12.1 typ. Großfruchtige Schlehe

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: mgrün, ellipt, ges, rdl + 4/0,5 + 2,0 + 50/57 % + 2/1
4 Fr: 5 + M X + 19,1~16,1~17,6 + 84 : 92 : 109
5 St: 11,8~5,5~8,3 + 47 : 70 : 151 + St eiförmig
6 Fr dicke Falte, Stielansatz d. Steines breit, Fl riefig, bis gemuschelt

71 R 1.2.1 typ. Großfruchtige Schlehe

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 4
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 LBl: mgrün-gld, ellipt, ges, rdl + 4,7/0,5 + 1,8 + 38/43 % + ka/1
4 Fr: 5 + M X + 17,3~16,9~17,5 + 98 : 101 : 104
5 St: 10,8~6,4~8,5 + 59 : 79 : 133 + St eiförmig, Fl des St zerklüftet

72 R 3

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0

2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 LBl: mgrün-gldz, ellipt, gekerbt, keilfg + 6,1/1,0 + 3,2 + 52/63 % + ka/1

73 R 3

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Bl: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 LBl: matt hellgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 5,7/1,2 + 2,6 + 46/58 % + 2/2

74 R 3.1.1a Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 1
2 Blü: + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 LBl: hellgrün, lanzettlich, ges, keilfg + 4,0/0,7 + 1,3 + 33/39 % + ka/ka
4 Fr: 4 + A X + 18,9~21,4~23,4 + 113 : 124 : 109
5 ST: 10,6~7,2~9,5 + 68 : 90 : 132 + St eiförmig
6 Fr schwach adstringierend, St symmetrisch

75 R 1.2.1 typ Großfruchtige Schlehe

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 4
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 2 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: dgrün-gldz, lanzettlich, ges-gekerbt, keilfg + 4,7/1,0 + 1,3 + 28/35 % + ½
4 Fr: 2 + E IX + 16,3~14,9~15,0 + 91 : 92 : 101
5 St: 10,5~6,0~7,9 + 57 : 75 : 132 + St linsig
6 Fr stark adstringierend, St riefig

76 R 3.1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 LBl: mgrün-gldz, ellipt, gekerbt, keilfg + 6,1/0,8 + 2,7 + 44/51 % + ka/1

77 R 1.1c Gew. Schlehe mit eiförmigem Stein

1 Spr: 1.1 + 1.2 bh1 + 2. 4
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
3 LBl: matt-mgrün, oval, gekerbt, keilfg + 4,3/0,3 + 2,1 + 49/53 % + ½
4 Fr: 2 + E IX + 14,9~14,7~15,4 + 99 : 103 : 105
5 St: 8,4~5,2~7,7 + 62 : 92 : 148 + St eiförmig
6 Fr adstringierend :

78 R 1.2.1 typ Großfruchtige Schlehe

1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 bh2 + 2. 0
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
3 LBl: hellgrün, ellipt, ges, rdl-keilfg + 5,1/0,6 + 2,5 + 49/56 % + ka/2
4 Fr: 5 + M IX + 17,1~17,1~17,1 + 100 : 100 : 100
5 St: 11,1~6,1~8,6 + 55 : 77 : 141 + St eiförmig
6 kuglige Schlehe mit linsigem Stein, Fr adstringierend

79 R 1 Schlehe

1 Spr: 1.1 bh3 + 1.2 bh3 + 2. 2
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 LBl: matt hellgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 6,8/1,5 + 2,7 + 40/51 % + 3/3

80 R 3.1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5
2 Blü: 1.1 + 1.2 + 1.3 + 2.1 + 2.2 + 2.3
3 Lbl: dgrün-gldz, ellipt, ges, keilfg + 8,5/2,2 + 3,1 + 36/49 % + ka/ka

81 R 1.1a eiförmige Gewöhnliche Schlehe

1 Spr: 1.1 + 1.2 bh3 + 2. 1
2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 b + 2.3 einz
3 Lbl: mgrün, ellipt, breit-ges, keilfg + 5,2/0,8 + 2,2 + 42/50 % + 3/1
4 Fr: 3 + X + 15,7~12,8~13,8 + 82 : 88 : 108
5 St: 10,0~6,1~7,8 + 61 : 78 : 128 + St eiförmig

82 R 3.1 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2.
2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d+ + 2.3 paa

3 LBl: derb dgrün-glzd, ellipt, gekerbt, keilfg + 9,8/2,5 + 3,8 + 39/52 % + ka/1

83 R 3.1.1a2 Kricke

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 bh0-1 + 2. 0
 2 Blü: 1.1 sw + 1.2 2 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 c + 2.3 paa
 3 LBl: dgrün-glzd, ellipt, breit-ges, keilfg + 7,9/1,3 + 3,8 + 48/58 % + ka/1
 4 Fr: 3 + IX + 22,8~22,7~23,7 + 99,6 : 104 : 104,4
 5 St: 12,0~8,0~9,9 + 67 : 83 : 124 + ST Enden etwas ungleich

84 R 1.2.1 typ Grofruchtige Schlehe

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 4
 2 Blü: 1.1 rötl-w + 1.2 2 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
 3 LBl: dgrün, lanzettlich, ges, keilfg + 4,9/1,1 + 1,3 + 27/34 % + 1/1
 4 Fr: 5 + MIX + 15,7~14,8~15,9 + 94 : 101 : 107
 5 St: 9,3~5,7~7,6 + 61 : 82 : 133 + St eiförmig
 6 St ein wenig abgedreht, Fl gerieft, Fr adstringierend

85 R 1.2.1 typ Großfruchtige Schlehe

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 4
 2 Blü: 1.1 beige-w + 1.2 2 + 1.3 4 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
 3 LBl: mgrün, ellipt, ges, rdl-keilfg + 3,4/0,3 + 1,8 + 53/58 % + 1/1
 4 Fr: 4 + MIX + 16,4~15,1~15,3 + 92 : 93 .101
 5 St 9,7~6,1~7,3 + 63 : 75 : 120 + St eiförmig
 6 Fr adstringierend

86 R 1 Schlehe

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 5
 2 Blü: 1.1 w + 1.2 2 + 1.3 1 + 2.1 ka + 2.2 a + 2.3 einz
 3 LBl: hellgrün, ellipt, ges, keilfg, + 4,1/0,7 + 1,7 + 41/50 % + ka/1

87 R 3.7.1.4 Kreete

1 Spr: 1.1 ka + 1.2 ka + 2. 0
 2 Blü: 1.1 bw + 1.2 3 + 1.3 6 + 2.1 ka + 2.2 d+ + 2.3 paa
 3 LBl: mgrün, ellipt, gekerbt, keilfg + 10,8/2,5 + 4,8 + 44/58 % + ka/1

11. Abkürzungen

abgrdt	abgerundet	ges	gesägt	RZ	Stadt Ratzeburg
anlg	anliegend	Grö	Größe	S	südl. Streuobstwiese
Auslf	Ausläufer	HH	Hansestadt Hambg	S-A	Ld Sachsen-Anhalt
Austr	Austrieb	hfg	häufig	S-H	Ld Schleswig-Holstein
B	Breite	Ind	Indizes	Slg	Sämling
Bay	Land Bayern	K	Art Kirschkpflaume	slt	selten
BBl	Blütenblatt	ka	kahl	s.l.	sensu lato, i.weiter. Sinne
BD	Land Baden	KBl	Kelchblatt	s.s.	sensu stricto, i.engeren S.
BG	Barbeitungsgebiet	keilfg	keilförmig	slt	selten
bh	behaart	KSt	Kultursorte	sp	spitz
bl	blättrig	ku	kurz	ssp	Subspezies
blhnd	blühend	L-Achse	Längsachse	Stbg	Kreis Steinburg
BNt	Bauchnaht	Lbg	Kreis Hzgt.Lauenbg	StEd	Stein-Ende
br	breit	LBl	Laubblatt	stu	stumpf
Brdbg	Land Brandenburg	Ld	Land	Sw	Land Schweden
BSt	Blütenstiel	lanz	lanzettlich	Thürg	Land Thüringen

B-W	Ld BD-Württembg	lg	lang	Trb	Trieb
CH	Land Schweiz	LSt	Landsorte	typ	typisch
d	dunkel	m	mittel	U	Umgebung
dBG	deutsches BG	N	nördl. Streuobstwiese	Utlg	Unterlage
D	Dicke	NbEd	Narbenende	var	Varietät
DK	Land Dänemark	NF	Kreis Nordfriesland	verk	verkehrt
Egl	Land UK	NMN	Stadt Neumünster	viol	violett
eifg	eiförmig	NRW	Ld Nordrhein-Westf.	W	westl. Streuobstwiese
ell	elliptisch	NW-M	Nordwest Mecklbg.	w	wenig
ESt	Edelsorte	O	östl. Streuobstwiese	Wls	Land Wales
etw	etwas	O-Frk	Land Oberfranken	Wrz	Wurzel
euBG	europäisches BG	Oö	Land Oberösterreich	Z	zentrl. Teil d.Streuobstw.
F	Land Frankreich	paa	wenige Fr. paarig	eig	eigen
f	Form	Paa	Viele Fr paarig	Fam	Familie
FG	Feldgehölz	Pflzg	Pflanzung	nBG	näheres BG
Fk	Land Franken	PPfl	Pimitiv-Pflaume	Wi	Wildpflanze
Fr	Frucht	RNt	Rückennaht	OH	Kreis Ostholstein
FSt	Fruchtstiel	R-P	Ld Rheinland Pfalz	Spr	Spreite
gek	gekerbt	rtli	rötlich	Abb	Abbildung